

Koetoiminta ja käytäntö

Liite 24.10.2000 57. vuosikerta Numero 6 Sivu 3

Suojakaistat vähentävät myös torjunta-ainekuormitusta

PIRKKO LAITINEN, Maatalouden tutkimuskeskus ja KATRI SIIMES, Suomen ympäristökeskus

Ravinnekästäjöiden ehkäisemiseksi perustetut suojakaistat vähentävät tehokkaasti myös pellon torjunta-aineiden päästöjä. Niitettyn urmikaista oli tehokkain, sillä se vähensi päästöjä yli 90 prosenttia.

Kasvillisuudeltaan erilaiset suojakaistat erosivat toisistaan sekä pintavalunnan että veden mukana pellolta huuhtoutuviin torjunta-ainemäärien suhteeseen. Luonnonkasvikaista vähensi kesäaikana pintavalunnan mukana tulleita torjunta-ainemääriä lähes yhtä paljon kuin niitettyn urmikaista. Sen sijaan kevättalvella luonnonkasvikaistalta tuli huuhtoumia muita koeruuttoja enemmän.

Torjunta-aineiden päästöt puntarissa

Suojakaistojen tehoa torjunta-aineeksiäjien vähentäjinä tutkittiin MTT:n Lintupajun suojakaistakentällä Jokioississa. Maalaji oli aitosavea. Kokeessa verrattiin suojakaistattoman pellon ja kymmenen metriä leveiden kasvustollisten suojakaistojen vaikutusta pellon torjunta-aineeksiäjihin. Kasvustot olivat niitettävä urmikaista ja luonnonkasvikaista. Koeruudut olivat 18 metriä leveitä ja 70 metriä pitkiä. Viljelykasvina oli kaura. Torjunta-aineita käytettiin suositusten mukaisia määriä.

Vuosina 1995-1996 tutkittiin dimetaatin, iprodionin ja propikonatsolin huuhtoutumista. Tuolloin dimetaattia havaittiin vain yhden kerran. Kyseinen päästö tuli ensimmäisen käsittelyn jälkeen sattuneen sateen jälkeen, noin kuuden vuorokauden kuluttua käsittelystä. Propikonatsolia havaittiin kahdesti syysvalunnassa ja kerran kevättalven valunnassa. Sen sijaan iprodionia havaittiin kaikissa kesän, syksyn ja kevättalven valunnoissa.

Torjunta-aineita huuhtoutui suojakaistattomalta ruudulta yhteensä 1121, urmikaistalta 104 ja luonnonkasvikaistalta 797 milligrammaa hehtaarilta. Käytönmääriin verrattuna nämä päästöt olivat suojakaistattomalta ruudulta 0,1, urmikaistalta 0,01 ja luonnonkasvikaistalta 0,06 prosenttia pellolle ruiskutetuista torjunta-aineista.

Jos merkitään suojakaistattoman ruudun torjunta-aineeksiäjät 100 prosentiksi, olivat urmikaistan päästöt 9,3

ja luonnonkaistan päästöt 71,1 prosenttia. Nurmikaista vähensi tehokkaimmin kaikkien torjunta-aineiden päästöjä.

Luonnonkasvikaista keräsi talven aikana eniten lunta ja siltä tuli lumensulamisia muita ruutuja enemmän. Näiden vesien mukana iprodionia ja propikonatsolia tuli tältä kaistalta enemmän kuin multa ruudulta. Yli 90 prosenttia propikonatsolipäästöstä tulikin lumensulamisvesien mukana.

Kevällä torjunta-ainetilanne muuttui

Seuraavana keväänä kentältä otettiin myös maanäytteitä 0-20 sentin syvyydestä. Niissä havaittiin propikonatsolia ja iprodionia, mutta ei dimetoaattia. Tämä torjunta-aine todennäköisesti ehti hajota edellisen kesän aikana. Propikonatsolia oli keväällä kaikkien ruutujen maanäytteissä pieniä pitoisuksia. Vähiten sitä oli nyt luonnonkasvikaistalla, josta sitä oli huuhtoutunut eniten. Iprodionia oli puolestaan keväällä sekä suojaistaattoman ruudun että nurmikaistan maassa, mutta ei luonnon kasvikaistalla.

Vuoden 1997 kokeeseen valittiin vain helposti huuhtoutuva ja suhteellisen hitaasti hajoava iprodioni, jonka avulla suojaistojen erot olivat parhaiten todettavissa. Tämä koe kesti kesäkuusta marraskuuhun. Myös tällä koejaksolla niittävä nurmikaista vähensi tehokkaimmin päästöjä, mutta luonnonkasvikaista oli lähes yhtä tehokas. Päästöt olivat nurmikaistalta 96 ja luonnonkasvikaistalta 93 prosenttia pienempiä kuin suojaistaattomalta ruudulta.

Suojaistat näyttävät olevan tehokkaita torjunta-ainepäästöjen vähentäjiä, eikä niiden hyödyllisyyttä vesistöjen kuormituksen vähentäjinä voitane kiistää. Kasviston laatu, sen hoito ja mahdollinen hyötykäyttö samoin kuin suoja-alueen leveys suhteessa pellon kokoon vaatisivat kuitenkin lisäselvityksiä.

Lisätietoja: Koetoiminta ja käytäntö 6/2000: 3
sähköposti pirkko.laitinen@mtt.fi
puhelin (03) 4188 2582.