

##  picondylalgies lat rales dans une cohorte de salari s lig riens :  volution et d terminants

Submitted by Julie Bodin on Tue, 01/12/2016 - 09:29

Titre	�picondylalgies lat�rales dans une cohorte de salari�s lig�riens : �volution et d�terminants
Type de publication	Article de revue
Auteur	Descatha, Alexis [1], Herquelot, El�onore [2], Mediouni, Zakia [3], Petit, Audrey [4], Ha, Catherine [5], Leclerc, Annette [6], Roquelaure, Yves [7]
Pays	France
Editeur	Elsevier
Ville	Paris
Type	Article scientifique dans une revue � comit� de lecture
Ann�e	2014
Langue	Fran�ais
Date	juillet 2014
Num�ro	4
Pagination	328-32
Volume	81
Titre de la revue	Revue du Rhumatisme
ISSN	1169-8330
Mots-cl�s	Douleur du coude [8], �picondylalgie lat�rale; �picondylite; D�claration de maladie professionnelle; Facteurs professionnels; Maladie professionnelle [9]

## Objectifs

Il n'existe que peu d'éléments concernant le pronostic à long terme des épicondylites latérales en population salariée en général. L'objectif a été d'écrire l'évolution et les déterminants des douleurs du coude et des épicondylalgies latérales vraisemblables dans une cohorte de salariés représentative de la population française au travail.

## Méthode

Des salariés ligériens présentant entre 2002 et 2004 une épicondylalgie latérale vraisemblable ont été suivis pour connaître l'évolution de leurs symptômes quatre ans après (2007 et 2009). Les déterminants possibles de la pathologie ont été étudiés.

## Résultats

Résumé en français

Sur les 1611 salariés suivis, 100 sujets présentaient une épicondylalgie latérale vraisemblable en 2002-4. Plus d'un tiers des salariés inclus (39,0 %) présentaient une douleur au coude ou une épicondylalgie lors du second examen. Les travaux sollicitant le coude sont significativement associés à la persistance des épicondylalgies latérales vraisemblables en uni- et multivariée (odds ratio ajusté 5,59 [1,47 ; 21,30]).

## Conclusion

Les épicondylalgies latérales en milieu professionnel évoluent favorablement dans deux tiers des cas environ. Cette évolution dépend du diagnostic et de la prise en compte des facteurs professionnels dans la prise en charge. La déclaration de maladie professionnelle n'apparaît pas comme un déterminant indépendant significatif de mauvais pronostic même si le praticien doit évaluer les avantages et les inconvénients d'une telle démarche et en informer le patient.

URL de la notice

<http://okina.univ-angers.fr/publications/ua14347> [10]

DOI

10.1016/j.rhum.2013.10.006 [11]

Lien vers le document

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1169833013002445> [12]

Titre abrégé

Rev. rhum.

---

## Liens

[1] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8884](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8884)

[2] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=9860](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=9860)

[3] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=24291](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=24291)

[4] <http://okina.univ-angers.fr/a.petitle/publications>

[5] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8920](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8920)

[6] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8885](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8885)

[7] <http://okina.univ-angers.fr/yves.roquelaure/publications>

[8] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[keyword\]=20624](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[keyword]=20624)

[9] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[keyword\]=20625](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[keyword]=20625)

[10] <http://okina.univ-angers.fr/publications/ua14347>

[11] <http://dx.doi.org/10.1016/j.rhum.2013.10.006>

[12] <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1169833013002445>

Publié sur *Okina* (<http://okina.univ-angers.fr>)