



Attachement narratif, fonction réflexive et régulation émotionnelle chez des femmes déprimées

Submitted by Emmanuel Lemoine on Wed, 04/22/2015 - 16:46

Titre	Attachement narratif, fonction réflexive et régulation émotionnelle chez des femmes déprimées
Type de publication	Article de revue
Auteur	Chahraoui, K. [1], Vinay, Aubeline [2]
Type	Article scientifique dans une revue à comité de lecture
Année	2014
Langue	Anglais
Date	2014
Numéro	3
Pagination	395-409
Volume	79
Titre de la revue	L'évolution psychiatrique

Résumé en français

La théorie de l'attachement et ses différents développements dans le domaine de l'attachement adulte proposent un paradigme novateur pour étudier les processus mentaux sous-jacents aux représentations d'attachement à travers les formes d'énonciation du récit et la mise en forme des expériences subjectives. L'objectif de cette étude était de rechercher des profils particuliers du discours des personnes déprimées à travers une procédure d'analyse des entretiens semi-structurés, inspirée du paradigme de l'attachement (Edicode). Vingt-trois femmes déprimées et 20 femmes consultant dans le cadre d'un suivi de prévention lié à un antécédent de mélanome ont participé à un entretien clinique semi-structuré qui a été enregistré, retranscrit puis analysé selon la méthode d'évaluation Edicode en double cotation. Les données des deux groupes ont été ensuite comparées à un groupe témoin de référence. Les résultats montrent que les sujets déprimés ont une chute du facteur adéquation qui renvoie dans l'Edicode à la préoccupation d'attachement. Nous observons également une baisse des dimensions réflexivité et cohérence pour les deux groupes déprimé et somatique en référence au groupe témoin. Nous discutons des liens entre préoccupation d'attachement chez les sujets déprimés et difficultés à traiter les informations cognitives et émotionnelles en rapport avec les expériences relationnelles présentes et passées. Par ailleurs, les difficultés de régulation émotionnelle et de mentalisation retrouvées dans les deux groupes déprimé et somatique par comparaison au groupe témoin, semblent renvoyer de manière plus générale, aux différentes incertitudes et anxiétés qui entourent l'état de maladie et son évolution, ce qui nous amène à considérer plus spécifiquement le vécu psychologique actuel du sujet dans son rapport à la maladie et à sa gestion ainsi que les aspects de l'alliance thérapeutique en milieu médical.

URL de la notice <http://okina.univ-angers.fr/publications/ua10034> [3]

DOI [10.1016/j.evopsy.2012.08.007](https://doi.org/10.1016/j.evopsy.2012.08.007) [4]

Liens

[1] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=17463](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=17463)

[2] <http://okina.univ-angers.fr/a.vinay/publications>

[3] <http://okina.univ-angers.fr/publications/ua10034>

[4] <http://dx.doi.org/10.1016/j.evopsy.2012.08.007>

Publié sur *Okina* (<http://okina.univ-angers.fr>)