



Dépistage des troubles visuels et auditifs chez l'enfant. Application des recommandations chez les médecins généralistes du Maine-et-Loire

Submitted by Emmanuel Lemoine on Wed, 11/12/2014 - 16:24

Titre	Dépistage des troubles visuels et auditifs chez l'enfant. Application des recommandations chez les médecins généralistes du Maine-et-Loire
Type de publication	Article de revue
Auteur	Colineau-Méneau, Aurélie [1], Neveur, Marie-Annick [2], Beucher, Alain [3], Hitoto, Hikombo [4], Dagorne, Carole [5], Dubin, Jacques [6], Fanello, Serge [7]
Editeur	Société Française de Santé Publique
Type	Article scientifique dans une revue à comité de lecture
Année	2008
Langue	Français
Date	2008/08/27
Numéro	3
Pagination	259 - 268
Volume	20
Titre de la revue	Santé Publique
ISSN	0995-3914

Résumé en français

Dépister précocement les troubles visuels et auditifs chez le nourrisson permet une meilleure prise en charge thérapeutique. Ce rôle est en grande partie dévolu aux médecins généralistes et obligatoires lors des examens de santé du 9e et du 24e mois. Nous avons réalisé une enquête prospective auprès de l'ensemble des médecins généralistes d'un département français, afin de connaître leurs habitudes pratiques cliniques en matière de dépistage des troubles sensoriels. Le taux de réponses de 49 % a permis d'exploiter 321 questionnaires. Nous constatons que l'examen clinique n'est pas systématique et qu'il est principalement effectué lors des examens des 4e, 9e et 24e mois ou en cas de doute parental. Si les signes d'alerte sont, dans leur ensemble, bien connus des médecins généralistes, les facteurs de risque sont recherchés de façon incomplète. L'examen clinique reste sommaire avec la réalisation des principaux réflexes pour l'appareil visuel, mais une recherche superficielle du strabisme ou de l'amblyopie. Le dépistage auditif est réalisé principalement avec la voix ou le claquement des mains, bien que deux tiers d'entre eux possèdent des jouets calibrés. L'âge minimum de prise en charge est mal connu des praticiens et cela peut être préjudiciable à la bonne prise en charge des déficits sensoriels. Le nouveau carnet de santé devrait permettre un dépistage plus pertinent des troubles sensoriels chez le nourrisson : une plus large diffusion des informations et des conduites à tenir est nécessaire.

URL de la notice	http://okina.univ-angers.fr/publications/ua5352 [8]
DOI	10.3917/spub.083.0259 [9]

Lien vers le document <http://dx.doi.org/10.3917/spub.083.0259> [9]

Titre abrégé Santé Publique

Liens

- [1] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8965](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8965)
- [2] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8966](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8966)
- [3] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8967](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8967)
- [4] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=7980](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=7980)
- [5] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8968](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8968)
- [6] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8969](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8969)
- [7] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=7765](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=7765)
- [8] <http://okina.univ-angers.fr/publications/ua5352>
- [9] <http://dx.doi.org/10.3917/spub.083.0259>

Publié sur *Okina* (<http://okina.univ-angers.fr>)