



## Surveillance des principaux TMS et de l'exposition au risque dans les entreprises des Pays de la Loire : résultats chez les ouvriers intérimaires

Submitted by Emmanuel Lemoine on Wed, 11/12/2014 - 16:28

Titre	Surveillance des principaux TMS et de l'exposition au risque dans les entreprises des Pays de la Loire : résultats chez les ouvriers intérimaires
Type de publication	Article de revue
Auteur	Roquelaure, Yves [1], Ha, Catherine [2], Bodin, Julie [3], Touranchet, Annie [4], Chotard, Anne [5], Bidron, Patrick [6], Ledenic, Béatrice [7], Leroux, François [8], Mazoyer, Annick [9], Imbernon, Ellen [10]
Type	Article scientifique dans une revue à comité de lecture
Année	2010
Langue	Français
Date	2010
Numéro	5-6
Pagination	45 - 47
Titre de la revue	Bulletin épidémiologique hebdomadaire
ISSN	0245-7466

**Résumé en français**

Introduction - Grâce au programme de surveillance épidémiologique des troubles musculo-squelettiques (TMS) mis en oeuvre dans les Pays de la Loire, les prévalences des symptômes et des TMS, ainsi que de l'exposition à leurs facteurs de risque, ont pu être estimées chez les travailleurs intérimaires. Méthodes - La participation de 83 médecins du travail volontaires a permis d'inclure par tirage au sort un échantillon de 3 710 salariés lors de la visite médicale périodique entre 2002 et 2004. Des données médicales et d'exposition professionnelle ont été recueillies par auto-questionnaire. Le diagnostic des principaux TMS des membres supérieurs a été porté par les médecins du travail selon une démarche clinique standardisée. Résultats - Dans cet échantillon, 194 étaient intérimaires, des ouvriers en grande majorité (88%). Les résultats présentés ici concernent les comparaisons des 171 ouvriers intérimaires aux 1 412 ouvriers non intérimaires. Les prévalences des symptômes musculo-squelettiques et des TMS n'étaient pas significativement plus élevées chez les ouvriers intérimaires, excepté pour la ténosynovite de De Quervain (3,5% vs. 1,4%). En revanche, les intérimaires étaient significativement plus exposés aux facteurs de risque professionnels de TMS. Conclusion - Malgré une surexposition des ouvriers intérimaires aux facteurs de risque de TMS, la prévalence des symptômes et des TMS, bien qu'élevée, n'est dans l'ensemble pas supérieure à celle observée chez les autres ouvriers. Ce résultat peut s'expliquer partiellement par l'âge en moyenne moins élevé des intérimaires.

URL de la notice <http://okina.univ-angers.fr/publications/ua5422> [11]

Lien vers le document [http://www.invs.sante.fr/beh/2010/05\\_06/beh\\_05\\_06\\_2010.pdf](http://www.invs.sante.fr/beh/2010/05_06/beh_05_06_2010.pdf) [12]

---

## Liens

- [1] <http://okina.univ-angers.fr/yves.roquelaure/publications>
- [2] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8920](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8920)
- [3] <http://okina.univ-angers.fr/julie.bodin/publications>
- [4] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8958](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8958)
- [5] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8959](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8959)
- [6] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8960](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8960)
- [7] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8963](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8963)
- [8] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8961](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8961)
- [9] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8962](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8962)
- [10] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=8923](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=8923)
- [11] <http://okina.univ-angers.fr/publications/ua5422>
- [12] [http://www.invs.sante.fr/beh/2010/05\\_06/beh\\_05\\_06\\_2010.pdf](http://www.invs.sante.fr/beh/2010/05_06/beh_05_06_2010.pdf)

Publié sur *Okina* (<http://okina.univ-angers.fr>)