




Condición Corporal

Es un método subjetivo que permite evaluar el estado corporal de los animales mediante una palpación en el espacio ubicado entre las últimas costillas y delante de las caderas. Asigna una puntuación de 1 (muy flaca) a 5 (muy gorda). En etapas reproductivas, la condición corporal ideal es alrededor de 3 (normal).

Perfil	Columna	Descripción
1 		Poco músculo y nada de grasa. Los huesos sobresalen y son filosos.
2 		Algo de músculo. Poca de grasa.
3 		Buenos músculos y hay una considerable cantidad de grasa.
4 		Área muscular llena y cubierta por una buena cantidad de grasa. Casi no se reconocen los huesos.
5 		Área muscular llena y cubierta por mucha cantidad de grasa. Hay grandes depósitos de grasa en la grupa y en la cola.

Plataforma de Innovación Territorial INTA

“Desarrollo productivo sustentable de la región árida del oeste pampeano y sureste mendocino, y el área de riego del río Colorado”


Proyecto Local INTA

“Aporte al desarrollo productivo caprino en el oeste pampeano y sureste mendocino”

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Centro Regional La Pampa-San Luis

Agencia de Extensión Rural Victorica
Tel: (02338) 432381
lux.juan@inta.gov.ar

Estación Experimental Agropecuaria Anguil
“Ing. Agr. Guillermo Covas”
Tel/Fax: (02954) 495057 int. 425/460
hurtado.ariel@inta.gov.ar



FACULTAD DE
CIENCIAS VETERINARIAS
Universidad Nacional de La Pampa



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

PRODUCCIÓN CAPRINA

Suplementación estratégica

¿Qué es la suplementación estratégica?
Práctica que consiste en darles un refuerzo alimentario a los animales más flacos para acompañar lo que consumen en pastoreo y mejorar su condición corporal. De esta manera se aporta energía, proteína y minerales.



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria



¿Cuándo suplementar?

Cuando la condición corporal de los animales sea menor a 3 puntos o el ciclo productivo lo requiera.

Los momentos más comunes para suplementar son:

- Preservicio: 45-30 días antes de iniciar el servicio.
- Preparto: 45-30 días antes del parto. Preferentemente dar balanceado, granos o expeller.
- Lactancia: Durante los primeros 45 días de lactancia.
- En invierno: Animales que están muy flacos en esta época.

¿Con qué suplementamos?

Los alimentos más comúnmente utilizados son:

- Granos (Maíz, Avena, Cebada, etc.): Aportan principalmente energía. Pueden darse enteros o partidos. También es recomendable remojarlos.
- Heno (Fardo, Rollo, etc.): Aportan principalmente proteína y fibra y, en menor medida, energía.
- Alimento balanceado: Aportan energía, proteína y minerales de manera balanceada.
- Expeller: Aporta proteína y energía.

¿Cuánto alimento damos?

La cantidad de alimento a suministrar en la suplementación estratégica equivale al 1 - 1,5 por ciento del peso del animal.

Kg de Peso del Animal	Alimento para 1 animal/1 día	Alimento para 10 animales/1 día	Alimento para 15 animales/1 día
20 kg	250 g	2,500 kg	3,750 kg
30 kg	350 g	3,500 kg	5,250 kg
45 kg	550 g	5,500 kg	8,250 kg

Acostumbramiento

Consiste en desarrollar un periodo de adaptación del animal a la nueva comida para evitar posibles problemas digestivos, sobre todo si damos granos. Se debe realizar al inicio y al final de la etapa de suplementación. Siempre debe estar asegurada la fuente de pasto y agua. Evitar cambios bruscos en la dieta.

A modo de sugerencia, se presenta el siguiente esquema:

Esquema	Gramos por día
Del día 1 al 3	50 gramos
De día 4 a día 6	100 gramos
De día 7 a día 10	200 gramos
De día 11 a día 15	300 gramos
A partir del día 15	Lo que corresponda según peso

¿Cómo entregamos el alimento?

- Utilizar comederos limpios y con espacio suficiente para todos los animales. Unos 20 centímetros por animal, controlando que todos coman.
- Separar a los animales por categorías (adultas y menores) y alimentarlos por separado.
- De ser posible, dividir la ración en dos veces al día (mañana y tarde).
- Si dispone de más de un alimento, mezclarlos en la ración.

Otras recomendaciones finales

- Si se presentan diarreas, retirar el maíz y darle solo pasto y agua.
- Evitar que el animal deje de comer a campo y solo quiera comer el suplemento.
- Se podría suplementar día por medio si no disponemos de alimento suficiente y si la condición corporal del animal lo permite.
- Conservar el alimento en un lugar seco, fresco y a la sombra.
- Ante cualquier duda consultar al asesor técnico.

