

University of Groningen

## Teratogene werking van fenytoïne

ELSHOVE, J

**IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.**

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1970

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

ELSHOVE, J. (1970). *Teratogene werking van fenytoïne*. s.n.

**Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

**Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*

## STELLINGEN

### I.

Vrouwen, lijdende aan epilepsie, krijgen meer kinderen met aangeboren misvormingen dan vrouwen zonder epilepsie.

### II.

Het voorschrijven van foliumzuur aan vrouwen die anticonvulsiva gebruiken dient reeds vóór de conceptie aan te vangen.

### III.

Geslachtsbepaling door middel van foetografie is niet verantwoord.  
P. F. Wiesenhaan, proefschrift Leiden, 1970.

### IV.

Diazepam (Valium) durante partu toegediend heeft een nadelige invloed op de toestand van het praemature kind bij de geboorte.  
Geburth. und Frauenheilk. 30: 713, 1970.

### V.

Het samengaan van een overproductie van aldosteron met een subnormale plasma renine activiteit is niet bewijzend voor het bestaan van primair aldosteronisme.

J. Clin. Endocr. 28: 1807, 1968.

### VI.

Bij het induceren van ovulaties met clomifeen is het noodzakelijk te weten welke der isomeren wordt toegediend.

J. Obstet. Gynaec. Brit. Cwlth. 76: 1100, 1969

## VII.

Chirurgische retropositie van de sterk naar voren uitstekende praemaxilla bij de dubbelzijdige lip-, kaak- en verhemeltespleet is verantwoord indien de repositie niet door orthodontische maatregelen bereikt kan worden.

Cleft Palate J. 7: 784, 1970.

## VIII.

Het gebruik van een oraal anticonceptivum is meer betrouwbaar dan het dragen van een Dalkon schild of enig ander intra-uterien pessarium.

## IX.

Sterilisatie door electrocoagulatie van de eileiders per laparoscopie verdient een ruimere toepassing.

## X.

De bij de ontbladeringsacties in Vietnam gebruikte herbiciden 2,4-D en 2,4,5-T zijn teratogeen en het gebruik ervan is in strijd met het Protocol van Genève van 1925 en met het Landoorlogsreglement van 1907.

## XI.

De verdwijnende olifant van Houdini berust op gezichtsbedrog.