


Informe Anual 2020

Vigilància de les Infeccions Relacionades amb
l'Atenció Sanitària a Catalunya





Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor i no se'n faci un ús comercial. La llicència completa es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca>

Direcció o coordinació:

Director: Miquel Pujol **Sots-directora:** Esther Calbo **Coordinació:** Enric Limón

Autors o redactors:

Josep Maria Badia. Pilar Barrufet. Magda Campins. Irma Casas. Josep Maria Cots. Emili Diaz. Dolors Domenech. Julio Duran. Oriol Gasch. Santi Grau. Sergi Hernàndez. Juan Pablo Horcajada. Ana Hornero. Nieves Larrosa. Joaquín Lopez-Contreras. Jose Antonio Martinez. Susana Melendo. Olga Monistrol. Esther Moreno, Xavier Nuvials. Montse Olona. Ariadna Padullés. Virginia Pomar. Rosario Porrón. Jose Angel Rodrigo. Alex Smithson. Mireia Urrea. Alexander Almendral

Edita: © 2012, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

Edició: 4 edició

Dipòsit legal: B 23446-2014

Número Internacional Normalitzat de Publicacions en Sèrie: ISSN 2385-6211

Agraïments: agraïm a tots els membres del plenari del programa VINCat el seu assessorament i la seva col·laboració a l'hora d'elaborar aquest document.

Taula d'abreviacions	5
OBJECTIU 1: Protocol de prevalença	6
Resultats tall de prevalença de novembre.....	6
OBJECTIU 2: Vigilància de la bacterièmia de catèter vascular	8
Casuística general de la vigilància de bacterièmia de catèter vascular	8
Bacterièmies de CVC.....	11
Bacterièmies de CVCIP	12
Bacterièmies de CVP	13
Bacterièmies de catèter utilitzat per a la nutrició parenteral (NTP)	14
Microorganismes responsables de les bacterièmies	15
OBJECTIU 3: Vigilància de la Infecció de Localització Quirúrgica (ILQ)	17
Cirurgia de Colon	17
Cirurgia de Recte	22
Cirurgia de Genoll	27
Cirurgia de Maluc.....	31
Hemiarthroplàstia de maluc	35
Cesàries	39
Colecistectomia	43
Herniorràfia	47
OBJECTIU 4: Vigilància de les infeccions a les UCIs.....	51
Vigilància de la pneumonia associada a ventilació mecànica (NAVMI)	53
Vigilància de la bacterièmia associada a catèter venós central	55
Vigilància de la infecció urinaria associada a sonda vesical (IUSV)	57
OBJECTIU 5: Vigilància microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica.....	59
Vigilància d'infeccions associades a <i>Clostridiooides difficile</i> (ICD)	59
Vigilància de <i>Staphylococcus aureus</i> resistent a meticil·lina (SARM) d'adquisició hospitalaria	65
Vigilància de <i>Staphylococcus aureus</i> resistent a meticil·lina (SARM).....	71
Vigilància d'enterobacteris multiresistents.....	77
OBJECTIU 6: Programa d'optimització de l'ús d'antimicrobians (PROA)	85
Monitoratge estandarditzat del consum hospitalari d'antimicrobians en adults.....	85
Monitoratge estandarditzat del consum hospitalari pediàtric d'antimicrobians.....	99
Sensibilitat antibiòtica comunitària	106
Sensibilitat antibiòtica hospitalària pediàtrica	114

OBJECTIU 7: Protocol de prevalença de les infeccions als centres sociosanitaris.....	117
Resultats tall de prevalença de novembre.....	117
OBJECTIU 8: Vigilància de les infeccions nosocomials a les unitats de cures intensives de pediatria i neonatologia.....	129
Unitat de cures intensives pediàtriques (UCIPs)	129
Unitat de cures intensives neonatals (UCINs)	133
OBJECTIU 9: Protocol de vigilància de la Higiene de Mans	137
Unitats d'hospitalització convencional	137
Unitats de cures intensives (UCI)	140

Taula d'abreviacions

Abreviacions	Significat
BRCVC	Bacterièmia per Catèter Venòs Central
CSS	Centre Sociosanitari
CVC	Catèter Venòs Central
CVCIP	Catèter Venòs Central d'Inserció Perifèrica
CVP	Catèter Venòs Perifèric
DI	Densitat d'Incidència
Grup I	Hospitals de més de 500 llits
Grup II	Hospitals d'entre 200 i 500 llits
Grup III	Hospitals de menys de 200 llits
Grup IV	Hospitals monogràfics
IC	Interval de Confiança
ICD	Infecció per <i>Clostridioides difficile</i>
ILQ	Infecció de Localització Quirúrgica
IQ	Intervenció Quirúrgica
IRAS	Infecció Relacionada amb l'Atenció Sanitària
IUSV	Infecció Urinaria Associada a Sonda Vesical
NAVMI	Pneumònia Associada a Ventilació Mecànica Invasiva
NISS	New Injury Severity Score
O/E	Organ i Espai
PBA	Preparat de base alcohòlica
SARM	<i>Staphylococcus aureus</i> resistant a meticil.lina
UCI	Unitat de Cures Intensives
UCIN	Unitat de Cures Intensives Neonatal
UCIP	Unitat de Cures Intensives Pediàtrica
VM	Ventilació Mecànica
VMI	Ventilació Mecànica Invasiva

OBJECTIU 1: Protocol de prevalença

Resultats tall de prevalença de novembre

Taula 1: Prevalència de pacients i d'infeccions segons tipus d'hospital. Novembre, any 2020.

Tipus de centre	Pacients ^a		Prevalència de pacients amb alguna IRAS a l'ingrés actual ^c			Prevalència de pacients amb alguna IRAS a un ingrés anterior ^c		
	N	% Rel	N	%	[IC 95%]	N	%	[IC 95%]
Grup I	-	-	-	-	-	-	-	-
Grup II	472	29,95	27	5,72	[3,95 a 8,22]	6	1,27	[0,57 a 2,80]
Grup III	1.104	70,05	52	4,71	[3,61 a 6,13]	4	0,36	[0,14 a 0,96]
TOTAL	1.576	100,00	79	5,01	[4,04 a 6,21]	10	0,63	[0,34 a 1,18]

^aPacients N: Nombre de pacients; ^b% Rel: Percentatge de pacients per categoria; ^cPrevalència de pacients amb infecció N: Nombre de pacients amb alguna infecció; ^dPrevalència de pacients amb infecció %: Percentatge de pacients amb alguna infecció; ^ePrevalència de pacients amb infecció IC 95%: Interval de confiança del 95%

Taula 2: Distribució de pacients i prevalença d'infeccions segons la localització de la infecció. Novembre, any 2020.

Localització	Prevalència de pacients amb alguna IRAS a l'ingrés actual ^a				Prevalència de pacients amb alguna IRAS a un ingrés anterior ^a			
	N Pac.	% Prev.	N Infec.	% Rel	N Pac.	% Prev.	N Infec.	% Rel
ILQ	17	1,08	17	20,00	6	0,38	6	60,00
Urinàries	24	1,52	28	32,94	1	0,06	1	10,00
Respiratorias	27	1,71	29	34,12	3	0,19	3	30,00
Altres	5	0,32	5	5,88	0	0,00	0	0,00
Bacteriemies CV	6	0,38	6	7,06	0	0,00	0	0,00
TOTAL	79	5,01	85	100,00	10	0,63	10	100,00


^aN Pac.: Nombre de pacients amb alguna infecció del tipus especificat; ^b% Prev.: Prevalencia de la infecció segons la localització d'aquesta; ^cN Infec.: Nombre d'infeccions del tipus especificat; ^d% Rel: Percentatge sobre el total d'infeccions

Taula 3: Distribució d'antimicrobians i prevalença de pacients que prenen antimicrobians segons l'indicació. Novembre, any 2020.

Indicació	Pacients amb antimicrobians		Prescripcions d'antimicrobians	
	N	% Prev	N	% Rel
Tractament empíric	369	23,32	436	58,29
Tractament dirigit	149	9,42	186	24,87
Profilàxi quirúrgica o altres	106	6,70	111	14,84
Profilaxi mèdica	11	0,70	12	1,60
Altres indicacions	3	0,19	3	0,40
TOTAL	748		748	100,00

Un total de 631 (40,06%) pacients prenen antimicrobians.

Figura 1: Evolució de la taxa de prevalença de pacients amb alguna IRAS en funció del grup d'hospitals. Novembre del període 2007-2020.



OBJECTIU 2: Vigilància de la bacterièmia de catèter vascular

Casuística general de la vigilància de bacterièmia de catèter vascular

Taula 4: Bacterièmies dels diferents tipus de catèter segons grup d'hospital. Any 2020.

	CVC	CVCIP	CVP	TOTAL
Grup I	178 (57,23 %)	77 (24,76 %)	56 (18,01 %)	311 (40,23 %)
Grup II	190 (58,10 %)	70 (21,41 %)	67 (20,49 %)	327 (42,30 %)
Grup III	38 (36,54 %)	18 (17,31 %)	48 (46,15 %)	104 (13,45 %)
Grup IV	24 (77,42 %)	6 (19,35 %)	1 (3,23 %)	31 (4,01 %)
TOTAL	430 (55,63 %)	171 (22,12 %)	172 (22,25 %)	773 (100,00 %)

Taula 5: Bacterièmies dels diferents tipus de catèter segons àrea d'hospitalització. Any 2020.

	CVC	CVCIP	CVP	TOTAL
Àrea mèdica	112 (35,90 %)	68 (21,79 %)	132 (42,31 %)	312 (40,36 %)
Àrea de crítics	252 (78,50 %)	55 (17,13 %)	14 (4,36 %)	321 (41,53 %)
Àrea quirúrgica	66 (47,14 %)	48 (34,29 %)	26 (18,57 %)	140 (18,11 %)
TOTAL	430 (55,63 %)	171 (22,12 %)	172 (22,25 %)	773 (100,00 %)

Taula 6: Taxa de bacterièmia global segons grup d'hospital. Any 2020.

	Episodis	Estades	Taxa per 1.000 estades
Grup I	311	1.016.973	0,31
Grup II	327	1.239.794	0,26
Grup III	104	580.646	0,18
Grup IV	31	51.766	0,60
Global	773	2.889.179	0,27

Taula 7: Taxa de bacterièmia global segons tipus de catèter. Any 2020.

	Episodis	Estades	Taxa per 1.000 estades
CVC	430	2.889.179	0,15
CVCIP	171	2.889.179	0,06
CVP	172	2.889.179	0,06
Global	773	2.889.179	0,27

Figura 2: Taxes de bacterièmia global dels centres participants, estratificades per grup d'hospital. Any 2020.




Figura 3: Evolució de les taxes de bacterièmia globals ajustades per grup d'hospital.
Període 2007-2020.




Figura 4: Evolució de les taxes de bacterièmia globals ajustades per àrea d'hospitalització.
Període 2007-2020.





Figura 5: Evolució de les taxes de bacterièmia globals ajustades per tipus de catèter.
Període 2007-2020.



Bacterièmies de CVC


Taula 8: Taxes de bacterièmia de CVC segons grup d'hospital. Any 2020.

	Episodis	Estades	Taxa per 1.000 estades
Grup I	178	1.016.973	0,18
Grup II	190	1.239.794	0,15
Grup III	38	580.646	0,07
Grup IV	24	51.766	0,46
Global	430	2.889.179	0,15

Taula 9: Taxes de bacterièmia de CVC segons àrea d'hospitalització. Any 2020.

	Episodis	Estades	Taxa per 1.000 estades
Mèdica	112	1.624.187	0,07
Quirúrgica	66	1.055.651	0,06
UCI	252	209.341	1,20
Global	430	2.889.179	0,15

Figura 6: Evolució de les taxes de bacterièmia de CVC ajustades per grup d'hospital. Període 2007-2020.



Bacterièmies de CVCIP


Taula 10: Taxes de bacterièmia de CVCIP segons grup d'hospital. Any 2020.

	Episodis	Estades	Taxa per 1.000 estades
Grup I	77	1.016.973	0,08
Grup II	70	1.239.794	0,06
Grup III	18	580.646	0,03
Grup IV	6	51.766	0,12
Global	171	2.889.179	0,06

Taula 11: Taxes de bacterièmia de CVCIP segons àrea d'hospitalització. Any 2020.

	Episodis	Estades	Taxa per 1.000 estades
Mèdica	68	1.624.187	0,04
Quirúrgica	48	1.055.651	0,05
UCI	55	209.341	0,26
Global	171	2.889.179	0,06

Figura 7: Evolució de les taxes de bacterièmia de CVCIP ajustades per grup d'hospital. Període 2007-2020.



Bacterièmies de CVP


Taula 12: Taxes de bacterièmia de CVP segons grup d'hospital. Any 2020.

	Episodis	Estades	Taxa per 1.000 estades
Grup I	56	1.016.973	0,06
Grup II	67	1.239.794	0,05
Grup III	48	580.646	0,08
Grup IV	1	51.766	0,02
Global	172	2.889.179	0,06

Taula 13: Taxes de bacterièmia de CVP segons àrea d'hospitalització. Any 2020.

	Episodis	Estades	Taxa per 1.000 estades
Mèdica	132	1.624.187	0,08
Quirúrgica	26	1.055.651	0,02
UCI	14	209.341	0,07
Global	172	2.889.179	0,06

Figura 8: Evolució de les taxes de bacterièmia de CVP ajustades per grup d'hospital. Període 2007-2020.




Bacterièmies de catèter utilitzat per a la nutrició parenteral (NTP)

Taula 14: Taxes de bacterièmia de catèter utilitzat per a la nutrició parenteral (NTP) segons grup d'hospital. Any 2020.

	Episodis	Dies de NTP	Taxa per 1.000 dies de NTP
Grup I	68	36.619	1,86
Grup II	64	36.459	1,76
Grup III	21	9.367	2,24
Grup IV	4	1.195	3,35
Global	157	83.640	1,88

Figura 9: Evolució de les taxes de bacterièmia de catèter utilitzat per a la nutrició parenteral (NTP) ajustades per grup d'hospital. Període 2007-2020.



Microorganismes responsables de les bacteriemies

Taula 15: Microorganismes responsables de les bacteriemies de catèter vascular. Any 2020.

Família/Grup de microorganisme	Tipus de catèter			
	CVC	CVP	CVCIP	GLOBAL
ALTRES	2 (0,42%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	2 (0,24%)
Altres microorganismes	2 (0,42%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	2 (0,24%)
BACILS GRAM NEGATIUS	104 (22,08%)	24 (13,33%)	46 (46,00%)	174 (20,84%)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	27 (5,73%)	7 (3,89%)	13 (13,00%)	47 (5,63%)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	31 (6,58%)	0 (0,00%)	8 (8,00%)	39 (4,67%)
<i>Enterobacter cloacae</i>	12 (2,55%)	4 (2,22%)	1 (1,00%)	17 (2,04%)
<i>Serratia marcescens</i>	6 (1,27%)	4 (2,22%)	7 (7,00%)	17 (2,04%)
<i>Klebsiella spp.</i>	7 (1,49%)	1 (0,56%)	6 (6,00%)	14 (1,68%)
<i>Escherichia coli</i>	5 (1,06%)	1 (0,56%)	4 (4,00%)	10 (1,20%)
<i>Klebsiella oxytoca</i>	4 (0,85%)	3 (1,67%)	2 (2,00%)	9 (1,08%)
<i>Enterobacter aerogenes</i>	4 (0,85%)	1 (0,56%)	1 (1,00%)	6 (0,72%)
<i>Citrobacter freundii</i>	0 (0,00%)	0 (0,00%)	3 (3,00%)	3 (0,36%)
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	3 (0,64%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	3 (0,36%)
<i>Acinetobacter baumannii</i>	1 (0,21%)	0 (0,00%)	1 (1,00%)	2 (0,24%)
<i>Citrobacter diversus</i>	1 (0,21%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	1 (0,12%)
<i>Enterobacter agglomerans</i>	0 (0,00%)	1 (0,56%)	0 (0,00%)	1 (0,12%)
<i>Haemophilus influenzae</i>	0 (0,00%)	1 (0,56%)	0 (0,00%)	1 (0,12%)
<i>Morganella morgagni</i>	1 (0,21%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	1 (0,12%)
<i>Proteus mirabilis</i>	1 (0,21%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	1 (0,12%)
<i>Pseudomonas spp.</i>	0 (0,00%)	1 (0,56%)	0 (0,00%)	1 (0,12%)
<i>Serratia spp.</i>	1 (0,21%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	1 (0,12%)
BACILS GRAM POSITIUS	1 (0,21%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	1 (0,12%)
<i>Corynebacterium spp.</i>	1 (0,21%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	1 (0,12%)
COCS GRAM POSITIUS	341 (72,40%)	152 (84,44%)	117 (117,00%)	610 (73,05%)
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	177 (37,58%)	27 (15,00%)	53 (53,00%)	257 (30,78%)
<i>S. aureus</i> sensible a la meticilina	27 (5,73%)	90 (50,00%)	19 (19,00%)	136 (16,29%)
<i>Enterococcus faecalis</i>	57 (12,10%)	3 (1,67%)	8 (8,00%)	68 (8,14%)
<i>S. coagulasa negatiu</i>	23 (4,88%)	12 (6,67%)	14 (14,00%)	49 (5,87%)
<i>Staphylococcus spp.</i>	18 (3,82%)	9 (5,00%)	14 (14,00%)	41 (4,91%)
<i>S. aureus</i> resistent a la meticilina (SARM)	17 (3,61%)	11 (6,11%)	4 (4,00%)	32 (3,83%)
<i>Enterococcus faecium</i>	17 (3,61%)	0 (0,00%)	4 (4,00%)	21 (2,51%)

Taula 15: Microorganismes responsables de les bacteriemies de catèter vascular. Any 2020.

Família/Grup de microorganisme	Tipus de catèter			
	CVC	CVP	CVCIP	GLOBAL
<i>S. lugdunensis</i>	1 (0,21%)	0 (0,00%)	1 (1,00%)	2 (0,24%)
<i>Streptococcus agalactiae</i>	2 (0,42%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	2 (0,24%)
<i>Streptococcus mitis</i>	1 (0,21%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	1 (0,12%)
<i>Streptococcus</i> (grup viridans)	1 (0,21%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	1 (0,12%)
FONGS	23 (4,88%)	4 (2,22%)	21 (21,00%)	48 (5,75%)
<i>Candida albicans</i>	14 (2,97%)	3 (1,67%)	9 (9,00%)	26 (3,11%)
<i>Candida</i> spp.	9 (1,91%)	1 (0,56%)	12 (12,00%)	22 (2,63%)
TOTAL	471	184	180	835

* El nombre total de microorganismes és superior al total d'episodis per què s'incorporen els d'etologia polimicrobiana (els microorganismes 1 i 2).


OBJECTIU 3: Vigilància de la Infecció de Localització Quirúrgica (ILQ)

Cirurgia de Colon

Taula 16: Nombre i percentatge d'intervencions i d'infeccions a cirurgia de colon, segons diferents característiques. Any 2020.

	Global VINCat		Grup 1		Grup 2		Grup 3		
	N	%	N	%	N	%	N	%	
IQs (N)	2.513	-	822	-	984	-	707	-	
Nº centres participants	47	-	9	-	16	-	22	-	
Sexe (Dona)	1.121	44,60	378	46,00	436	44,30	307	43,40	
Punt per duració IQ > P75	1.043	41,50	400	48,70	351	35,70	292	41,30	
NISS:	-1,0	1.803	71,70	578	70,30	740	75,20	485	68,60
	1	609	24,20	198	24,10	217	22,10	194	27,40
	>=2	101	4,00	46	5,60	27	2,70	28	4,00
Profilaxis ATB adequada	2.093	83,30	711	86,50	805	81,80	577	81,60	
Cirurgia endoscòpica	1.936	77,00	671	81,60	790	80,30	475	67,20	
ILQ	174	6,90	50	6,10	69	7,00	55	7,80	
Percentils:	25	-	5,00	-	6,00	-	5,70	-	3,90
	75	-	8,80	-	6,70	-	7,70	-	12,90
Superficial	43	1,70	6	0,70	21	2,10	16	2,30	
Profunda	18	0,70	3	0,40	7	0,70	8	1,10	
Òrgan-Espai	112	4,50	41	5,00	41	4,20	30	4,20	
ILQ (N)	174	-	50	-	69	-	55	-	
Superficial	43	24,90	6	12,00	21	30,40	16	29,60	
Profunda	18	10,40	3	6,00	7	10,10	8	14,80	
Òrgan-Espai	112	64,70	41	82,00	41	59,40	30	55,60	
Detecció ILQ:	Ingrés	120	69,40	34	68,00	49	71,00	37	68,50
	Reingrés	27	15,60	9	18,00	11	15,90	7	13,00
Vigilància post-alta		26	15,00	7	14,00	9	13,00	10	18,50

Figura 10: Taxes globals d'ILQ a cirurgia de colon dels centres participants, estratificades per grup d'hospitalització



Taula 17: Microorganismes responsables de la ILQ a cirurgia de colon. Any 2020.

Família/Grup de microorganisme	N	%
ANAEROBIS	5	2,37
<i>Bacteroides</i> spp.	2	0,95
<i>Bacteroides</i> grup fragilis	2	0,95
<i>Clostridium</i> spp.	1	0,47
BACILS GRAM NEGATIUS	86	40,76
<i>Escherichia coli</i>	48	22,75
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	9	4,27
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9	4,27
<i>Proteus mirabilis</i>	7	3,32
<i>Enterobacter cloacae</i>	4	1,90
<i>Enterobacter aerogenes</i>	2	0,95
<i>Morganella morgagni</i>	2	0,95
<i>Citrobacter diversus</i>	1	0,47
<i>Citrobacter</i> spp.	1	0,47
<i>Klebsiella</i> spp.	1	0,47
<i>Serratia marcescens</i>	1	0,47
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	1	0,47
BACILS GRAM POSITIUS	1	0,47
<i>Corynebacterium</i> spp.	1	0,47
COCS GRAM POSITIUS	61	28,91
<i>Enterococcus faecalis</i>	28	13,27
<i>Enterococcus faecium</i>	17	8,06
<i>S. aureus</i> sensible a la meticilina	3	1,42
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	3	1,42
<i>S. aureus</i> resistent a la meticilina (SARM)	2	0,95
<i>S. coagulasa negatiu</i>	2	0,95
<i>Streptococcus anginosus</i>	2	0,95
<i>Enterococcus</i> spp.	1	0,47
<i>S. lugdunensis</i>	1	0,47
<i>Staphylococcus</i> spp.	1	0,47
<i>Streptococcus</i> (grup viridans)	1	0,47
CULTIUS NEGATIUS	5	2,37
A.B. <i>Cultius negatus</i>	5	2,37

Taula 17: Microorganismes responsables de la ILQ a cirurgia de colon. Any 2020.


Família/Grup de microorganisme	N	%
CULTIUS NO PRACTICATS	43	20,38
A.A. Cultius no practicats	43	20,38
FONGS	5	2,37
<i>Candida albicans</i>	5	2,37
IGUAL O MÉS DE 3 GÈRMENS	5	2,37
igual o més de 3 gèrmens	5	2,37
TOTAL	211	

* El nombre total de microorganismes és superior al total d'episodis per què s'incorporen els d'etologia polimicrobiana (els microorganismes 1 i 2).

Taula 18: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a cirurgia de colon. Període 2011-2020.

Any	ILQ Global				ILQ d'òrgan i espai		
	N IQ	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]
2011	2.362	471	19,94	[18,38 a 21,60]	209	8,85	[7,77 a 10,06]
2012	2.416	427	17,67	[16,20 a 19,25]	203	8,40	[7,36 a 9,58]
2013	2.482	394	15,87	[14,49 a 17,37]	210	8,46	[7,43 a 9,62]
2014	2.563	422	16,47	[15,08 a 17,95]	193	7,53	[6,57 a 8,62]
2015	3.023	455	15,05	[13,82 a 16,37]	237	7,84	[6,93 a 8,85]
2016	3.415	393	11,51	[10,48 a 12,62]	213	6,24	[5,47 a 7,10]
2017	3.385	342	10,10	[9,13 a 11,17]	160	4,73	[4,06 a 5,50]
2018	3.295	288	8,74	[7,82 a 9,75]	167	5,07	[4,37 a 5,87]
2019	3.105	238	7,67	[6,78 a 8,65]	142	4,57	[3,89 a 5,37]
2020	2.531	175	6,91	[5,99 a 7,97]	112	4,43	[3,69 a 5,30]
TOTAL	33.081	3.899	11,79	[11,44 a 12,14]	2.025	6,12	[5,87 a 6,38]

Figura 11: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a cirurgia de colon. Període 2011-2020.




Cirurgia de Recte

Taula 19: Nombre i percentatge d'intervencions i d'infeccions a cirurgia de recte, segons diferents característiques. Any 2020.

	Global VINCat		Grup 1		Grup 2		Grup 3		
	N	%	N	%	N	%	N	%	
IQs (N)	867	-	436	-	315	-	116	-	
Nº centres participants	28	-	9	-	12	-	7	-	
Sexe (Dona)	306	35,30	152	34,90	112	35,60	42	36,20	
Punt per duració IQ > P75	375	43,30	230	52,80	106	33,70	39	33,60	
NISS:	-1,0	611	70,50	283	64,90	240	76,20	88	75,90
	1	215	24,80	129	29,60	59	18,70	27	23,30
	>=2	41	4,70	24	5,50	16	5,10	1	0,90
Profilaxis ATB adequada	734	84,70	378	86,70	260	82,50	96	82,80	
Cirurgia endoscòpica	689	79,50	353	81,00	247	78,40	89	76,70	
ILQ	102	11,80	51	11,70	40	12,70	11	9,50	
Percentils:	25	-	5,60	-	5,00	-	5,80	-	5,20
	75	-	15,10	-	12,80	-	15,90	-	14,20
Superficial	17	2,00	10	2,30	6	1,90	1	0,90	
Profunda	16	1,80	4	0,90	9	2,90	3	2,60	
Òrgan-Espai	69	8,00	37	8,50	25	7,90	7	6,00	
ILQ (N)	102	-	51	-	40	-	11	-	
Superficial	17	16,70	10	19,60	6	15,00	1	9,10	
Profunda	16	15,70	4	7,80	9	22,50	3	27,30	
Òrgan-Espai	69	67,60	37	72,50	25	62,50	7	63,60	
Detecció ILQ:	Ingrés	62	61,40	34	68,00	23	57,50	5	45,50
	Reingrés	26	25,70	13	26,00	9	22,50	4	36,40
Vigilància post-alta		13	12,90	3	6,00	8	20,00	2	18,20

Figura 12: Taxes globals d'ILQ a cirurgia de recte, estratificades per grup d'hospital. Any 2020.



Taula 20: Microorganismes responsables de la ILQ a cirurgia de recte. Any 2020.

Família/Grup de microorganisme	N	%
ALTRES	1	0,82
<i>Propionibacterium</i> spp.	1	0,82
ANAEROBIS	3	2,46
<i>Bacteroides</i> spp.	1	0,82
<i>Fusobacterium</i> spp.	1	0,82
<i>Bacteroides</i> grup fragilis	1	0,82
BACILS GRAM NEGATIUS	42	34,43
<i>Escherichia coli</i>	15	12,30
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	11	9,02
<i>Proteus mirabilis</i>	4	3,28
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	3	2,46
<i>Morganella morgagni</i>	2	1,64
<i>Acinetobacter</i> spp.	1	0,82
<i>Citrobacter</i> spp.	1	0,82
<i>Enterobacter cloacae</i>	1	0,82
<i>Enterobacter</i> spp.	1	0,82
<i>Klebsiella oxytoca</i>	1	0,82
<i>Serratia marcescens</i>	1	0,82
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	1	0,82
COCS GRAM POSITIUS	41	33,61
<i>Enterococcus faecium</i>	15	12,30
<i>Enterococcus faecalis</i>	14	11,48
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	3	2,46
<i>Streptococcus anginosus</i>	3	2,46
<i>S. aureus</i> sensible a la meticilina	2	1,64
<i>S. aureus</i> resistent a la meticilina (SARM)	1	0,82
<i>S. lugdunensis</i>	1	0,82
<i>Staphylococcus</i> spp.	1	0,82
<i>Streptococcus</i> (grup viridans)	1	0,82
CULTIUS NEGATIUS	1	0,82
A.B. Cultius negatius	1	0,82
CULTIUS NO PRACTICATS	24	19,67
A.A. Cultius no practicats	24	19,67

Taula 20: Microorganismes responsables de la ILQ a cirurgia de recte. Any 2020.


Família/Grup de microorganisme	N	%
FONGS	7	5,74
<i>Candida albicans</i>	6	4,92
<i>Candida</i> spp.	1	0,82
IGUAL O MÉS DE 3 GÈRMENS	3	2,46
igual o més de 3 gèrmens	3	2,46
TOTAL	122	

* El nombre total de microorganismes és superior al total d'episodis per què s'incorporen els d'etologia polimicrobiana (els microorganismes 1 i 2).

Taula 21: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a cirurgia de recte. Període 2011-2020.

Any	ILQ Global				ILQ d'òrgan i espai		
	N IQ	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]
2011	1.033	232	22,46	[20,02 a 25,11]	105	10,16	[8,46 a 12,16]
2012	1.031	231	22,41	[19,96 a 25,05]	107	10,38	[8,66 a 12,39]
2013	1.090	223	20,46	[18,17 a 22,96]	124	11,38	[9,62 a 13,40]
2014	1.049	208	19,83	[17,52 a 22,35]	111	10,58	[8,86 a 12,59]
2015	1.150	234	20,35	[18,12 a 22,78]	132	11,48	[9,76 a 13,45]
2016	1.292	200	15,48	[13,61 a 17,56]	105	8,13	[6,76 a 9,75]
2017	1.280	187	14,61	[12,78 a 16,65]	104	8,12	[6,75 a 9,75]
2018	1.189	179	15,05	[13,13 a 17,20]	112	9,42	[7,88 a 11,22]
2019	1.091	126	11,55	[9,78 a 13,59]	74	6,78	[5,43 a 8,44]
2020	899	108	12,01	[10,04 a 14,31]	71	7,90	[6,30 a 9,85]
TOTAL	12.635	2.099	16,61	[15,97 a 17,27]	1.168	9,24	[8,75 a 9,76]

Figura 13: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a cirurgia de recte. Període 2011-2020.




Cirurgia de Genoll

Taula 22: Nombre i percentatge d'intervencions i d'infeccions a cirurgia de genoll, segons diferents característiques. Any 2020.

	Global VINCat		Grup 1		Grup 2		Grup 3		
	N	%	N	%	N	%	N	%	
IQs (N)	6.164	-	1.280	-	2.659	-	2.225	-	
Nº centres participants	58	-	9	-	17	-	32	-	
Sexe (Dona)	4.034	65,40	835	65,20	1.792	67,40	1.407	63,20	
Punt per duració IQ > P75	583	9,50	202	15,80	179	6,70	202	9,10	
NISS:									
-1,0	4.232	68,70	798	62,30	1.958	73,60	1.476	66,30	
1	1.765	28,60	418	32,70	660	24,80	687	30,90	
>=2	167	2,70	64	5,00	41	1,50	62	2,80	
Profilaxis ATB adequada	5.551	90,10	1.140	89,10	2.418	90,90	1.993	89,60	
Cirurgia endoscòpica	6	0,10	0	0,00	4	0,20	2	0,10	
ILQ	96	1,60	25	2,00	42	1,60	29	1,30	
Percentils:									
25	-	0,00	-	1,40	-	0,90	-	0,00	
75	-	2,50	-	3,30	-	2,50	-	1,70	
Superficial	38	0,60	8	0,60	15	0,60	15	0,70	
Profunda	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Òrgan-Espai	57	0,90	17	1,30	27	1,00	13	0,60	
ILQ (N)	96	-	25	-	42	-	29	-	
Superficial	38	40,00	8	32,00	15	35,70	15	53,60	
Profunda	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Òrgan-Espai	57	60,00	17	68,00	27	64,30	13	46,40	
Detecció ILQ:	Ingrés	10	10,30	1	4,00	2	4,70	7	24,10
	Reingrés	47	48,50	15	60,00	20	46,50	12	41,40
Vigilància post-alta		40	41,20	9	36,00	21	48,80	10	34,50

Figura 14: Taxes globals d'ILQ a cirurgia de genoll dels centres participants, estratificades per grup d'hospital



Taula 23: Microorganismes responsables de la ILQ a cirurgia de genoll. Any 2020.


Família/Grup de microorganisme	N	%
ALTRES	3	3,33
Altres	2	2,22
<i>Propionibacterium</i> spp.	1	1,11
BACILS GRAM NEGATIUS	30	33,33
<i>Enterobacter cloacae</i>	6	6,67
<i>Escherichia coli</i>	6	6,67
<i>Proteus mirabilis</i>	5	5,56
<i>Morganella morgagni</i>	4	4,44
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	4	4,44
<i>Aeromonas hydrophila</i>	1	1,11
<i>Citrobacter freundii</i>	1	1,11
<i>Klebsiella oxytoca</i>	1	1,11
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1	1,11
<i>Pseudomonas</i> spp.	1	1,11
COCS GRAM POSITIUS	49	54,44
<i>S. aureus</i> sensible a la meticilina	18	20,00
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	14	15,56
<i>Enterococcus faecalis</i>	5	5,56
<i>S. aureus</i> resistent a la meticilina (SARM)	5	5,56
<i>Staphylococcus</i> spp.	3	3,33
<i>Streptococcus</i> (grup viridans)	2	2,22
<i>S. lugdunensis</i>	1	1,11
<i>Streptococcus agalactiae</i>	1	1,11
CULTIUS NEGATIUS	1	1,11
A.B. Cultius negatius	1	1,11
CULTIUS NO PRACTICATS	7	7,78
A.A. Cultius no practicats	7	7,78
TOTAL	90	

* El nombre total de microorganismes és superior al total d'episodis per què s'incorporen els d'etologia polimicrobiana (els microorganismes 1 i 2).

Taula 24: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a cirurgia de genoll. Període 2007-2020.

Any	ILQ Global				ILQ d'òrgan i espai		
	N IQ	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]
2007	2.043	49	2,40	[1,82 a 3,16]	10	0,49	[0,26 a 0,91]
2008	2.614	97	3,71	[3,05 a 4,51]	33	1,26	[0,90 a 1,77]
2009	3.085	88	2,85	[2,32 a 3,50]	29	0,94	[0,65 a 1,35]
2010	3.227	91	2,82	[2,30 a 3,45]	35	1,08	[0,78 a 1,51]
2011	2.953	75	2,54	[2,03 a 3,17]	28	0,95	[0,66 a 1,37]
2012	3.440	83	2,41	[1,95 a 2,98]	38	1,10	[0,80 a 1,51]
2013	3.777	83	2,20	[1,78 a 2,72]	35	0,93	[0,67 a 1,29]
2014	4.483	103	2,30	[1,90 a 2,78]	49	1,09	[0,83 a 1,44]
2015	4.272	103	2,41	[1,99 a 2,92]	60	1,40	[1,09 a 1,80]
2016	4.452	98	2,20	[1,81 a 2,68]	60	1,35	[1,05 a 1,73]
2017	4.848	106	2,19	[1,81 a 2,64]	56	1,16	[0,89 a 1,50]
2018	4.792	113	2,36	[1,96 a 2,83]	68	1,42	[1,12 a 1,80]
2019	4.926	103	2,09	[1,73 a 2,53]	57	1,16	[0,89 a 1,50]
2020	3.895	86	2,21	[1,79 a 2,72]	45	1,16	[0,86 a 1,54]
TOTAL	60.345	1.395	2,31	[2,19 a 2,43]	677	1,12	[1,04 a 1,21]

Figura 15: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a cirurgia de genoll. Període 2007-2020.




Cirurgia de Maluc

Taula 25: Nombre i percentatge d'intervencions i d'infeccions a cirurgia de maluc, segons diferents característiques. Any 2020.

	Global VINCat		Grup 1		Grup 2		Grup 3	
	N	%	N	%	N	%	N	%
IQs (N)	3.863	-	898	-	1.620	-	1.345	-
Nº centres participants	54	-	9	-	17	-	28	-
Sexe (Dona)	1.695	43,90	407	45,30	686	42,30	602	44,80
Punt per duració IQ > P75	380	9,80	130	14,50	134	8,30	116	8,60
NISS:								
-1,0	2.691	69,70	580	64,60	1.192	73,60	919	68,30
1	1.072	27,80	270	30,10	403	24,90	399	29,70
>=2	100	2,60	48	5,30	25	1,50	27	2,00
Profilaxis ATB adequada	3.343	86,50	788	87,80	1.366	84,30	1.189	88,40
Cirurgia endoscòpica	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ILQ	84	2,20	25	2,80	29	1,80	30	2,20
Percentils:								
25	-	0,00	-	1,00	-	0,00	-	0,00
75	-	3,00	-	3,90	-	2,20	-	2,90
Superficial	27	0,70	10	1,10	8	0,50	9	0,70
Profunda	10	0,30	1	0,10	2	0,10	7	0,50
Òrgan-Espai	44	1,10	14	1,60	18	1,10	12	0,90
ILQ (N)	84	-	25	-	29	-	30	-
Superficial	27	33,30	10	40,00	8	28,60	9	32,10
Profunda	10	12,30	1	4,00	2	7,10	7	25,00
Òrgan-Espai	44	54,30	14	56,00	18	64,30	12	42,90
Detecció ILQ:								
Ingrés	9	10,80	3	12,00	5	17,90	1	3,30
Reingrés	45	54,20	12	48,00	14	50,00	19	63,30
Vigilància post-alta	29	34,90	10	40,00	9	32,10	10	33,30

Figura 16: Taxes globals d'ILQ a cirurgia de maluc dels centres participants, estratificades per grup d'hospitalització. Any 2020.



Taula 26: Microorganismes responsables de la ILQ a cirurgia de maluc. Any 2020.


Família/Grup de microorganisme	N	%
ALTRES	1	1,09
<i>Propionibacterium</i> spp.	1	1,09
BACILS GRAM NEGATIUS	31	33,70
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	10	10,87
<i>Escherichia coli</i>	4	4,35
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	4,35
<i>Enterobacter cloacae</i>	3	3,26
<i>Proteus mirabilis</i>	3	3,26
<i>Morganella morgagnii</i>	2	2,17
<i>Pseudomonas</i> spp.	2	2,17
<i>Aeromonas</i> spp.	1	1,09
<i>Klebsiella oxytoca</i>	1	1,09
<i>Proteus vulgaris</i>	1	1,09
COCS GRAM POSITIUS	45	48,91
<i>S. aureus</i> sensible a la meticilina	16	17,39
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	13	14,13
<i>Enterococcus faecalis</i>	4	4,35
<i>S. coagulasa negatiu</i>	4	4,35
<i>S. lugdunensis</i>	3	3,26
<i>Staphylococcus</i> spp.	3	3,26
<i>Streptococcus agalactiae</i>	2	2,17
CULTIUS NEGATIUS	5	5,43
A.B. Cultius negatius	5	5,43
CULTIUS NO PRACTICATS	10	10,87
A.A. Cultius no practicats	10	10,87
TOTAL	92	

* El nombre total de microorganismes és superior al total d'episodis per què s'incorporen els d'etologia polimicrobiana (els microorganismes 1 i 2).

Taula 27: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a cirurgia de maluc. Període 2007-2020.

Any	ILQ Global				ILQ d'òrgan i espai		
	N IQ	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]
2007	4.488	162	3,61	[3,10 a 4,20]	46	1,02	[0,77 a 1,37]
2008	5.654	176	3,11	[2,69 a 3,60]	59	1,04	[0,81 a 1,34]
2009	6.334	217	3,43	[3,01 a 3,90]	76	1,20	[0,96 a 1,50]
2010	6.868	224	3,26	[2,87 a 3,71]	92	1,34	[1,09 a 1,64]
2011	5.520	141	2,55	[2,17 a 3,01]	57	1,03	[0,80 a 1,34]
2012	6.527	174	2,67	[2,30 a 3,09]	65	1,00	[0,78 a 1,27]
2013	7.073	182	2,57	[2,23 a 2,97]	95	1,34	[1,10 a 1,64]
2014	8.002	209	2,61	[2,28 a 2,99]	103	1,29	[1,06 a 1,56]
2015	8.609	173	2,01	[1,73 a 2,33]	102	1,18	[0,98 a 1,44]
2016	9.013	176	1,95	[1,69 a 2,26]	99	1,10	[0,90 a 1,34]
2017	10.102	179	1,77	[1,53 a 2,05]	109	1,08	[0,90 a 1,30]
2018	9.465	189	2,00	[1,73 a 2,30]	119	1,26	[1,05 a 1,50]
2019	9.505	160	1,68	[1,44 a 1,96]	80	0,84	[0,68 a 1,05]
2020	6.173	97	1,57	[1,29 a 1,91]	58	0,94	[0,73 a 1,21]
TOTAL	115.330	2.626	2,28	[2,19 a 2,36]	1.257	1,09	[1,03 a 1,15]

Figura 17: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a cirurgia de maluc. Període 2007-2020.




Hemiarthroplàstia de maluc

Taula 28: Nombre i percentatge d'intervencions i d'infeccions a cirurgia d'hemiarthroplàstia de maluc, segons diferents característiques. Any 2020.

	Global VINCat		Grup 1		Grup 2		Grup 3		
	N	%	N	%	N	%	N	%	
IQs (N)	727	-	369	-	194	-	164	-	
Nº centres participants	12	-	4	-	3	-	5	-	
Sexe (Dona)	531	73,00	257	69,60	158	81,40	116	70,70	
Punt per duració IQ > P75	49	6,70	29	7,90	13	6,70	7	4,30	
NISS:									
-1,0	208	28,60	101	27,40	39	20,10	68	41,50	
1	489	67,30	251	68,00	145	74,70	93	56,70	
>=2	30	4,10	17	4,60	10	5,20	3	1,80	
Profilaxis ATB adequada	567	78,00	305	82,70	133	68,60	129	78,70	
Cirurgia endoscòpica	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
ILQ	19	2,60	11	3,00	5	2,60	3	1,80	
Percentils:									
25	25	-	0,00	-	1,40	-	1,10	-	
75	75	-	3,80	-	3,60	-	3,60	-	
Superficial	3	0,40	3	0,80	0	0,00	0	0,00	
Profunda	4	0,60	1	0,30	1	0,50	2	1,20	
Òrgan-Espai	12	1,70	7	1,90	4	2,10	1	0,60	
ILQ (N)	19	-	11	-	5	-	3	-	
Superficial	3	15,80	3	27,30	0	0,00	0	0,00	
Profunda	4	21,10	1	9,10	1	20,00	2	66,70	
Òrgan-Espai	12	63,20	7	63,60	4	80,00	1	33,30	
Detecció ILQ:	Ingrés	3	15,80	1	9,10	1	20,00	1	33,30
	Reingrés	12	63,20	7	63,60	3	60,00	2	66,70
Vigilància post-alta		4	21,10	3	27,30	1	20,00	0	0,00

Figura 18: Taxes globals d'ILQ a cirurgia d'hemiarthroplàstia de maluc dels centres participants, estratificat per grup d'hospital. Any 2020.



Taula 29: Microorganismes responsables de la ILQ a hemiartroplàstia de maluc. Any 2020.


Família/Grup de microorganisme	N	%
ALTRES	2	8,00
Altres	2	8,00
ANAEROBIS	1	4,00
<i>Clostridium</i> spp.	1	4,00
BACILS GRAM NEGATIUS	14	56,00
<i>Proteus mirabilis</i>	4	16,00
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	3	12,00
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	3	12,00
<i>Enterobacter cloacae</i>	2	8,00
<i>Morganella morgagni</i>	2	8,00
COCS GRAM POSITIUS	7	28,00
<i>S. aureus</i> resistent a la meticilina (SARM)	2	8,00
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	2	8,00
<i>Enterococcus faecalis</i>	1	4,00
<i>S. coagulasa negatiu</i>	1	4,00
<i>Staphylococcus</i> spp.	1	4,00
CULTIUS NO PRACTICATS	1	4,00
A.A. Cultius no practicats	1	4,00
TOTAL	25	

* El nombre total de microorganismes és superior al total d'episodis per què s'incorporen els d'etologia polimicrobiana (els microorganismes 1 i 2).

Taula 30: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a cirurgia d'hemiartroplàstia de maluc. Període 2008-2020.

Any	ILQ Global				ILQ d'òrgan i espai		
	N IQ	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]
2008	146	7	4,79	[2,30 a 9,74]	2	1,37	[0,34 a 5,33]
2009	459	31	6,75	[4,79 a 9,45]	21	4,58	[3,00 a 6,92]
2010	466	22	4,72	[3,13 a 7,07]	16	3,43	[2,11 a 5,53]
2011	691	35	5,07	[3,66 a 6,98]	22	3,18	[2,10 a 4,79]
2012	707	42	5,94	[4,42 a 7,94]	27	3,82	[2,63 a 5,51]
2013	812	32	3,94	[2,80 a 5,52]	24	2,96	[1,99 a 4,37]
2014	851	27	3,17	[2,18 a 4,59]	18	2,12	[1,34 a 3,33]
2015	942	33	3,50	[2,50 a 4,89]	28	2,97	[2,06 a 4,27]
2016	887	33	3,72	[2,66 a 5,19]	27	3,04	[2,10 a 4,40]
2017	1.115	25	2,24	[1,52 a 3,30]	16	1,43	[0,88 a 2,33]
2018	1.046	33	3,15	[2,25 a 4,41]	24	2,29	[1,54 a 3,40]
2019	975	18	1,85	[1,17 a 2,91]	8	0,82	[0,41 a 1,63]
2020	737	20	2,71	[1,76 a 4,17]	12	1,63	[0,93 a 2,85]
TOTAL	11.377	397	3,49	[3,17 a 3,84]	274	2,41	[2,14 a 2,71]

Figura 19: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a cirurgia d'hemiartroplàstia de maluc. Període 2008-2020.




Cesàries

Taula 31: Nombre i percentatge d'intervencions i d'infeccions a cesàries, segons diferents característiques. Any 2020.

	Global VINCat		Grup 1		Grup 2		Grup 3		
	N	%	N	%	N	%	N	%	
IQs (N)	1.856	-	101	-	672	-	1.083	-	
Nº centres participants	15	-	1	-	5	-	9	-	
Sexe (Dona)	1.856	100,00	101	100,00	672	100,00	1.083	100,00	
Punt per duració IQ > P75	426	23,00	17	16,80	161	24,00	248	22,90	
NISS:	-1,0	72,80	80	79,20	486	72,30	785	72,50	
		475	25,60	21	20,80	174	25,90	280	25,90
	>=2	30	1,60	0	0,00	12	1,80	18	1,70
Profilaxis ATB adequada	1.217	65,60	57	56,40	388	57,70	772	71,30	
Cirurgia endoscòpica	1	0,10	0	0,00	0	0,00	1	0,10	
ILQ	46	2,50	5	5,00	14	2,10	27	2,50	
Percentils:	25	-	1,90	-	5,00	-	2,00	-	
		-	4,00	-	5,00	-	2,20	-	
Superficial	33	1,80	5	5,00	13	1,90	15	1,40	
Profunda	8	0,40	0	0,00	0	0,00	8	0,70	
Òrgan-Espai	5	0,30	0	0,00	1	0,10	4	0,40	
ILQ (N)	46	-	5	-	14	-	27	-	
Superficial	33	71,70	5	100,00	13	92,90	15	55,60	
Profunda	8	17,40	0	0,00	0	0,00	8	29,60	
Òrgan-Espai	5	10,90	0	0,00	1	7,10	4	14,80	
Detecció ILQ:	Ingrés	6	14,00	1	20,00	1	7,10	4	16,70
	Reingrés	11	25,60	1	20,00	5	35,70	5	20,80
Vigilància post-alta	26	60,50	3	60,00	8	57,10	15	62,50	

Figura 20: Taxes globals d'ILQ a cesàries dels centres participants, estratificades per grup d'hospital. Any 2020.



Taula 32: Microorganismes responsables de la ILQ a cesàries. Any 2020.


Família/Grup de microorganisme	N	%
ALTRES	3	9,09
Altres	3	9,09
BACILS GRAM NEGATIUS	8	24,24
<i>Escherichia coli</i>	3	9,09
<i>Citrobacter</i> spp.	1	3,03
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1	3,03
<i>Morganella morgagni</i>	1	3,03
<i>Proteus mirabilis</i>	1	3,03
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1	3,03
COCS GRAM POSITIUS	8	24,24
<i>S. aureus</i> sensible a la meticilina	4	12,12
<i>Enterococcus faecalis</i>	1	3,03
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	1	3,03
<i>Staphylococcus</i> spp.	1	3,03
<i>Streptococcus anginosus</i>	1	3,03
CULTIUS NEGATIUS	1	3,03
A.B. Cultius negatius	1	3,03
CULTIUS NO PRACTICATS	11	33,33
A.A. Cultius no practicats	11	33,33
IGUAL O MÉS DE 3 GÈRMENS	2	6,06
igual o més de 3 gèrmens	2	6,06
TOTAL	33	

* El nombre total de microorganismes és superior al total d'episodis per què s'incorporen els d'etologia polimicrobiana (els microorganismes 1 i 2).

Taula 33: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a cesàries. Període 2007-2020.

Any	ILQ Global				ILQ d'òrgan i espai		
	N IQ	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]
2007	1.059	64	6,04	[4,76 a 7,65]	4	0,38	[0,14 a 1,00]
2008	1.529	75	4,91	[3,93 a 6,11]	4	0,26	[0,10 a 0,70]
2009	2.863	100	3,49	[2,88 a 4,23]	9	0,31	[0,16 a 0,60]
2010	3.304	119	3,60	[3,02 a 4,29]	10	0,30	[0,16 a 0,56]
2011	2.953	114	3,86	[3,22 a 4,62]	8	0,27	[0,14 a 0,54]
2012	2.863	111	3,88	[3,23 a 4,65]	5	0,17	[0,07 a 0,42]
2013	3.168	112	3,54	[2,95 a 4,24]	9	0,28	[0,15 a 0,55]
2014	2.685	90	3,35	[2,73 a 4,10]	7	0,26	[0,12 a 0,55]
2015	2.562	69	2,69	[2,13 a 3,40]	6	0,23	[0,11 a 0,52]
2016	2.500	71	2,84	[2,26 a 3,57]	6	0,24	[0,11 a 0,53]
2017	2.071	60	2,90	[2,26 a 3,71]	6	0,29	[0,13 a 0,64]
2018	2.198	68	3,09	[2,45 a 3,91]	8	0,36	[0,18 a 0,73]
2019	1.969	54	2,74	[2,11 a 3,56]	5	0,25	[0,11 a 0,61]
2020	1.858	46	2,48	[1,86 a 3,29]	5	0,27	[0,11 a 0,65]
TOTAL	36.752	1.222	3,32	[3,15 a 3,51]	100	0,27	[0,22 a 0,33]

Figura 21: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a cesàries. Període 2007-2020.




Colecistectomia

Taula 34: Nombre i percentatge d'intervencions i d'infeccions a colecistectomia, segons diferents característiques. Any 2020.

	Global VINCat		Grup 1		Grup 2		Grup 3		
	N	%	N	%	N	%	N	%	
IQs (N)	968	-	0	-	378	-	590	-	
Nº centres participants	12	-	0	-	3	-	9	-	
Sexe (Dona)	611	63,10	0	0,00	229	60,60	382	64,70	
Punt per duració IQ > P75	119	12,30	0	0,00	59	15,60	60	10,20	
NISS:	-1,0	939	97,00	0	0,00	365	96,60	574	97,30
		27	2,80	0	0,00	12	3,20	15	2,50
		>=2	2	0,20	0	0,00	1	0,30	1
Profilaxis ATB adequada	661	68,30	0	0,00	332	87,80	329	55,80	
Cirurgia endoscòpica	935	96,60	0	0,00	369	97,60	566	95,90	
ILQ	15	1,50	0	0,00	4	1,10	11	1,90	
Percentils:	25	-	0,00	-	0,00	-	0,20	-	0,00
		75	-	2,80	-	0,00	-	3,10	-
Superficial	8	0,80	0	0,00	3	0,80	5	0,80	
Profunda	2	0,20	0	0,00	0	0,00	2	0,30	
Òrgan-Espai	5	0,50	0	0,00	1	0,30	4	0,70	
ILQ (N)	15	-	0	-	4	-	11	-	
Superficial	8	53,30	0	0,00	3	75,00	5	45,50	
Profunda	2	13,30	0	0,00	0	0,00	2	18,20	
Òrgan-Espai	5	33,30	0	0,00	1	25,00	4	36,40	
Detecció ILQ:	Ingrés	6	40,00	0	0,00	1	25,00	5	45,50
	Reingrés	4	26,70	0	0,00	1	25,00	3	27,30
Vigilància post-alta	5	33,30	0	0,00	2	50,00	3	27,30	

Figura 22: Taxes globals d'ILQ a colecistectomia dels centres participants, estratificades per grup d'hospitals. Any 2020.



Taula 35: Microorganismes responsables de la ILQ a colecistectomia. Any 2020.


Família/Grup de microorganisme	N	%
BACILS GRAM NEGATIUS	5	55,56
<i>Escherichia coli</i>	3	33,33
<i>Enterobacter cloacae</i>	1	11,11
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1	11,11
COCS GRAM POSITIUS	2	22,22
<i>Enterococcus faecalis</i>	1	11,11
<i>S. coagulasa negatiu</i>	1	11,11
CULTIUS NO PRACTICATS	2	22,22
A.A. Cultius no practicats	2	22,22
TOTAL	9	

* El nombre total de microorganismes és superior al total d'episodis per què s'incorporen els d'etologia polimicrobiana (els microorganismes 1 i 2).

Taula 36: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a colecistectomia. Període 2007-2020.

Any	ILQ Global				ILQ d'òrgan i espai		
	N IQ	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]
2007	624	32	5,13	[3,65 a 7,16]	11	1,76	[0,98 a 3,16]
2008	1.141	22	1,93	[1,27 a 2,91]	7	0,61	[0,29 a 1,28]
2009	1.739	55	3,16	[2,44 a 4,10]	13	0,75	[0,43 a 1,28]
2010	1.688	43	2,55	[1,89 a 3,42]	5	0,30	[0,12 a 0,71]
2011	1.471	43	2,92	[2,17 a 3,92]	8	0,54	[0,27 a 1,08]
2012	1.629	55	3,38	[2,60 a 4,37]	13	0,80	[0,46 a 1,37]
2013	1.935	53	2,74	[2,10 a 3,57]	21	1,09	[0,71 a 1,66]
2014	1.674	48	2,87	[2,17 a 3,79]	13	0,78	[0,45 a 1,33]
2015	1.468	51	3,47	[2,65 a 4,54]	10	0,68	[0,37 a 1,26]
2016	1.533	37	2,41	[1,75 a 3,31]	6	0,39	[0,18 a 0,87]
2017	1.841	39	2,12	[1,55 a 2,89]	16	0,87	[0,53 a 1,41]
2018	1.720	28	1,63	[1,13 a 2,35]	10	0,58	[0,31 a 1,08]
2019	1.037	18	1,74	[1,10 a 2,74]	6	0,58	[0,26 a 1,28]
2020	978	15	1,53	[0,93 a 2,53]	5	0,51	[0,21 a 1,22]
TOTAL	23.082	582	2,52	[2,33 a 2,73]	158	0,68	[0,59 a 0,80]

Figura 23: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a colecistectomia. Període 2007-2020.



Herniorràfia


Taula 37: Nombre i percentatge d'intervencions i d'infeccions a herniorràfia, segons diferents característiques. Any 2020.

	Global VINCat		Grup 1		Grup 2		Grup 3	
	N	%	N	%	N	%	N	%
IQs (N)	694		-		694		-	
Nº centres participants	6		-		6		-	
Sexe (Dona)	95	13,70	-		95	13,70	-	
Punt per duració IQ > P75	11	1,60	-		11	1,60	-	
NISS:	-1,0	642	92,50	-	642	92,50	-	
	1	49	7,10	-	49	7,10	-	
	>=2	3	0,40	-	3	0,40	-	
Profilaxis ATB adequada	437	63,00	-		437	63,00	-	
Cirurgia endoscòpica	173	24,90	-		173	24,90	-	
ILQ	1	0,10	-		1	0,10	-	
Percentils:	25	-	0,00	-	-		0,00	
	75	-	0,00	-	-		0,00	
Superficial	1	0,10	-		1	0,10	-	
Profunda	0	0,00	-		0	0,00	-	
Òrgan-Espai	0	0,00	-		0	0,00	-	
ILQ (N)	1		-		1		-	
Superficial	1	100,00	-		1	100,00	-	
Profunda	0	0,00	-		0	0,00	-	
Òrgan-Espai	0	0,00	-		0	0,00	-	
Detecció ILQ:	Ingrés	0	0,00	-	0	0,00	-	
	Reingrés	0	0,00	-	0	0,00	-	
Vigilància post-alta	1	100,00	-		1	100,00	-	

Taula 38: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a herniorràfia. Període 2007-2020.

Any	ILQ Global				ILQ d'òrgan i espai		
	N IQ	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]	N ILQ	Taxa ILQ	[IC 95%]
2009	691	11	1,59	[0,88 a 2,85]	5	0,72	[0,30 a 1,73]
2010	875	13	1,49	[0,86 a 2,54]	2	0,23	[0,06 a 0,91]
2011	981	10	1,02	[0,55 a 1,88]	4	0,41	[0,15 a 1,08]
2012	1.068	21	1,97	[1,29 a 3,00]	2	0,19	[0,05 a 0,75]
2013	1.257	16	1,27	[0,78 a 2,07]	0	0,00	[NaN a NaN]
2014	1.497	22	1,47	[0,97 a 2,22]	0	0,00	[NaN a NaN]
2015	1.685	23	1,36	[0,91 a 2,05]	1	0,06	[0,01 a 0,42]
2016	1.680	35	2,08	[1,50 a 2,89]	3	0,18	[0,06 a 0,55]
2017	1.167	13	1,11	[0,65 a 1,91]	1	0,09	[0,01 a 0,61]
2018	951	9	0,95	[0,49 a 1,81]	1	0,11	[0,01 a 0,74]
2019	859	10	1,16	[0,63 a 2,15]	1	0,12	[0,02 a 0,82]
2020	698	1	0,14	[0,02 a 1,01]	0	0,00	[NaN a NaN]
TOTAL	15.274	204	1,34	[1,17 a 1,53]	20	0,13	[0,08 a 0,20]

Figura 24: Evolució de la taxa d'ILQ global i d'òrgan i espai a herniorràfia. Període 2007-2020.



OBJECTIU 4: Vigilància de les infeccions a les UCIs

Figura 25: Evolució del nombre d'hospitals participants a la vigilància d'infeccions a les UCIs. Període 2013-2020.






Figura 26: Evolució del nombre d'UCIs participants a la vigilància segons grup d'hospital. Període 2013-2020.



La **complexitat de les UCI** es calcula segons el nombre de dies d'exposició a ventilació mecànica invasiva (VMI) entre el nombre d'estades UCI: {-}

$$\% \text{ VM} = \frac{\# \text{ dies d'exposició a VMI}}{\# \text{ estades UCI}}$$

Gràfic 27: Distribució de les 21 UCIs segons la seva complexitat (%VM). Any 2020.



Un 60% dels hospitals canvien de grup respecte a la classificació de grups d'hospitals segons el nombre de llits dels centres.

Vigilància de la pneumonia associada a ventilació mecànica (NAVMI)

Figura 28: DI de pneumonies associades a ventilació mecànica invasiva (NAVMI) segons grup d'hospital. Any 2020.




Figura 29: Evolució de la DI de pneumonies associades a ventilació mecànica invasiva (NAVMI) segons grup d'hospital. Període 2013-2020.




Figura 30: Evolució de la DI de pneumonies associades a ventilació mecànica invasiva (NAVMI) segons microorganismes responsables. Període 2013-2020.





Figura 31: DI de pneumonies associades a ventilació mecànica invasiva (NAVMI) segons grau de complexitat de l'UCI. Any 2020.



Vigilància de la bacterièmia associada a catèter venós central

Figura 32: DI de bacterièmia associada a catèter venós central (CVC) segons grup d'hospital. Any 2020.




Figura 33: Evolució de la DI de bacterièmia associada a catèter venós central (CVC) segons grup d'hospital. Període 2013-2020.




Figura 34: Evolució de la DI de bacteriemà associada a catèter venós central (CVC) segons microorganismes responsables. Període 2013-2020.





Figura 35: DI de pneumonies associades a catèter venós central (CVC) segons grau de complexitat de l'UCI. Any 2020.



Vigilància de la infecció urinària associada a sonda vesical (IUSV)

Figura 36: DI d'infeccions urinàries associades a la utilització de sonda vesical (IUSV) segons grup d'hospital. Any 2020.




Figura 37: Evolució de la DI d'infeccions urinàries associades a la utilització de sonda vesical (IUSV) segons grup d'hospital. Període 2013-2020.




Figura 38: Evolució de la DI d'infeccions urinàries associades a la utilització de sonda vesical (IUSV) segons microorganismes responsables. Període 2013-2020.





Figura 39: DI d'infeccions urinàries associades a la utilització de sonda vesical (IUSV) segons grau de complexitat de l'UCI. Any 2020.




OBJECTIU 5: Vigilància microorganismes amb problemes específics de resistència antibòtica

Vigilància d'infeccions associades a *Clostridioides difficile* (ICD)

Taula 39: DI d'infecció per **Clostridioides difficile** (ICD) per 10.000 estades, segons l'àrea d'adquisició. Any 2020.

Grup	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%	Percentils				
						10%	25%	50%	75%	90%
Global	50	1.381	3.251.576	4,25	[4,03 a 4,48]	1,57	2,19	3,68	4,87	6,32
Grup I	8	628	1.321.883	4,75	[4,39 a 5,14]	3,78	4,21	4,93	5,33	6,20
Grup II	17	498	1.233.550	4,04	[3,69 a 4,41]	2,07	2,65	3,78	4,69	5,49
Grup III	23	200	623.566	3,21	[2,78 a 3,68]	1,13	1,58	2,61	3,45	5,37
Grup IV	2	55	72.577	7,58	[5,71 a 9,86]	2,42	6,04	12,08	14,36	15,72
Adquisició nosocomial	44	564	3.251.576	1,73	[1,59 a 1,88]	0,64	0,88	1,39	2,14	2,65
Grup I	8	303	1.321.883	2,29	[2,04 a 2,57]	1,60	1,91	2,53	2,71	3,05
Grup II	17	169	1.233.550	1,37	[1,17 a 1,59]	0,67	0,75	1,20	2,04	2,49
Grup III	17	68	623.566	1,09	[0,85 a 1,38]	0,00	0,27	0,94	1,34	2,02
Grup IV	2	24	72.577	3,31	[2,12 a 4,92]	1,24	3,09	6,18	6,41	6,55
Adquisició relacionada amb el sistema de salut	41	414	3.251.576	1,27	[1,15 a 1,40]	0,32	0,70	1,10	1,65	2,44
Grup I	8	171	1.321.883	1,29	[1,11 a 1,50]	0,85	1,06	1,28	1,55	1,79
Grup II	17	162	1.233.550	1,31	[1,12 a 1,53]	0,41	0,61	1,30	1,69	2,17
Grup III	14	52	623.566	0,83	[0,62 a 1,09]	0,00	0,00	0,62	1,01	1,63
Grup IV	2	29	72.577	4,00	[2,68 a 5,74]	0,97	2,42	4,83	7,41	8,95
Adquisició comunitaria	48	403	3.251.576	1,24	[1,12 a 1,37]	0,42	0,61	0,86	1,52	2,94
Grup I	8	154	1.321.883	1,17	[0,99 a 1,36]	0,60	0,61	0,93	1,41	2,36
Grup II	17	167	1.233.550	1,35	[1,16 a 1,58]	0,52	0,76	1,04	1,43	2,99
Grup III	21	80	623.566	1,28	[1,02 a 1,60]	0,31	0,54	0,73	1,55	3,02
Grup IV	2	2	72.577	0,28	[0,03 a 1,00]	0,10	0,24	0,48	0,54	0,58


Figura 40: DI global d'ICD. Any 2020.



Taula 40: Evolució de la DI d'ICD global, per cada 10.000 estades. Període 2009-2020.

Any	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%
2009	22	486	2.970.611	1,64	[1,49 a 1,79]
2010	25	489	3.067.156	1,59	[1,46 a 1,74]
2011	31	503	3.161.235	1,59	[1,46 a 1,74]
2012	35	642	3.416.998	1,88	[1,74 a 2,03]
2013	39	706	3.497.772	2,02	[1,87 a 2,17]
2014	44	1.127	3.700.237	3,05	[2,87 a 3,23]
2015	46	1.217	3.778.456	3,22	[3,04 a 3,41]
2016	48	1.186	3.795.410	3,12	[2,95 a 3,31]
2017	54	1.362	3.831.288	3,55	[3,37 a 3,75]
2018	52	1.315	3.936.649	3,34	[3,16 a 3,53]
2019	52	1.332	3.953.391	3,37	[3,19 a 3,56]
2020	50	1.381	3.629.331	3,81	[3,61 a 4,01]
TOTAL		11.746	42.738.534	2,75	[2,70 a 2,80]


Figura 41: DI d'ICD d'adquisició nosocomial. Any 2020.



Taula 41: Evolució de la DI d'ICD d'adquisició nosocomial, per cada 10.000 estades. Període 2009-2020.

Any	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%
2009	1	1	2.970.611	0,00	[0,00 a 0,02]
2010	13	100	3.067.156	0,33	[0,27 a 0,40]
2011	28	223	3.161.235	0,71	[0,62 a 0,80]
2012	32	309	3.416.998	0,90	[0,81 a 1,01]
2013	34	313	3.497.772	0,89	[0,80 a 1,00]
2014	42	493	3.700.237	1,33	[1,22 a 1,46]
2015	43	532	3.778.456	1,41	[1,29 a 1,53]
2016	43	556	3.795.410	1,46	[1,35 a 1,59]
2017	49	607	3.831.288	1,58	[1,46 a 1,72]
2018	48	557	3.936.649	1,41	[1,30 a 1,54]
2019	48	567	3.953.391	1,43	[1,32 a 1,56]
2020	44	564	3.629.331	1,55	[1,43 a 1,69]
TOTAL		4.822	42.738.534	1,13	[1,10 a 1,16]


Figura 42: DI d'ICD d'adquisició relacionada amb el sistema de salut. Any 2020.



Taula 42: Evolució de la DI d'ICD d'adquisició relacionada amb el sistema de salut, per cada 10.000 estades. Període 2009-2020.

Any	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%
2009	21	394	2.970.611	1,33	[1,20 a 1,46]
2010	23	286	3.067.156	0,93	[0,83 a 1,05]
2011	27	179	3.161.235	0,57	[0,49 a 0,66]
2012	29	187	3.416.998	0,55	[0,47 a 0,63]
2013	35	228	3.497.772	0,65	[0,57 a 0,74]
2014	37	367	3.700.237	0,99	[0,89 a 1,10]
2015	40	345	3.778.456	0,91	[0,82 a 1,01]
2016	41	330	3.795.410	0,87	[0,78 a 0,97]
2017	45	381	3.831.288	0,99	[0,90 a 1,10]
2018	47	382	3.936.649	0,97	[0,88 a 1,07]
2019	42	391	3.953.391	0,99	[0,89 a 1,09]
2020	41	414	3.629.331	1,14	[1,03 a 1,26]
TOTAL		3.884	42.738.534	0,91	[0,88 a 0,94]


Figura 43: DI d'ICD d'adquisició comunitaria. Any 2020.



Taula 43: Evolució de la DI d'ICD d'adquisició comunitaria, per cada 10.000 estades. Període 2009-2020.

Any	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%
2009	14	85	2.970.611	0,29	[0,23 a 0,35]
2010	19	92	3.067.156	0,30	[0,24 a 0,37]
2011	20	89	3.161.235	0,28	[0,23 a 0,35]
2012	29	138	3.416.998	0,40	[0,34 a 0,48]
2013	31	140	3.497.772	0,40	[0,34 a 0,47]
2014	38	240	3.700.237	0,65	[0,57 a 0,74]
2015	40	316	3.778.456	0,84	[0,75 a 0,93]
2016	40	300	3.795.410	0,79	[0,70 a 0,89]
2017	48	373	3.831.288	0,97	[0,88 a 1,08]
2018	44	376	3.936.649	0,96	[0,86 a 1,06]
2019	43	374	3.953.391	0,95	[0,85 a 1,05]
2020	48	403	3.629.331	1,11	[1,00 a 1,22]
TOTAL		2.926	42.738.534	0,68	[0,66 a 0,71]

Figura 44: Evolució de la DI d'ICD segons les diferents àrees d'adquisició. Període 2009-2020.



Vigilància de *Staphylococcus aureus* resistent a meticil·lina (SARM) d'adquisició hospitalària


Taula 44: DI de casos nous de SARM d'adquisició hospitalària segons grup d'hospital, per cada 10.000 estades. Any 2020.

Grup	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%	Percentils				
						10%	25%	50%	75%	90%
Grup I	5	98	1.584.862	0,62	[0,50 a 0,75]	0,00	0,00	0,60	1,27	1,69
Grup II	16	129	1.295.687	1,00	[0,83 a 1,18]	0,51	0,59	0,85	1,25	2,04
Grup III	13	84	845.592	0,99	[0,79 a 1,23]	0,00	0,00	0,00	0,79	2,21
Grup IV	0	0	76.807	0,00	[0,00 a 0,48]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Global	34	311	3.802.948	0,82	[0,73 a 0,91]	0,58	0,62	1,05	1,95	2,33

Taula 45: Distribució conjunta del nombre de casos nous de bacterièmia per SARM d'adquisició hospitalària, segons el tipus de la primera mostra positiva i servei hospitalari. Any 2020.

	Mèdic	Pediatria	Quirúrgic	UCI	Total
Altres	17 (5,47%)	1 (0,32%)	15 (4,82%)	0 (0,00%)	33 (10,61%)
Catéter	1 (0,32%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	2 (0,64%)	3 (0,96%)
Ferida no quirúrgica	31 (9,97%)	2 (0,64%)	13 (4,18%)	4 (1,29%)	50 (16,08%)
Ferida quirúrgica	4 (1,29%)	0 (0,00%)	58 (18,65%)	2 (0,64%)	64 (20,58%)
Hemocultius	25 (8,04%)	0 (0,00%)	4 (1,29%)	14 (4,50%)	43 (13,83%)
Orina	11 (3,54%)	0 (0,00%)	5 (1,61%)	1 (0,32%)	17 (5,47%)
Respiratòria	48 (15,43%)	0 (0,00%)	4 (1,29%)	49 (15,76%)	101 (32,48%)
Total	137 (44,05%)	3 (0,96%)	99 (31,83%)	72 (23,15%)	311 (100,00%)

Figura 45: DI global de SARM segons grup d'hospital. Any 2020.



Taula 46: Evolució global de la DI d'ICD d'adquisició comunitaria, per cada 10.000 estades. Període 2012-2020.

Any	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%
2012	22	237	3.599.383	0,66	[0,58 a 0,75]
2013	27	326	3.697.116	0,88	[0,79 a 0,98]
2014	29	339	3.929.612	0,86	[0,77 a 0,96]
2015	38	327	4.023.488	0,81	[0,73 a 0,91]
2016	41	348	4.043.424	0,86	[0,77 a 0,96]
2017	35	312	4.126.409	0,76	[0,67 a 0,84]
2018	39	357	4.164.867	0,86	[0,77 a 0,95]
2019	37	325	4.164.585	0,78	[0,70 a 0,87]
2020	34	311	3.802.948	0,82	[0,73 a 0,91]
TOTAL		2.882	35.551.832	0,81	[0,78 a 0,84]

Taula 47: Evolució global de la DI d'ICD d'adquisició comunitaria a l'àrea de pacients crítics, per cada 10.000 estades. Període 2012-2020.

Any	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%
2012	8	21	152.064	1,38	[0,85 a 2,11]
2013	15	39	160.765	2,43	[1,73 a 3,32]
2014	14	44	181.410	2,43	[1,76 a 3,26]
2015	17	31	263.409	1,18	[0,80 a 1,67]
2016	16	35	258.593	1,35	[0,94 a 1,88]
2017	12	29	277.093	1,05	[0,70 a 1,50]
2018	14	37	275.278	1,34	[0,95 a 1,85]
2019	10	19	264.428	0,72	[0,43 a 1,12]
2020	19	72	319.897	2,25	[1,76 a 2,83]
TOTAL		327	2.152.937	1,52	[1,36 a 1,69]

Taula 48: Evolució global de la DI d'ICD d'adquisició comunitaria a l'àrea mèdica, per cada 10.000 estades. Període 2012-2020.

Any	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%
2012	16	101	1.674.690	0,60	[0,49 a 0,73]
2013	24	125	1.697.451	0,74	[0,61 a 0,88]
2014	26	143	1.800.438	0,79	[0,67 a 0,94]
2015	31	162	1.867.111	0,87	[0,74 a 1,01]
2016	34	150	1.856.071	0,81	[0,68 a 0,95]
2017	28	160	1.871.491	0,85	[0,73 a 1,00]
2018	32	167	1.948.966	0,86	[0,73 a 1,00]
2019	35	167	1.984.025	0,84	[0,72 a 0,98]
2020	32	137	1.973.717	0,69	[0,58 a 0,82]
TOTAL		1.312	16.673.960	0,79	[0,74 a 0,83]


Taula 49: Evolució global de la DI d'ICD d'adquisició comunitaria a l'àrea quirúrgica, per cada 10.000 estades. Període 2012-2020.

Any	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%
2012	19	115	1.462.339	0,79	[0,65 a 0,94]
2013	21	157	1.500.653	1,05	[0,89 a 1,22]
2014	23	149	1.549.497	0,96	[0,81 a 1,13]
2015	32	132	1.562.176	0,84	[0,71 a 1,00]
2016	34	160	1.583.630	1,01	[0,86 a 1,18]
2017	29	119	1.602.544	0,74	[0,62 a 0,89]
2018	29	147	1.622.668	0,91	[0,77 a 1,06]
2019	32	139	1.600.710	0,87	[0,73 a 1,03]
2020	27	99	1.265.341	0,78	[0,64 a 0,95]
TOTAL		1.217	13.749.558	0,89	[0,84 a 0,94]

Taula 50: Evolució global de la DI d'ICD d'adquisició comunitaria a l'àrea de pediatria, per cada 10.000 estades. Període 2012-2020.

Any	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%
2013	4	5	199.344	0,25	[0,08 a 0,59]
2014	3	3	229.375	0,13	[0,03 a 0,38]
2015	1	2	245.032	0,08	[0,01 a 0,29]
2016	3	3	261.563	0,11	[0,02 a 0,34]
2017	3	4	295.121	0,14	[0,04 a 0,35]
2018	2	6	228.218	0,26	[0,10 a 0,57]
2020	2	3	173.617	0,17	[0,04 a 0,50]
TOTAL		26	1.632.270	0,16	[0,10 a 0,23]

Figura 46: Evolució de la DI d'ICD segons l'àrea d'adquisició. Període 2012-2020.




Vigilància de *Staphylococcus aureus* resistant a meticil·lina (SARM)

Resistència a meticil·lina en *Staphylococcus aureus*

Taula 51: Casos de SARM sobre el total de casos de **Staphylococcus aureus segons grup d'hospital. Any 2020.**

Grup	N centres	N casos SARM	N casos S. aureus	% SARM	IC 95%	Percentils					
						10%	25%	50%	75%	90%	
Grup I	8	1.265	5.966	21,20	[20,17 a 22,24]	16,60	20,06	21,63	23,18	25,22	
Grup II	15	1.039	4.555	22,81	[21,59 a 24,03]	13,62	17,01	20,71	23,17	30,58	
Grup III	28	674	2.689	25,07	[23,43 a 26,70]	8,71	12,05	24,65	28,85	33,01	
Grup IV	3	220	426	51,64	[46,90 a 56,39]	20,41	30,07	46,15	55,22	60,66	
TOTAL	54	3.198	13.636	23,45	[22,74 a 24,16]	10,16	14,95	21,63	28,18	33,54	


Figura 47: Casos de SARM sobre el total de casos de *Staphylococcus aureus* segons grup d'hospital. Any 2020.



Taula 52: Evolució dels casos de SARM sobre el total de casos de *Staphylococcus aureus*. Període 2014-2020.

Any	N centres	N casos SARM	N casos S. aureus	% SARM	IC 95%
2014	50	3.253	13.815	23,55	[22,84 a 24,25]
2015	53	3.248	14.110	23,02	[22,32 a 23,71]
2016	54	3.219	13.833	23,27	[22,57 a 23,97]
2017	54	3.422	14.058	24,34	[23,63 a 25,05]
2018	57	3.970	16.395	24,21	[23,56 a 24,87]
2019	50	3.146	13.976	22,51	[21,82 a 23,20]
2020	54	3.198	13.636	23,45	[22,74 a 24,16]

Figura 48: Evolució dels casos de SARM sobre el total de casos de *Staphylococcus aureus* segons grup d'hospital. Període 2014-2020.




Casos nous de *Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina (SARM)

Taula 53: DI de casos nous de SARM, per cada 10.000 estades. Any 2020.

Grup	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%	Percentils				
						10%	25%	50%	75%	90%
Grup I	8	819	1.584.862	5,17	[4,82 a 5,53]	0,00	1,82	5,48	7,12	8,08
Grup II	15	633	1.295.687	4,89	[4,51 a 5,28]	0,00	2,45	4,20	6,67	8,84
Grup III	28	362	845.592	4,28	[3,85 a 4,75]	0,00	0,00	1,42	5,57	10,45
Grup IV	3	60	76.807	7,81	[5,96 a 10,06]	0,86	2,14	4,29	12,97	18,18
TOTAL	54	1.874	3.802.948	4,93	[4,71 a 5,16]	0,00	1,55	4,29	7,12	10,99


Figura 49: DI de casos nous de SARM als centres participants, estratificat per grup d'hospital. Any 2020.



Taula 54: Evolució de la DI de casos nous de SARM, per cada 10.000 estades. Període 2014-2020.

Any	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%
2014	50	1.754	3.929.612	4,46	[4,26 a 4,68]
2015	53	1.886	4.023.488	4,69	[4,48 a 4,90]
2016	54	2.131	4.043.424	5,27	[5,05 a 5,50]
2017	54	2.460	4.126.409	5,96	[5,73 a 6,20]
2018	57	2.703	4.164.867	6,49	[6,25 a 6,74]
2019	50	2.161	4.164.585	5,19	[4,97 a 5,41]
2020	54	1.874	3.802.948	4,93	[4,71 a 5,16]
TOTAL		14.969	28.255.333	5,30	[5,21 a 5,38]

Figura 50: Evolució de la DI de casos nous de SARM segons grup d'hospital. Període 2014-2020.




Bacteriemies per *Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina (SARM)

Taula 55: DI de bacteriemies per SARM segons grup d'hospital, per cada 10.000 estades. Any 2020.

Grup	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%	Percentils				
						10%	25%	50%	75%	90%
Grup I	8	176	1.584.862	1,11	[0,95 a 1,29]	0,69	0,97	1,00	1,23	1,66
Grup II	15	80	1.295.687	0,62	[0,49 a 0,77]	0,12	0,23	0,44	0,87	1,23
Grup III	28	44	845.592	0,52	[0,38 a 0,70]	0,00	0,00	0,00	0,65	1,17
Grup IV	3	4	76.807	0,52	[0,14 a 1,33]	0,10	0,24	0,48	0,96	1,25
TOTAL	54	304	3.802.948	0,80	[0,71 a 0,89]	0,00	0,23	0,62	0,98	1,44


Figura 51: DI de bacteriemies per SARM dels centres participants, estratificades per grup d'hospital. Any 2020.



Taula 56: Evolució de la DI de bacteriemies per SARM, per cada 10.000 estades. Període 2014-2020.

Any	N centres	N casos	N estades	DI	IC 95%
2014	50	226	3.929.612	0,58	[0,50 a 0,66]
2015	53	232	4.023.488	0,58	[0,50 a 0,66]
2016	54	284	4.043.424	0,70	[0,62 a 0,79]
2017	54	253	4.126.409	0,61	[0,54 a 0,69]
2018	57	348	4.164.867	0,84	[0,75 a 0,93]
2019	50	292	4.164.585	0,70	[0,62 a 0,79]
2020	54	304	3.802.948	0,80	[0,71 a 0,89]
TOTAL		1.939	28.255.333	0,69	[0,66 a 0,72]

Figura 52: Evolució de la DI de bacteriemies per SARM segons grup d'hospital. Període 2014-2020.



Vigilància d'enterobacteris multiresistents

Taula 57: Episodis de *K. pneumoniae* BLEE segons grup d'hospital i localització. Any 2020.

	Altres localitzacions				Bacteriemies			
	Episodis	Episodis totals	%	IC 95%	Episodis	Episodis totals	%	IC 95%
Grup I	1.138	5.224	21,78	[20,66 a 22,90]	158	765	20,65	[17,78 a 23,52]
Grup II	982	5.246	18,72	[17,66 a 19,77]	117	503	23,26	[19,57 a 26,95]
Grup III	602	3.452	17,44	[16,17 a 18,70]	53	243	21,81	[16,62 a 27,00]
Grup IV	149	866	17,21	[14,69 a 19,72]	8	37	21,62	[8,36 a 34,89]
TOTAL	2.871	14.788	19,41	[18,78 a 20,05]	336	1.548	21,71	[19,65 a 23,76]

Figura 53: Percentatges globals de casos *K. pneumoniae* BLEE als centres participants, segons grup d'hospital. Any 2020.





Figura 54: Percentatges de casos de bacteriemies per *K. pneumoniae* BLEE als centres participants, segons grup d'hospital. Any 2020.



Taula 58: Episodis de *K. pneumoniae* productor de carbapenemasa (PC) segons grup d'hospital i localització. Any 2020.

	Altres localitzacions					Bacteriemies				
	Episodis	Episodis totals	%	IC 95%	Episodis	Episodis totals	%	IC 95%		
Grup I	172	5.224	3,29	[2,81 a 3,78]	30	742	4,04	[2,63 a 5,46]		
Grup II	78	5.246	1,49	[1,16 a 1,81]	10	695	1,44	[0,55 a 2,32]		
Grup III	28	3.423	0,82	[0,52 a 1,12]	1	226	0,44	[-0,42 a 1,31]		
Grup IV	12	866	1,39	[0,61 a 2,16]	3	37	8,11	[-0,69 a 16,90]		
TOTAL	290	14.759	1,96	[1,74 a 2,19]	44	1.700	2,59	[1,83 a 3,34]		

Figura 55: Percentatges de casos *K. pneumoniae* productor de carbapenemasa (PC) als centres participants, segons grup d'hospital. Any 2020.





Figura 56: Percentatges de casos de bacteriemies per *K. pneumoniae* productor de carbapenemasa (PC) als centres participants, segons grup d'hospital. Any 2020.



Taula 59: Episodis de *E. cloacae* productor de carbapenemasa (PC) segons grup d'hospital i localització. Any 2020.

	Altres localitzacions				Bacteriemies			
	Episodis	Episodis totals	%	IC 95%	Episodis	Episodis totals	%	IC 95%
Grup I	71	1.834	3,87	[2,99 a 4,75]	9	216	4,17	[1,50 a 6,83]
Grup II	6	1.347	0,45	[0,09 a 0,80]	0	111	0,00	[0,00 a 0,00]
Grup III	12	716	1,68	[0,74 a 2,62]	0	39	0,00	[0,00 a 0,00]
Grup IV	4	246	1,63	[0,05 a 3,21]	1	14	7,14	[-6,35 a 20,63]
TOTAL	93	4.143	2,24	[1,79 a 2,70]	10	380	2,63	[1,02 a 4,24]

Figura 57: Percentatges de casos *E. cloacae* productor de carbapenemasa (PC) als centres participants, grup d'hospital. Any 2020.





Figura 58: Percentatges de casos de bacteriemies per *E. cloacae* productor de carbapenemasa (PC) als centres participants, segons grup d'hospital. Any 2020.



Taula 60: Episodis de *E. coli* productor de carbapenemasa (PC) segons grup d'hospital i localització. Any 2020.

	Altres localitzacions				Bacteriemies			
	Episodis	Episodis totals	%	IC 95%	Episodis	Episodis totals	%	IC 95%
Grup I	28	15.808	0,18	[0,11 a 0,24]	5	2.211	0,23	[0,03 a 0,42]
Grup II	8	21.857	0,04	[0,01 a 0,06]	0	1.729	0,00	[0,00 a 0,00]
Grup III	9	15.554	0,06	[0,02 a 0,10]	0	1.058	0,00	[0,00 a 0,00]
Grup IV	2	2.510	0,08	[-0,03 a 0,19]	1	29	3,45	[-3,19 a 10,09]
TOTAL	47	55.729	0,08	[0,06 a 0,11]	6	5.027	0,12	[0,02 a 0,21]

Figura 59: Percentatges de casos *E. coli* productor de carbapenemasa (PC) als centres participants, segons grup d'hospital. Any 2020.





Figura 60: Percentatges de casos de bacteriemies per *E. coli* productor de carbapenemasa (PC) als centres participants, segons grup d'hospital. Any 2020.



Taula 61: Freqüència dels tipus de carbapenemasa segons els enterobacteris. Any 2020.


	OXA-48	VIM	NDM	KPC	ALTRES	NC
K. pneumoniae	247	18	26	12	3	6
E. cloacae	19	62	0	1	0	0
E. coli	31	12	8	2	0	0

^aNC: No caracteritzada

Taula 62: Evolució del percentatge de enterobacteris resistentes. Període 2014-2020.

	<i>K. pneumoniae</i> BLEE	Bacteriemie s <i>Kp</i> BLEE	<i>K. pneumoniae</i> PC	Bacteriemie s <i>Kp</i> PC	<i>E. cloacae</i> PC	Bacteriemie s <i>E. cloacae</i> PC	<i>E. coli</i> PC	Bacteriemie s <i>E. coli</i> PC
2014	19,87 %	21,51 %	0,54 %	1,08 %	0,44 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %
2015	18,26 %	28,64 %	1,51 %	1,37 %	5,20 %	3,23 %	0,04 %	0,24 %
2016	18,79 %	21,43 %	2,15 %	3,86 %	1,51 %	1,39 %	0,06 %	0,03 %
2017	18,72 %	21,68 %	1,31 %	2,12 %	1,32 %	0,31 %	0,07 %	0,07 %
2018	19,93 %	24,09 %	2,36 %	2,81 %	2,34 %	2,62 %	0,08 %	0,20 %
2019	20,21 %	22,70 %	2,25 %	2,75 %	1,78 %	0,80 %	0,10 %	0,19 %
2020	19,41 %	21,71 %	1,96 %	2,84 %	2,24 %	2,63 %	0,08 %	0,12 %

Figura 61: Evolució del percentatge de casos dels diferents enterobacteris resistent, segons la localització. Període 2014-2020.



OBJECTIU 6: Programa d'optimització de l'ús d'antimicrobians (PROA)


Monitoratge estandarditzat del consum hospitalari d'antimicrobians en adults

Consum d'antimicrobians segons subgrup terapèutic

Taula 63: Consum d'antibacterians per grup d'hospital. Any 2020.

Grup	Núm. hospitals (DDD/100 Estades)				Núm. hospitals (DDD/100 Altes)			
	Global	UCI	S. Mèdics	S. Quirúrgics	Global	UCI	S. Mèdics	S. Quirúrgics
Grup I	9 (73,57)	9 (106,17)	9 (63,20)	9 (82,06)	9 (567,37)	9 (636,91)	9 (521,03)	9 (474,00)
Grup II	17 (71,81)	17 (116,00)	15 (67,77)	16 (71,38)	17 (411,96)	17 (634,22)	15 (514,77)	16 (286,92)
Grup III	40 (64,32)	9 (120,18)	36 (66,71)	33 (61,81)	40 (292,81)	9 (657,88)	36 (466,93)	33 (188,23)
TOTAL	66 (70,69)	35 (110,30)	60 (65,62)	58 (73,90)	66 (423,26)	35 (637,58)	60 (503,49)	58 (316,49)


Figura 62: Consum global d'antibacteria estratificat per grup d'hospital. Any 2020.



Taula 64: Consum d'antimicòtics per grup d'hospital. Any 2020.

Grup	Núm. hospitals (DDD/100 Estades)				Núm. hospitals (DDD/100 Altes)			
	Global	UCI	S. Mèdics	S. Quirúrgics	Global	UCI	S. Mèdics	S. Quirúrgics
Grup I	9 (4,69)	9 (10,54)	9 (4,84)	9 (2,90)	9 (36,13)	9 (63,22)	9 (39,88)	9 (16,73)
Grup II	17 (2,69)	17 (12,87)	15 (1,97)	16 (1,79)	17 (15,42)	17 (70,37)	15 (14,93)	16 (7,20)
Grup III	37 (2,20)	9 (14,07)	33 (2,71)	24 (0,76)	37 (10,16)	9 (77,02)	33 (18,85)	24 (2,40)
TOTAL	63 (3,40)	35 (11,53)	57 (3,34)	49 (2,05)	63 (20,49)	35 (66,66)	57 (25,57)	49 (8,90)

Figura 63: Consum global d'antimicòtics estratificat per grup d'hospital. Any 2020.



Consum global d'antimicrobians en adults

Taula 65: Consum global per grups d'antimicrobians. Any 2020.

	DDD/100 Estades				DDD/100 Altes			
	Grup I	Grup II	Grup III	Total VINCat	Grup I	Grup II	Grup III	Total VINCat
Penicil·lines	22,37	21,44	20,41	21,57	172,54	122,98	92,93	129,17
Cefalosporines	12,63	17,37	16,88	15,28	97,40	99,65	76,83	91,49
Altres antibacterians ^a	12,23	7,90	6,35	9,31	94,28	45,33	28,89	55,76
Macròlids, lincosamides, estreptogramines	7,67	9,21	6,69	7,95	59,18	52,85	30,45	47,60
Quinolones	6,77	7,81	6,92	7,16	52,20	44,80	31,51	42,86
Carbapenems	6,73	4,10	3,80	5,12	51,93	23,55	17,40	30,73
Antimicòtics ús sistèmic	4,69	2,69	2,20	3,40	36,13	15,42	10,16	20,49
Aminoglicòsids	1,64	1,74	1,41	1,62	12,65	10,00	6,42	9,69
Sulfonamides i trimetoprim	2,03	1,20	1,22	1,56	15,68	7,13	5,65	9,52
Tetraciclines	0,62	0,67	0,40	0,59	4,81	3,84	1,83	3,53
Altres cefalosporines i penems	0,59	0,28	0,15	0,39	4,54	1,61	0,66	2,39
Monobactams	0,28	0,16	0,21	0,22	2,17	0,90	0,95	1,34
Antiinfecciosos intestinals	0,02	0,23	0,06	0,10	0,16	1,48	0,27	0,68

^aEl grup "Altres antibacterians" inclou: vancomicina, teicoplanina, colistina, metronidazole, nitrofurantoïna, fosfomicina, linezolid i daptomicina.

Figura 64: Consum global en adults dels principals grups d'antimicrobians. Any 2020.




Figura 65: Evolució del consum global d'antimicrobians. Període 2008-2020.




Figura 66: Evolució del consum global per grups d'antibacterians. Període 2008-2020.




Figura 67: Evolució del consum global per grups d'antifúngics. Període 2008-2020.





Figura 68: Evolució del consum global de Vancomicina, Teicoplanina, Linezolid i Daptomicina. Període 2008-2020.



Consum d'antimicrobians als Serveis Mèdics d'adults

Taula 66: Consum d'antibacterians per grup d'hospital. Any 2020.

	DDD/100 Estades				DDD/100 Altes			
	Grup I	Grup II	Grup III	Total VINCat	Grup I	Grup II	Grup III	Total VINCat
Penicil·lines	20,01	19,90	21,38	20,33	164,96	151,13	149,65	155,98
Cefalosporines	10,57	15,97	16,76	13,96	87,14	121,28	117,30	107,14
Macròlids, lincosamides, estreptogramines	8,43	11,80	8,59	9,58	69,48	89,63	60,14	73,53
Quinolones	7,02	8,44	8,01	7,75	57,90	64,13	56,05	59,45
Altres antibacterians ^a	7,91	5,54	4,75	6,31	65,22	42,08	33,28	48,38
Carbapenems	5,01	3,48	4,08	4,27	41,33	26,47	28,51	32,72
Antimicòtics ús sistèmic	4,84	1,97	2,71	3,34	39,88	14,93	18,85	25,57
Sulfonamides i trimetoprim	2,19	1,25	1,56	1,73	18,08	9,65	10,86	13,31
Aminoglicòsids	0,81	0,68	0,95	0,81	6,72	5,16	6,68	6,19
Tetraciclines	0,46	0,50	0,34	0,44	3,81	3,80	2,39	3,41
Altres cefalosporines i penems	0,49	0,19	0,15	0,32	4,06	1,42	1,03	2,45
Monobactams	0,28	0,10	0,24	0,21	2,33	0,79	1,67	1,62
Antiinfecciosos intestinals	0,03	0,35	0,15	0,16	0,32	2,72	1,41	1,38

^aEl grup "Altres antibacterians" inclou: vancomicina, teicoplanina, colistina, metronidazole, nitrofurantoïna, fosfomicina, linezolid i daptomicina.

Figura 69: Consum als Serveis Mèdics d'adults dels principals grups d'antimicrobians. Any 2020.




Figura 70: Evolució del consum d'antimicrobians als Serveis Mèdics. Període 2008-2020.




Figura 71: Evolució del consum per grups d'antibacterians als Serveis Mèdics. Període 2008-2020.




Figura 72: Evolució del consum per grups d'antifúngics als Serveis Mèdics. Període 2008-2020.





Figura 73: Evolució del consum als Serveis Mèdics de Vancomicina, Teicoplanina, Linezolid i Daptomicina. Període 2008-2020.



Consum d'antimicrobians als Serveis Quirúrgics d'adults

Taula 67: Consum d'antibacterians per grup d'hospital. Any 2020.

	DDD/100 Estades				DDD/100 Altes			
	Grup I	Grup II	Grup III	Total VINCat	Grup I	Grup II	Grup III	Total VINCat
Penicil·lines	25,62	23,46	21,34	23,93	147,97	94,30	64,99	102,48
Cefalosporines	15,59	19,04	18,05	17,34	90,06	76,55	54,97	74,27
Altres antibacterians ^a	16,90	9,36	8,09	12,33	97,63	37,61	24,65	52,81
Quinolones	6,47	6,96	4,96	6,31	37,38	27,98	15,10	27,05
Carbapenems	7,41	3,26	2,57	4,90	42,81	13,12	7,93	21,09
Macròlids, lincosamides, estreptogramines	4,82	4,38	3,12	4,29	27,84	17,59	9,51	18,39
Aminoglicòsids	2,38	2,90	2,42	2,57	13,73	11,65	7,36	11,00
Antimicòtics ús sistèmic	2,90	1,79	0,76	2,05	16,73	7,20	2,40	8,90
Sulfonamides i trimetoprim	1,23	0,85	0,52	0,95	7,13	3,61	1,64	4,21
Tetraciclines	0,83	0,74	0,62	0,76	4,80	2,99	1,91	3,28
Altres cefalosporines i penems	0,54	0,30	0,04	0,37	3,12	1,22	0,11	1,62
Monobactams	0,26	0,18	0,20	0,22	1,53	0,73	0,64	0,98
Antiinfecciosos intestinals	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,25	0,00	0,11

^aEl grup "Altres antibacterians" inclou: vancomicina, teicoplanina, colistina, metronidazole, nitrofurantoïna, fosfomicina, linezolid i daptomicina.

Figura 74: Consum als Serveis Quirúrgics d'adults dels principals grups d'antimicrobians. Any 2020.




Figura 75: Evolució del consum d'antimicrobians als Serveis Mèdics. Període 2008-2020.




Figura 76: Evolució del consum per grups d'antibacterians als Serveis Mèdics. Període 2008-2020.




Figura 77: Evolució del consum per grups d'antifúngics als Serveis Mèdics. Període 2008-2020.





Figura 78: Evolució del consum als Serveis Mèdics de Vancomicina, Teicoplanina, Linezolid i Daptomicina. Període 2008-2020.



Consum d'antimicrobians als Serveis de Medicina Intensiva d'adults

Taula 68: Consum d'antibacterians per grup d'hospital. Any 2020.

	DDD/100 Estades				DDD/100 Altes			
	Grup I	Grup II	Grup III	Total VINCat	Grup I	Grup II	Grup III	Total VINCat
Penicil·lines	26,05	28,82	23,40	26,74	156,28	157,57	128,07	154,59
Altres antibacterians ^a	19,68	17,99	20,51	19,20	118,05	98,38	112,25	111,00
Cefalosporines	14,56	22,53	26,84	17,97	87,35	123,17	146,91	103,88
Macròlids, lincosamides, estreptogramines	14,44	14,78	14,48	14,55	86,61	80,79	79,27	84,10
Carbapenems	13,93	12,79	15,55	13,69	83,59	69,95	85,11	79,11
Antimicòtics ús sistèmic	10,54	12,87	14,07	11,53	63,22	70,37	77,02	66,66
Quinolones	7,31	8,59	11,03	7,98	43,86	46,98	60,40	46,15
Sulfonamides i trimetoprim	4,17	3,36	2,70	3,82	25,04	18,25	14,77	22,07
Aminoglicòsids	3,53	4,26	4,00	3,79	21,15	23,27	21,90	21,92
Altres cefalosporines i penems	1,31	0,94	0,98	1,17	7,85	5,14	5,04	6,73
Tetraciclines	0,82	1,70	0,56	1,08	4,89	9,30	3,07	6,25
Monobactams	0,37	0,49	0,34	0,41	2,24	2,69	1,94	2,38
Antiinfecciosos intestinals	0,00	0,24	0,00	0,09	0,00	1,37	0,00	0,49

^aEl grup "Altres antibacterians" inclou: vancomicina, teicoplanina, colistina, metronidazole, nitrofurantoïna, fosfomicina, linezolid i daptomicina.

Figura 79: Consum als Serveis de Medicina Intensiva d'adults dels principals grups d'antimicrobians. Any 2020.




Figura 80: Evolució del consum d'antimicrobians als Serveis de Medicina Intensiva. Període 2008-2020.




Figura 81: Evolució del consum per grups d'antibacterians als Serveis de Medicina Intensiva. Període 2008-2020.




Figura 82: Evolució del consum per grups d'antifúngics als Serveis de Medicina Intensiva. Període 2008-2020.




Figura 83: Evolució del consum als Serveis de Medicina Intensiva de Vancomicina, Teicoplanina, Linezo i Daptomicina. Període 2008-2020.




Monitoratge estandarditzat del consum hospitalari pediàtric d'antimicrobians

Taula 69: Consum d'antibacterians per nivell d'hospital. Any 2020.

Grup	Núm. hospitals (DOT/100 Estades)					Núm. hospitals (DOT/100 Altes)				
	Global	MP	SQ	UCIN	UCIP	Global	MP	MQ	UCIN	UCIP
Nivell 1	9 (44,62)	7 (45,35)	2 (149,40)	0 (-)	0 (-)	9 (200,24)	7 (235,25)	2 (164,59)	0 (-)	0 (-)
Nivell 2	6 (44,99)	5 (41,44)	4 (90,91)	3 (27,77)	0 (-)	6 (157,35)	5 (142,60)	4 (254,65)	3 (221,20)	0 (-)
Nivell 3	2 (56,04)	2 (64,53)	2 (55,58)	2 (30,35)	2 (77,46)	2 (360,78)	2 (349,07)	2 (164,88)	2 (508,57)	2 (475,04)
TOTAL	17 (53,41)	14 (57,94)	8 (59,93)	5 (30,10)	2 (77,46)	17 (298,39)	14 (285,56)	8 (171,97)	5 (455,17)	2 (475,04)


Figura 84: Consum global d'antibacteria estratificat per nivells. Any 2020.



Taula 70: Consum d'antimicòtics per nivell d'hospital. Any 2020.

Grup	Núm. hospitals (DOT/100 Estades)					Núm. hospitals (DOT/100 Altes)				
	Global	MP	SQ	UCIN	UCIP	Global	MP	MQ	UCIN	UCIP
Nivell 1	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (-)	0 (-)
Nivell 2	1 (0,96)	1 (1,14)	1 (0,14)	0 (-)	0 (-)	1 (3,25)	1 (4,41)	1 (0,32)	0 (-)	0 (-)
Nivell 3	2 (9,09)	2 (15,36)	2 (0,85)	2 (1,58)	2 (10,86)	2 (58,51)	2 (83,09)	2 (2,54)	2 (26,42)	2 (66,59)
TOTAL	3 (8,44)	3 (13,37)	3 (0,83)	2 (1,58)	2 (10,86)	3 (53,70)	3 (73,93)	3 (2,40)	2 (26,42)	2 (66,59)

Figura 85: Consum global d'antimicòtics estratificat per nivells. Any 2020.




Consum global d'antimicrobians a pediatria

Taula 71: Consum global per grups d'antimicrobians. Any 2020.

	DOT/100 Estades				DOT/100 Altes			
	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Total VINCat	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Total VINCat
Penicil·lines	55,39	39,42	38,96	40,82	248,56	137,89	250,83	228,08
Cefalosporines	23,91	27,11	23,53	24,02	107,29	94,81	151,48	134,18
Antimicòtics ús sistèmic	0,00	1,92	18,24	16,93	0,00	6,49	117,42	107,77
Altres antibacterians ^a	3,50	7,31	17,39	14,67	16,71	25,57	111,94	82,72
Aminoglicòsids	6,28	11,28	7,28	7,68	25,02	39,45	46,86	42,42
Carbapenems	1,64	0,81	8,75	7,47	5,34	2,83	56,31	42,09
Sulfonamides i trimetoprim	0,53	0,80	7,54	6,40	3,06	2,69	48,53	37,58
Macròlids, lincosamides i estreptogramines	3,12	3,62	4,49	4,24	14,02	12,67	28,94	23,66
Quinolones	2,85	0,49	4,67	4,14	25,07	1,68	30,05	24,96
Tetraciclines	2,01	-	0,09	0,23	17,05	-	0,60	1,51
Altres cefalosporines i penems	-	7,20	0,10	0,22	-	12,25	0,48	1,08
Monobactams	-	-	0,21	0,21	-	-	1,37	1,37

^aEl grup "Altres antibacterians" inclou: vancomicina, teicoplanina, colistina, metronidazole, nitrofurantoïna, fosfomicina, linezolid i daptomicina.

Figura 86: Consum global en adults dels principals grups d'antimicrobians. Any 2020.




Consum d'antimicrobians als Serveis Mèdics Pediàtrics

Taula 72: Consum als Serveis Mèdics Pediàtrics per grups d'antimicrobians. Any 2020.

	DOT/100 Estades				DOT/100 Altes			
	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Total VINCat	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Total VINCat
Penicil·lines	59,69	39,54	47,87	48,35	309,63	136,07	258,96	238,30
Antimicòtics ús sistèmic	0,00	2,29	30,79	26,80	0,00	8,83	166,59	148,23
Cefalosporines	20,97	25,46	21,19	21,83	108,76	87,61	114,62	107,62
Altres antibacterians ^a	2,24	3,07	16,88	12,53	12,33	10,55	91,33	62,23
Aminoglicòsids	8,11	9,60	8,18	8,40	35,79	33,05	44,23	40,47
Carbapenems	0,49	0,73	10,23	8,30	1,13	2,52	55,34	39,67
Sulfonamides i trimetoprim	0,13	0,91	10,57	8,18	0,95	3,33	57,16	42,28
Macròlids, lincosamides i estreptogramines	1,72	4,82	6,82	5,72	8,94	16,58	36,87	28,21
Quinolones	0,40	0,28	7,31	5,72	5,88	1,02	39,54	30,92
Tetraciclines	1,42	-	0,15	0,32	13,11	-	0,83	1,86
Monobactams	-	-	0,32	0,32	-	-	1,74	1,74
Altres cefalosporines i penems	-	-	0,09	0,09	-	-	0,43	0,43

^aEl grup "Altres antibacterians" inclou: vancomicina, teicoplanina, colistina, metronidazole, nitrofurantoïna, fosfomicina, linezolid i daptomicina.

Figura 87: Consum als Serveis Mèdics Pediàtrics dels principals grups d'antimicrobians. Any 2020.




Consum d'antimicrobians als Serveis Quirúrgics Pediàtrics

Taula 73: Consum als Serveis Quirúrgics Pediàtrics per grups d'antimicrobians. Any 2020.

	DOT/100 Estades				DOT/100 Altes			
	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Total VINCat	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Total VINCat
Penicil·lines	215,18	59,26	42,01	46,33	237,05	165,99	124,62	132,94
Cefalosporines	65,48	64,10	43,16	45,16	72,13	179,55	128,03	129,60
Altres antibacterians ^a	18,98	46,65	16,53	18,90	15,48	130,67	49,03	54,77
Carbapenems	-	2,79	3,60	3,54	-	7,81	10,68	10,44
Quinolones	0,00	3,17	2,57	2,60	0,00	7,89	7,63	7,55
Sulfonamides i trimetoprim	0,00	0,00	2,25	2,15	0,00	0,00	6,67	6,15
Antimicòtics ús sistèmic	-	0,29	1,72	1,66	0,00	0,63	5,09	4,81
Macròlids, lincosamides i estreptogramines	12,50	0,66	1,42	1,55	13,77	1,86	4,20	4,44
Aminoglicòsids	0,00	7,30	0,50	1,02	0,00	20,45	1,48	2,91
Tetraciclines	0,00	-	0,11	0,11	0,00	-	0,34	0,33
Altres cefalosporines i penems	-	-	0,02	0,02	-	-	0,05	0,05
Monobactams	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00

^aEl grup "Altres antibacterians" inclou: vancomicina, teicoplanina, colistina, metronidazole, nitrofurantoïna, fosfomicina, linezolid i daptomicina.

Figura 88: Consum als Serveis Quirúrgics Pediàtrics dels principals grups d'antimicrobians. Any 2020.




Consum d'antimicrobians als Serveis de Medicina Intensiva Neonatal

Taula 74: Consum als Serveis de Medicina Intensiva Neonatal per grups d'antimicrobians. Any 2020.

	DOT/100 Estades				DOT/100 Altes			
	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Total VINCat	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Total VINCat
Penicil·lines	-	24,24	15,52	16,37	-	193,12	259,97	247,55
Altres antibacterians ^a	-	3,17	13,70	12,67	-	25,21	229,56	191,59
Aminoglicòsids	-	18,06	11,62	12,25	-	143,84	194,77	185,30
Cefalosporines	-	11,08	10,03	10,13	-	88,25	168,08	153,25
Carbapenems	-	0,14	5,62	5,08	-	1,15	94,18	76,89
Antimicòtics ús sistèmic	-	-	3,16	3,16	-	-	52,91	52,91
Sulfonamides i trimetoprim	-	0,95	3,18	3,12	-	20,69	53,24	52,63
Macròlids, lincosamides i estreptogramines	-	0,58	0,52	0,53	-	4,58	8,76	7,99
Quinolones	-	0,00	0,38	0,36	-	0,00	6,41	5,44
Monobactams	-	-	0,10	0,10	-	-	1,70	1,70
Altres cefalosporines i penems	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Tetraciclines	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00

^aEl grup "Altres antibacterians" inclou: vancomicina, teicoplanina, colistina, metronidazole, nitrofurantoïna, fosfomicina, linezolid i daptomicina.

Figura 89: Consum als Serveis de Medicina Intensiva Neonatal dels principals grups d'antimicrobians. Any 2020.




Consum d'antimicrobians als Serveis de Medicina Intensiva Pediàtrica

Taula 75: Consum als Serveis de Medicina Intensiva Pediàtrica per grups d'antimicrobians. Any 2020.

	DOT/100 Estades				DOT/100 Altes			
	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Total VINCat	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Total VINCat
Penicil·lines	-	-	47,57	47,57	-	-	291,72	291,72
Cefalosporines	-	-	34,16	34,16	-	-	209,52	209,52
Altres antibacterians ^a	-	-	29,82	29,82	-	-	182,87	182,87
Antimicòtics ús sistèmic	-	-	21,94	21,94	-	-	134,54	134,54
Carbapenems	-	-	17,53	17,53	-	-	107,49	107,49
Sulfonamides i trimetoprim	-	-	12,25	12,25	-	-	75,10	75,10
Macròlids, lincosamides i estreptogramines	-	-	7,99	7,99	-	-	49,01	49,01
Quinolones	-	-	5,81	5,81	-	-	35,66	35,66
Aminoglicòsids	-	-	3,86	3,86	-	-	23,66	23,66
Altres cefalosporines i penems	-	-	0,45	0,45	-	-	2,30	2,30
Monobactams	-	-	0,31	0,31	-	-	1,92	1,92
Tetraciclines	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00

^aEl grup "Altres antibacterians" inclou: vancomicina, teicoplanina, colistina, metronidazole, nitrofurantoïna, fosfomicina, linezolid i daptomicina.

Figura 90: Consum als Serveis de Medicina Intensiva Pediàtrica dels principals grups d'antimicrobians.



Sensibilitat antibiòtica comunitària


Sensibilitat antibiòtica comunitària pediàtrica

Taula 76: Sensibilitat antibiòtica dels microorganismes causants d'infeccions del tracte urinari. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
	% casos BLEE	2,9% (1.611)
	% S amoxicil·lina/clavulànic	82,1% (1.816)
	% S carbapenems	99,2% (1.773)
	% S cefalosporines 3a generació	96,3% (1.815)
	% S cefuroxima	95,1% (1.815)
	% S cotrimoxazol	76,8% (1.817)
<i>E.coli</i>	% S fosfomicina	98,7% (1.815)
	Nº casos carbapenemasa	0 (1.482)
	Nº casos IMP	0 (1.482)
	Nº casos KPC	0 (1.482)
	Nº casos NDM	0 (1.482)
	Nº casos OXA-48	0 (1.482)
	Nº casos VIM	0 (1.482)

Figura 91: Percentatge de casos BLEE en *E.coli* d'origen urinari en població pediàtrica.

Segons Regions Sanitàries de Catalunya (2020)



Taula 77: Sensibilitat antibòtica dels microorganismes causants d'enteritis. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
<i>Campylobacter jejuni</i>	% S eritromicina	98,9% (2.225)
	% casos BLEE	0,5% (517)
<i>Salmonella spp</i>	% S amoxicil·lina/ampicil·lina	47,5% (652)
	% S cotrimoxazol	93,9% (658)

Taula 78: Sensibilitat antibòtica dels microorganismes causants d'infeccions cutànies. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
<i>S.aureus</i>	% SARM	11,7% (289)

Taula 79: Sensibilitat antibòtica dels microorganismes causants d'infeccions respiratòries. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
<i>H.influenzae</i>	% S ampicil·lina	76,5% (115)
	% S cefotaxima	93,5% (78)
	% S eritromicina	78,2% (78)
<i>S.pneumoniae</i>	% I penicil·lina	9,4% (74)
	% R penicil·lina	4,0% (74)
	% S penicil·lina	86,6% (75)
<i>S.pyogenes</i>	% S clindamicina	98,1% (377)
	% S eritromicina	94,7% (381)
	% S penicil·lina	100,0% (379)

Sensibilitat antibiòtica comunitària en adults

Taula 80: Sensibilitat antibiòtica dels microorganismes causants d'infeccions del tracte urinari. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
	% casos BLEE	9,2% (51.414)
	% S amoxicil·lina/clavulànic	75,4% (57.641)
	% S carbapenems	99,9% (54.560)
	% S cefalosporina 3a generació	90,3% (57.554)
	% S cefuroxima	86,3% (57.415)
	% S cotrimoxazol	73,6% (57.622)
	% S fosfomicina	96,6% (57.316)
<i>E.coli</i>	% S nitrofurantoina	98,4% (57.259)
	% S quinolones	72,4% (55.549)
	Nº casos carbapenemasa	10 (48.834)
	Nº casos IMP	0 (46.440)
	Nº casos KPC	0 (46.440)
	Nº casos NDM	0 (46.440)
	Nº casos OXA-48	9 (46.440)
	Nº casos VIM	0 (46.440)
	% casos BLEE	11,1% (11.367)
	% S amoxicil·lina/clavulànic	78,9% (12.667)
	% S carbapenems	96,2% (12.091)
	% S cefalosporina 3a generació	86,7% (12.661)
	% S cefuroxima	84,5% (12.598)
	% S fosfomicina	70,5% (12.201)
<i>K.pneumoniae</i>	% S quinolones	83,7% (12.378)
	Nº casos carbapenemasa	62 (10.793)
	Nº casos IMP	0 (10.385)
	Nº casos KPC	0 (10.385)
	Nº casos NDM	3 (10.385)
	Nº casos OXA-48	51 (10.385)
	Nº casos VIM	1 (10.385)

Figura 92: Percentatge de casos BLEE en *E.coli* d'origen urinari en població adulta.

Segons Regions Sanitàries de Catalunya (2020)





Figura 93: Percentatge de sensibilitat a quinolones en *E.coli* d'origen urinari en població adulta


Segons Regions Sanitàries de Catalunya (2020)



Taula 81: Sensibilitat antibiòtica dels microorganismes causants d'infeccions del tracte respiratori. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
<i>H.influenzae</i>	% S amoxicil·lina/clavulànic	94,8% (1.808)
	% S ampicil·lina	78,3% (1.802)
	% S quinolones	94,6% (1.674)
<i>S.pneumoniae</i>	% S amoxicil·lina	89,1% (918)
	% S eritromicina	72,4% (1.306)
	% S levofloxacina	96,3% (1.157)
<i>S.pyogenes</i>	% S penicil·lina	97,5% (1.276)
	% S clindamicina	86,0% (250)
	% S eritromicina	82,8% (251)
	% S penicil·lina	100,0% (254)

Figura 94: Percentatge de sensibilitat a penicil·lina en *S.pneumoniae* d'origen respiratori en tot Catalunya
Segons Regions Sanitàries de Catalunya (2020)



Taula 82: Sensibilitat antibiòtica dels microorganismes causants d'infeccions de transmissió sexual. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
<i>N.gonorrhoeae</i>	% S azitromicina	86,2% (1.053)
	% S ceftriaxona	99,8% (1.176)
	% S quinolones	41,5% (1.206)

Sensibilitat antibiòtica hospitalària pediàtrica

Taula 83: Sensibilitat antibiòtica hospitalària pediàtrica de *E. coli*. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
<i>E.coli</i>	% BLEE	5,6% (3.801)
	% S a cefepime amb cefotaxima R	1,0% (3.659)
	% S amoxicil·lina/ ac. clavulànic	73,1% (3.820)
	% S carbapenems	99,9% (3.500)
	% S cefuroxima	92,9% (3.773)
	% S gentamicina	92,5% (3.777)
	Nº casos carbapenemasa	1 (3.297)
	Nº casos IMP	0 (3.297)
	Nº casos KPC	0 (3.297)
	Nº casos NDM	0 (3.297)
	Nº casos OXA-48	1 (3.297)
	Nº casos VIM	0 (3.297)

Taula 84: Sensibilitat antibiòtica hospitalària pediàtrica de *K. pneumoniae*. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
<i>K.pneumoniae</i>	% BLEE	8,0% (532)
	% S amoxicil·lina/ ac. clavulànic	74,2% (532)
	% S carbapenems	96,6% (513)
	% S cefuroxima	86,1% (525)
	% S gentamicina	93,5% (528)
	Nº casos carbapenemasa	9 (472)
	Nº casos IMP	0 (472)
	Nº casos KPC	1 (472)
	Nº casos NDM	4 (472)
	Nº casos OXA-48	2 (472)
	Nº casos VIM	2 (472)

Taula 85: Sensibilitat antibòtica hospitalària pediàtrica de *E. cloacae*. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
<i>E.cloacae</i>	% BLEE	1,9% (208)
	% S a cefepime amb cefotaxima R	14,9% (214)
	% S carbapenems	95,1% (207)
	Nº casos carbapenemasa	1 (200)
	Nº casos IMP	0 (200)
	Nº casos KPC	0 (200)
	Nº casos NDM	0 (200)
	Nº casos OXA-48	0 (200)
	Nº casos VIM	1 (200)

Taula 86: Sensibilitat antibòtica hospitalària pediàtrica de *P. aeruginosa*. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
<i>P.aeruginosa</i>	% XDR	5,1% (310)

Taula 87: Sensibilitat antibòtica hospitalària pediàtrica de *S. aureus*. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
<i>S.aureus</i>	% SARM	9,3% (1.337)

Taula 88: Sensibilitat antibòtica hospitalària pediàtrica de *E. faecalis*. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
<i>E.faecalis</i>	% S vancomicina	100,0% (516)

Taula 89: Sensibilitat antibòtica hospitalària pediàtrica de *E. faecium*. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
<i>E.faecium</i>	% S vancomicina	97,3% (37)

Taula 90: Sensibilitat antibòtica hospitalària pediàtrica de *A. baumannii*. Any 2020.

Microorganisme	Atribut Antibòtic	Total Catalunya (N total)
	% S carbapenems	100,0% (84)
	Nº casos carbapenemasa	0 (84)
	Nº casos IMP	0 (84)
<i>A.baumannii</i>	Nº casos KPC	0 (84)
	Nº casos NDM	0 (84)
	Nº casos OXA-48	0 (84)
	Nº casos VIM	0 (84)

OBJECTIU 7: Protocol de prevalença de les infeccions als centres socio-sanitaris

Resultats tall de prevalença de novembre

Prevalença de pacients i d'infeccions

Taula 91: Distribució dels pacients segons sexe i edat. Novembre, any 2020.

Sexe	N ^a	% Rel ^b	Edat mitjana (Desv. Típ.)
Dona	3.313	56,14	83,64 (58,38)
Home	2.588	43,86	75,63 (40,05)
TOTAL	5.901	100,00	80,12 (51,31)

^aN: Nombre de pacients; ^b% Rel: Percentatge de pacients per categoria

Taula 92: Prevalença de pacients amb infeccions segons el tipus d'unitat. Novembre, any 2020.

Tipus d'unitat	Pacients		Prevalença de pacients amb alguna IRAS		
	N ^a	% Rel ^b	N ^c	% ^d	[IC 95%] ^e
Unitat de llarga estada	2.736	46,37	210	7,68	[7,00 a 8,35]
Unitat de convalescència	1.896	32,13	152	8,02	[7,32 a 8,71]
Unitat de subaguts	351	5,95	59	16,81	[15,86 a 17,76]
Altres	266	4,51	16	6,02	[5,41 a 6,62]
Unitat de cures paliatives	260	4,41	22	8,46	[7,75 a 9,17]
Unitat de psicogeriatría	232	3,93	23	9,91	[9,15 a 10,68]
Unitat polivalent	133	2,25	18	13,53	[12,66 a 14,41]
Unitat de SIDA	27	0,46	1	3,70	[3,22 a 4,19]
Total	5.901	100,00	501	8,49	[7,78 a 9,20]

^aPacients N: Nombre de pacients; ^b% Rel: Percentatge de pacients per categoria; ^cPrevalença de pacients amb infecció N: Nombre de pacients amb alguna infecció.; ^dPrevalença de pacients amb infecció %: Percentatge de pacients amb alguna infecció.; ^ePrevalença de pacients amb infecció IC 95%: Interval de confiança del 95%.

Figura 95: Distribució de la prevalença de pacients amb alguna IRAS en funció del tipus d'unitat. Novembre, any 2020.





Figura 96: Distribució de les prevalences d'IRAS dels CSS en funció del tipus d'unitat. Novembre, any 2020.



Els punts de la Figura 96 representen el percentatge de prevalència dels CSS que recullen dades de cada unitat. Els quadrats representen la prevalència mitjana de cada unitat. Unicament es mostren els centres que han tingut alguna IRAS i més de 10 pacients.

Taula 93: Prevalència de pacients i d'infeccions segons regió sanitària (RS). Novembre, any 2020.

Regió sanitària	Pacients		Prevalència de pacients amb alguna IRAS		
	N ^a	% Rel ^b	N ^c	% ^d	[IC 95%] ^e
Barcelona	3.739	63,36	328	8,77	[8,05 a 9,49]
Girona	615	10,42	45	7,32	[6,65 a 7,98]
Camp De Tarragona	526	8,91	63	11,98	[11,15 a 12,81]
Catalunya Central	381	6,46	25	6,56	[5,93 a 7,19]
Desconegut	292	4,95	7	2,40	[2,01 a 2,79]
Terres De L'ebre	176	2,98	29	16,48	[15,53 a 17,42]
Lleida	172	2,91	4	2,33	[1,94 a 2,71]
Alt Pirineu I Aran	0	0,00	0	-	-
Total	5.901	100,00	501	8,49	[7,78 a 9,20]

^aPacients N: Nombre de pacients; ^b% Rel: Percentatge de pacients per categoria; ^cPrevalència de pacients amb infecció N: Nombre de pacients amb alguna infecció.; ^dPrevalència de pacients amb infecció %: Percentatge de pacients amb alguna infecció.; ^ePrevalència de pacients amb infecció IC 95%: Interval de confiança del 95%.

Taula 94: Prevalència de pacients i d'infeccions segons el sexe. Novembre, any 2020.

Sexe	Pacients		Prevalència de pacients amb alguna IRAS		
	N ^a	% Rel ^b	N ^c	% ^d	[IC 95%] ^e
Dona	3.313	56,14	279	8,42	[7,71 a 9,13]
Home	2.588	43,86	222	8,58	[7,86 a 9,29]
Total	5.901	100,00	501	8,49	[7,78 a 9,20]

^aPacients N: Nombre de pacients; ^b% Rel: Percentatge de pacients per categoria; ^cPrevalència de pacients amb infecció N: Nombre de pacients amb alguna infecció.; ^dPrevalència de pacients amb infecció %: Percentatge de pacients amb alguna infecció.; ^ePrevalència de pacients amb infecció IC 95%: Interval de confiança del 95%.

Taula 95: Prevalència de pacients i d'infeccions segons dècades d'edat. Novembre, any 2020.

Dècades d'edat	Pacients		Prevalència de pacients amb alguna IRAS		
	N ^a	% Rel ^b	N ^c	% ^d	[IC 95%] ^e
>= 80 Anys	3.509	59,46	341	9,72	[8,96 a 10,47]
70 - 79 Anys	1.217	20,62	89	7,31	[6,65 a 7,98]
60 - 69 Anys	650	11,02	45	6,92	[6,28 a 7,57]
50 - 59 Anys	322	5,46	18	5,59	[5,00 a 6,18]
40 - 49 Anys	132	2,24	5	3,79	[3,30 a 4,27]
30 - 39 Anys	44	0,75	2	4,55	[4,01 a 5,08]
20 - 29 Anys	22	0,37	1	4,55	[4,01 a 5,08]
10 - 19 Anys	1	0,02	0	0,00	[0,00 a 0,00]
0 - 9 Anys	4	0,07	0	0,00	[0,00 a 0,00]
Total	5.901	100,00	501	8,49	[7,78 a 9,20]

^aPacients N: Nombre de pacients; ^b% Rel: Percentatge de pacients per categoria; ^cPrevalència de pacients amb infecció N: Nombre de pacients amb alguna infecció.; ^dPrevalència de pacients amb infecció %: Percentatge de pacients amb alguna infecció.; ^ePrevalència de pacients amb infecció IC 95%: Interval de confiança del 95%.

Taula 96: Prevalència de pacients i d'infeccions segons grups d'edat. Novembre, any 2020.

Grups d'edat	Pacients		Prevalència de pacients amb alguna IRAS		
	N ^a	% Rel ^b	N ^c	% ^d	[IC 95%] ^e
>= 65 Anys	5.089	86,24	459	9,02	[8,29 a 9,75]
18 - 64 Anys	808	13,69	42	5,20	[4,63 a 5,76]
< 18 Anys	4	0,07	0	0,00	[0,00 a 0,00]
Total	5.901	100,00	501	8,49	[7,78 a 9,20]

^aPacients N: Nombre de pacients; ^b% Rel: Percentatge de pacients per categoria; ^cPrevalència de pacients amb infecció N: Nombre de pacients amb alguna infecció.; ^dPrevalència de pacients amb infecció %: Percentatge de pacients amb alguna infecció.; ^ePrevalència de pacients amb infecció IC 95%: Interval de confiança del 95%.

Taula 97: Prevalència de pacients i d'infeccions segons localització de la infecció. Novembre, any 2020.

Localització	Prevalència de pacients amb alguna IRAS a l'ingrés actual			
	N Pac. ^a	% Prev. ^b	N Infec. ^c	% Rel ^d
Altres infeccions	26	0,44	26	0,44
Infeccions de pell i part toves	72	1,22	80	1,36
Infeccions del tracte gastrointestinal	11	0,19	13	0,22
Infeccions respiratòries	143	2,43	145	2,46
Infeccions urinàries	242	4,12	250	4,24
Desconeugut	7	0,12	9	0,15
Total	501	8,52	523	100,00

^a**N Pac.:** Nombre de pacients amb alguna infecció del tipus especificat.; ^b**% Prev.:** Prevalència de la infecció segons la localització d'aquesta.; ^c**N Infec.:** Nombre d'infeccions del tipus especificat.; ^d**% Rel:** Percentatge sobre el total d'infeccions.

Situació de salut del pacient

Taula 10: Distribució de pacients i prevalença d'infeccions segons la situació del pacient.

Situació del pacient	Pacients		Prevalença de pacients amb alguna IRAS a l'ingrés actual		
	N ^a	% Rel. ^b	N ^c	% ^d	% [IC 95%] ^e
Desorientació T/E	2.792	47,31	271	4,59	[4,06 a 5,13]
Gran dependència	2.667	45,20	286	4,85	[4,30 a 5,39]
Distàgia	1.526	25,86	162	2,75	[2,33 a 3,16]
Úlceres per pressió	876	14,84	116	1,97	[1,61 a 2,32]
Incontinència fecal i/o urinària	3.606	61,11	378	6,41	[5,78 a 7,03]
Intervenció quirúrgica recent (<30 dies)	508	8,61	43	0,73	[0,51 a 0,95]

^aPacients N: Nombre de pacients; ^bPacients % Rel: Percentatge de pacients per categoria; ^cPrevalença de pacients amb infecció N: Nombre de pacients amb alguna infecció.; ^dPrevalença de pacients amb infecció %: Percentatge de pacients amb alguna infecció.; ^ePrevalença de pacients amb infecció IC 95%: Interval de confiança del 95%.

Ús de dispositius

Taula 11: Distribució de pacients i prevalença d'infeccions segons l'ús de dispositius.

Dispositius	Pacients		Prevalença de pacients amb alguna IRAS a l'ingrés actual		
	N ^a	% Rel. ^b	N ^c	% ^d	% [IC 95%] ^e
Catèter urinari	620	10,51	99	1,68	[1,35 a 2,01]
Catèter vascular	913	15,47	175	2,97	[2,53 a 3,40]
Catèter vascular perifèric	789	13,37	155	2,63	[2,22 a 3,03]
Catèter vascular central	93	1,58	14	0,24	[0,11 a 0,36]
Traqueotomia	66	1,12	5	0,08	[0,01 a 0,16]
Gastrostomia (PEG)	124	2,10	8	0,14	[0,04 a 0,23]
Sonda nasogàstrica	33	0,56	4	0,07	[0,00 a 0,13]

^aPacients N: Nombre de pacients; ^bPacients % Rel: Percentatge de pacients per categoria; ^cPrevalença de pacients amb infecció N: Nombre de pacients amb alguna infecció.; ^dPrevalença de pacients amb infecció %: Percentatge de pacients amb alguna infecció.; ^ePrevalença de pacients amb infecció IC 95%: Interval de confiança del 95%.

Figura 97: Distribució de l'índex de Barthel. Novembre,any 2020.




Figura 98: Distribució de l'índex de morbilitat de Charlson Novembre,any 2020.





Figura 99: Distribució de l'índex GDS de Reisberg. Novembre, any 2020.



Distribució i prevalença de microorganismes

Taula 98: Distribució i prevalença de microorganismes. Novembre, any 2020.

Família/Grup de microorganisme	1er microorganisme	2on microorganisme	Total microorganismes
FONGS	4 (0,82%)	0 (0,00%)	4 (0,40%)
<i>Candida</i> spp.	2 (0,41%)	0 (0,00%)	2 (0,20%)
<i>Candida albicans</i>	2 (0,41%)	0 (0,00%)	2 (0,20%)
BACILS GRAM NEGATIUS	181 (36,94%)	27 (5,33%)	208 (20,86%)
<i>Escherichia coli</i>	84 (17,14%)	5 (0,99%)	89 (8,93%)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	25 (5,10%)	7 (1,38%)	32 (3,21%)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	29 (5,92%)	2 (0,39%)	31 (3,11%)
<i>Proteus mirabilis</i>	22 (4,49%)	7 (1,38%)	29 (2,91%)
<i>Klebsiella</i> spp.	7 (1,43%)	1 (0,20%)	8 (0,80%)
<i>Morganella morgagni</i>	3 (0,61%)	1 (0,20%)	4 (0,40%)
<i>Enterobacter cloacae</i>	4 (0,82%)	0 (0,00%)	4 (0,40%)
<i>Citrobacter freundii</i>	0 (0,00%)	2 (0,39%)	2 (0,20%)
<i>Providencia stuartii</i>	2 (0,41%)	0 (0,00%)	2 (0,20%)
<i>Enterobacter aerogenes</i>	1 (0,20%)	1 (0,20%)	2 (0,20%)
<i>Klebsiella oxytoca</i>	2 (0,41%)	0 (0,00%)	2 (0,20%)
<i>Aeromonas</i> spp.	1 (0,20%)	0 (0,00%)	1 (0,10%)
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	0 (0,00%)	1 (0,20%)	1 (0,10%)
<i>Serratia</i> spp.	1 (0,20%)	0 (0,00%)	1 (0,10%)
BACILS GRAM POSITIUS	2 (0,41%)	0 (0,00%)	2 (0,20%)
<i>Bacillus</i> spp.	1 (0,20%)	0 (0,00%)	1 (0,10%)
<i>Corynebacterium</i> spp.	1 (0,20%)	0 (0,00%)	1 (0,10%)
COCS GRAM POSITIUS	30 (6,12%)	12 (2,37%)	42 (4,21%)
<i>Enterococcus faecalis</i>	12 (2,45%)	8 (1,58%)	20 (2,01%)
<i>S. aureus</i> resistent a la meticilina (SARM)	4 (0,82%)	3 (0,59%)	7 (0,70%)
<i>Enterococcus faecium</i>	4 (0,82%)	1 (0,20%)	5 (0,50%)
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	4 (0,82%)	0 (0,00%)	4 (0,40%)
<i>S. pneumoniae</i> (Pneumococ)	2 (0,41%)	0 (0,00%)	2 (0,20%)
<i>S. aureus</i> sensible a la meticilina	2 (0,41%)	0 (0,00%)	2 (0,20%)
<i>Staphylococcus</i> spp.	1 (0,20%)	0 (0,00%)	1 (0,10%)
<i>Streptococcus agalactiae</i>	1 (0,20%)	0 (0,00%)	1 (0,10%)
ALTRES	23 (4,69%)	3 (0,59%)	26 (2,61%)
Altres	23 (4,69%)	3 (0,59%)	26 (2,61%)

Taula 98: Distribució i prevalença de microorganismes. Novembre, any 2020.

Família/Grup de microorganisme	1er microorganisme	2on microorganisme	Total microorganismes
CULTIUS NO PRACTICATS	244 (49,80%)	464 (91,52%)	708 (71,01%)
A.A. Cultius no practicats	244 (49,80%)	464 (91,52%)	708 (71,01%)
CULTIUS NEGATIUS	5 (1,02%)	0 (0,00%)	5 (0,50%)
A.B. Cultius negatius	5 (1,02%)	0 (0,00%)	5 (0,50%)
ANAEROBIS	0 (0,00%)	1 (0,20%)	1 (0,10%)
<i>Fusobacterium</i> spp.	0 (0,00%)	1 (0,20%)	1 (0,10%)
IGUAL O MÉS DE 3 GÈRMENS	1 (0,20%)	0 (0,00%)	1 (0,10%)
igual o més de 3 gèrmens	1 (0,20%)	0 (0,00%)	1 (0,10%)
TOTAL	490	507	997

* El nombre total de microorganismes és superior al total d'episodis per què s'incorporen els d'etologia polimicrobiana (els microorganismes 1 i 2).

Distribució i prevalença de l'ús d'antimicrobians

Taula 99: Distribució d'antimicrobians i prevalença de pacients amb antimicrobians segons l'indicació. Novembre, any 2020.

Indicació	Pacients amb antimicrobians		Prescripcions d'antimicrobians	
	N	% Prev	N	% Rel
Tractament empíric	369	6,25	393	52,05
Tractament dirigit	288	4,88	322	42,65
Profilaxi mèdica	29	0,49	30	3,97
Altres indicacions	6	0,10	6	0,79
Profilàxi quirúrgica o altres	4	0,07	4	0,53
TOTAL			755	100,00

Un total de 689 (11,69%) pacients prenen antimicrobians.

Taula 100: Distribució d'antimicrobians i prevalença de pacients amb antimicrobians segons l'indicació. Novembre, any 2020.

Família/Codi-ATB	N	% Rel	% Prev.
ALTRES ANTIBACTERIANS	94	12,47	1,59
J01XX01 - FOSFOMICINA	44	5,84	0,75
J01XA01 - VANCOMICINA	13	1,72	0,22
J01XX08 - LINEZOLID	10	1,33	0,17
J01XD01 - METRONIDAZOLE	8	1,06	0,14
J01XE01 - NITROFURANTOÏNA	7	0,93	0,12
J01XA02 - TEICOPLANINA	6	0,80	0,10
J01XB01 - COLISTINA	4	0,53	0,07
J01XX09 - DAPTOMICINA	2	0,27	0,03
ALTRES CEFALOSPORINES I PENEMS	1	0,13	0,02
J01DI54 - CEFTOROLANO/TAZOBACTAM	1	0,13	0,02
AMFENICOLS	1	0,13	0,02
J01BA01 - CLORAMFENICOL	1	0,13	0,02
AMINOGLICÒSIDS	16	2,12	0,27
J01GB01 - TOBRAMICINA	9	1,19	0,15
J01GB06 - AMIKACINA	4	0,53	0,07
J01GB03 - GENTAMICINA	3	0,40	0,05
ANTIMICÒTICS ÚS SISTÈMIC	11	1,46	0,19
J02AC01 - FLUCONAZOLE	10	1,33	0,17
J02AB02 - KETOCONAZOLE	1	0,13	0,02
CARBAPENEMS	58	7,69	0,98
J01DH03 - ERTAPENEM	30	3,98	0,51
J01DH02 - MEROPENEM	17	2,25	0,29
J01DH51 - IMIPENEM-CILASTATINA	11	1,46	0,19
CEFALOSPORINES	140	18,57	2,37
J01DD04 - CEFTRIAXONA	77	10,21	1,30
J01DC02 - CEFUROXIMA	38	5,04	0,64
J01DD02 - CEFTAZIDIMA	11	1,46	0,19
J01DD08 - CEFIXIMA	8	1,06	0,14
J01DE01 - CEFEPIMA	3	0,40	0,05
J01DB04 - CEFAZOLINA	1	0,13	0,02
J01DC01 - CEFOXITINA	1	0,13	0,02
J01DD16 - CEFDITORÈN	1	0,13	0,02

Taula 100: Distribució d'antimicrobians i prevalença de pacients amb antimicrobians segons l'indicació. Novembre, any 2020.

Família/Codi-ATB	N	% Rel	% Prev.
FÀRMACS PER AL TRACTAMENT DE LA TUBERCULOSI	11	1,46	0,19
J04AB02 - RIFAMPICINA	11	1,46	0,19
MACRÒLIDS, LINCOSAMIDES I ESTREPTOGRAMINES	27	3,58	0,46
J01FA10 - AZITROMICINA	15	1,99	0,25
J01FF01 - CLINDAMICINA	12	1,59	0,20
MONOBACTAMS	2	0,27	0,03
J01DF01 - AZTREONAM	2	0,27	0,03
PENICIL·LINES	215	28,51	3,64
J01CR02 - AMOXICIL·LINA/CLAVUL	164	21,75	2,78
J01CR05 - PIPERACIL·LINA/TAZOBACTAM	38	5,04	0,64
J01CA04 - AMOXICIL·LINA	7	0,93	0,12
J01CF02 - CLOXACIL·LINA	5	0,66	0,08
J01CA01 - AMPICIL·LINA	1	0,13	0,02
QUINOLONES	125	16,58	2,12
J01MA02 - CIPROFLOXACINA	69	9,15	1,17
J01MA12 - LEVOFLOXACINA	48	6,37	0,81
J01MA06 - NORFLOXACINA	8	1,06	0,14
SULFONAMIDES I TRIMETOPRIM	47	6,23	0,80
J01EE01 - SULFAMETOXAZOLE-TRIMETOPRIM	43	5,70	0,73
J01EA01 - TRIMETOPRIM	4	0,53	0,07
TETRACICLINES	6	0,80	0,10
J01AA02 - DOXICICLINA	6	0,80	0,10
TOTAL	1.508	100,00	25,55

OBJECTIU 8: Vigilància de les infeccions nosocomials a les unitats de cures intensives de pediatria i neonatologia

Unitat de cures intensives pediàtriques (UCIPs)

Taula 101: Ràtio d'utilització, taxa de BRCVC per 1.000 pacients-dies d'ingrés i d'utilització de CVC segons nivell de complexitat desglossat per centre. Any 2020.

Nivell complexitat/UP	Episodis de BRCVC ^a	Pacients-dies d'ingrés a UCIP	Pacients-dies d'exposició a CVC ^b	Ràtio d'utilització	BRCVC x 1.000 pacients-dies d'ingrés	BRCVC x 1.000 pacient-dies de CVC ^b
IIIA	1	2.886	1.516	0,53	0,35	0,66
A	0	740	260	0,35	0,00	0,00
B	1	703	224	0,32	1,42	4,46
C	0	976	894	0,92	0,00	0,00
D	0	137	105	0,77	0,00	0,00
E	0	330	33	0,10	0,00	0,00
IIIB	24	9.183	6.030	0,66	2,61	3,98
F	10	4.835	2.436	0,50	2,07	4,11
G	14	4.348	3.594	0,83	3,22	3,90
Total	25	12.069	7.546	0,63	2,07	3,31

^aBRCVC: Bacterièmia relacionada amb catèter venós central; ^bCVC: Catèter Venós Central

Durant l'any 2020 han participat en la vigilància de les bacterièmies relacionades amb catèter venós central a UCIs pediàtriques un total de 7 centres (5 nivell IIIA i 2 nivell IIIB). La taxa global de bacterièmia relacionada amb catèter venós central (BRCVC) ha estat de $3,31 \times 1.000$ dies de catèter, amb una ràtio d'utilització de CVC de 0,63. En 4 dels 7 centres participants no s'ha registrat cap BRCVC l'any 2020.

Figura 100: Taxes de BRCVC dels centres segons nivell de complexitat. Any 2020.





Figura 101: Evolució de la taxa de BRCVC segons nivell de complexitat. Any 2020.



Taula 102: Ràtio d'utilització, taxa de BRCVC per 1.000 pacients-dies d'ingrés i d'utilització de CVC segons nivell de complexitat desglossat per centre. Any 2020.

Any	Nivell complexitat	Episodis de BRCVC	Pacients-dies d'ingrés a UCIP	Pacients-dies d'exposició a CVC	Ràtio d'utilització	BRCVC x 1.000 pacient-dies d'ingrés	BRCVC x 1.000 pacient-dies de CVC
2012	IIIA	0	3.255	1.289	0,40	0,00	0,00
	IIIB	59	10.096	6.697	0,66	5,84	8,81
2013	IIIA	3	2.857	1.189	0,42	1,05	2,52
	IIIB	16	8.550	5.992	0,70	1,87	2,67
2014	IIIA	1	2.893	1.239	0,43	0,35	0,81
	IIIB	22	9.027	6.355	0,70	2,44	3,46
2015	IIIA	3	3.899	1.537	0,39	0,77	1,95
	IIIB	9	4.251	2.631	0,62	2,12	3,42
2016	IIIA	0	4.251	1.364	0,32	0,00	0,00
	IIIB	11	4.512	2.552	0,57	2,44	4,31
2017	IIIA	3	3.098	1.154	0,37	0,97	2,60
	IIIB	28	9.132	5.471	0,60	3,07	5,12
2018	IIIA	1	4.018	1.315	0,33	0,25	0,76
	IIIB	22	10.754	5.953	0,55	2,05	3,70
2019	IIIA	0	3.951	1.165	0,29	0,00	0,00
	IIIB	18	6.785	6.551	0,97	2,65	2,75
2020	IIIA	1	2.886	1.516	0,53	0,35	0,66
	IIIB	24	9.183	6.030	0,66	2,61	3,98
Total		221	103.398	60.000	0,58	2,14	3,68

** Mid-p valor de la prova exacta de Poisson (confiança del 95%) per comparar les taxes globals de BRCVC de l'any 2012 (7,38793) i 2020 (3,31301): P=0

Taula 103: Microorganismes responsables de BRCVC a UCIs pediàtriques. Any 2020.

Família/Grup de microorganisme	N	%
BACIIS GRAM NEGATIUS	12	40,00
<i>Serratia marcescens</i>	4	13,33
<i>Enterobacter cloacae</i>	3	10,00
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	2	6,67
<i>Escherichia coli</i>	1	3,33
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1	3,33
<i>Serratia</i> spp.	1	3,33
COCS GRAM POSITIUS	17	56,67
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	7	23,33
<i>Enterococcus faecalis</i>	4	13,33
<i>Staphylococcus</i> spp.	3	10,00
<i>S. coagulasa negatiu</i>	2	6,67
<i>S. aureus</i> sensible a la meticilina	1	3,33
FONGS	1	3,33
<i>Candida</i> spp.	1	3,33
TOTAL	30	

* El nombre total de microorganismes és superior al total d'episodis per què s'incorporen els d'etologia polimicrobiana (els microorganismes 1 i 2).

Unitat de cures intensives neonatals (UCINs)

Taula 104: Ràtio d'utilització, taxa de BRCVC per 1.000 pacients-dies d'ingrés i d'utilització de CVC segons nivell de complexitat desglossat per centre. Any 2020.

Nivell complexitat/UP	Episodis de BRCVC ^a	Pacients-dies d'ingrés a UCIP	Pacients-dies d'exposició a CVC ^b	Ràtio d'utilització	BRCVC x 1.000 pacients-dies d'ingrés	BRCVC x 1.000 pacient-dies de CVC ^b
IIIA	9	17.301	4.921	0,28	0,52	1,83
A	0	288	42	0,15	0,00	0,00
B	5	1.969	629	0,32	2,54	7,95
C	0	5.292	1.958	0,37	0,00	0,00
D	1	1.950	363	0,19	0,51	2,75
E	0	1.078	545	0,51	0,00	0,00
F	0	154	32	0,21	0,00	0,00
G	3	600	217	0,36	5,00	13,82
H	0	2.124	409	0,19	0,00	0,00
I	0	3.030	392	0,13	0,00	0,00
J	0	747	268	0,36	0,00	0,00
K	0	69	66	0,96	0,00	0,00
IIIB	30	12.684	5.696	0,45	2,37	5,27
L	17	5.802	2.461	0,42	2,93	6,91
M	13	6.882	3.235	0,47	1,89	4,02
Total	39	29.985	10.617	0,35	1,30	3,67

^aBRCVC: Bacterièmia relacionada amb catèter venós central; ^bCVC: Catèter Venós Central

Durant l'any 2020 han participat en la vigilància de les bacterièmies relacionades amb catèter venós central a UCIs neonatals un total de 13 centres (11 nivell IIIA i 2 nivell IIIB). La taxa global de bacterièmia relacionada amb catèter venós central (BRCVC) ha estat de $3,67 \times 1.000$ dies de catèter, amb una ràtio d'utilització de CVC de 0,35. En 8 dels 13 centres participants no s'ha registrat cap BRCVC l'any 2020.

Figura 102: Taxes de BRCVC dels centres segons nivell de complexitat. Any 2020.




Figura 102: Evolució de la taxa de BRCVC segons nivell de complexitat. Any 2020.



Taula 105: Ràtio d'utilització, taxa de BRCVC per 1.000 pacients-dies d'ingrés i d'utilització de CVC segons nivell de complexitat desglossat per centre. Any 2020.

Any	Nivell complexitat	Episodis de BRCVC	Pacients-dies d'ingrés a UCIP	Pacients-dies d'exposició a CVC	Ràtio d'utilització	BRCVC x 1.000 pacient-dies d'ingrés	BRCVC x 1.000 pacient-dies de CVC
2012	IIIA	7	14.664	3.396	0,23	0,48	2,06
	IIIB	18	15.126	8.566	0,57	1,19	2,10
2013	IIIA	4	13.260	3.516	0,27	0,30	1,14
	IIIB	36	12.848	6.958	0,54	2,80	5,17
2014	IIIA	10	16.971	6.386	0,38	0,59	1,57
	IIIB	37	13.028	7.245	0,56	2,84	5,11
2015	IIIA	14	10.820	3.599	0,33	1,29	3,89
	IIIB	6	4.259	2.160	0,51	1,41	2,78
2016	IIIA	19	15.003	5.224	0,35	1,27	3,64
	IIIB	14	4.367	2.395	0,55	3,21	5,85
2017	IIIA	10	8.997	4.157	0,46	1,11	2,41
	IIIB	33	12.733	4.991	0,39	2,59	6,61
2018	IIIA	19	14.697	4.499	0,31	1,29	4,22
	IIIB	24	13.109	5.580	0,43	1,83	4,30
2019	IIIA	22	14.531	4.385	0,30	1,51	5,02
	IIIB	29	6.481	5.984	0,92	4,47	4,85
2020	IIIA	9	17.301	4.921	0,28	0,52	1,83
	IIIB	30	12.684	5.696	0,45	2,37	5,27
Total		341	220.879	87.574	0,40	1,54	3,89

** Mid-p valor de la prova exacta de Poisson (confiança del 95%) per comparar les taxes globals de BRCVC de l'any 2012 (7,38793) i 2020 (3,31301): P=0

Taula 105: Taxa de BRCVC segons pes al néixer. Any 2020.

Grup de pes al néixer (gr)	Episodis de BRCVC	Pacients-dies d'ingrés a UCIN	Pacients-dies d'exposició a CVC	Ràtio d'utilització	BRCVC x 1.000 pacient-dies de CVC
≤ 1.000	15	8.164	3.285	0,40	4,57
1.001-1.500	8	7.149	2.698	0,38	2,97
1.501-2.500	8	6.990	1.891	0,27	4,23
2.500	8	7.682	2.743	0,36	2,92
Total	39	29.985	10.617	0,35	3,67

Taula 106: Microorganismes responsables de BRCVC a UCIs neonatales. Any 2020.

Família/Grup de microorganisme	N	%
BACILS GRAM NEGATIUS	10	20,83
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	5	10,42
<i>Enterobacter cloacae</i>	2	4,17
<i>Serratia marcescens</i>	2	4,17
<i>Escherichia coli</i>	1	2,08
COCS GRAM POSITIUS	38	79,17
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	24	50,00
<i>S. coagulasa negatiu</i>	7	14,58
<i>Staphylococcus</i> spp.	4	8,33
<i>S. aureus</i> sensible a la meticilina	2	4,17
<i>Enterococcus faecalis</i>	1	2,08
TOTAL	48	

* El nombre total de microorganismes és superior al total d'episodis per què s'incorporen els d'etologia polimicrobiana (els microorganismes 1 i 2).

OBJECTIU 9: Protocol de vigilància de la Higiene de Mans


Unitats d'hospitalització convencional

Resultats del consum de preparats de base alcohòlica (PBA) per a la higiene de mans

Taula 107: Nombre total de litres de PBA entregats a les unitats o plantes d'hospitalització x 1.000 estades (pacients-dies). Any 2020.

Grup	Nre. centres	Litres PBA	Estades	Litres PBA/estades x 1.000	IC 95%
Grup I	9	99.234	1.273.624	77,91	[77,43 a 78,40]
Grup II	19	58.284	1.197.687	48,66	[48,27 a 49,06]
Grup III	30	30.020	659.104	45,55	[45,03 a 46,06]
Grup IV	4	5.466	86.750	63,01	[61,35 a 64,70]
TOTAL	62	193.004	3.217.165	59,99	[59,72 a 60,26]

Figura 103: Distribució del consum de PBA als diferents centres segons grup de centre. Any 2020.




Resultats de la prevalença de llits amb dispensador de PBA ubicats al punt d'atenció

Taula 108: Prevalença de llits d'hospitalització amb dispensador de PBA al punt d'atenció. Any 2020.

Grup	Nre. centres	Llits hosp. amb PBA al punt d'atenció	Llits hosp. evaluats	Prevalença de llits amb PBA al punt d'atenció
Grup I	9	4.551	5.341	85,21
Grup II	19	4.002	4.517	88,60
Grup III	30	2.661	3.164	84,10
Grup IV	4	301	301	100,00
TOTAL	62	11.515	13.323	86,43

Figura 104: Distribució de la prevalença de llits d'hospitalització amb dispensador de PBA al punt d'atenció als diferents centres segons grup de centre. Any 2020.




Evolució del consum de PBA

Taula 109: Evolució del consum PBA a les unitats d'hospitalització convencional i a les unitats d'UCI.

Any	Unitats d'hospitalització convencional					Unitats d'UCI				
	Grup I	Grup II	Grup III	Grup IV	Global	Grup I	Grup II	Grup III	Grup IV	Global
2014	28,99	17,95	16,93	10,07	21,93	66,53	48,09	30,00	-	58,78
2015	22,89	20,60	16,06	19,80	20,67	57,73	53,69	28,10	-	55,46
2016	26,02	17,03	16,46	24,41	20,68	63,17	54,30	30,81	-	59,03
2017	26,79	20,05	17,66	29,56	22,50	67,55	56,47	33,09	-	62,50
2018	37,57	19,07	20,83	28,31	25,94	93,17	60,11	40,32	-	77,67
2019	38,10	21,13	21,78	29,02	27,78	99,83	76,14	69,06	-	89,25
2020	77,91	48,66	45,79	63,01	60,04	190,79	146,44	204,02	-	176,17

Figura 105: Evolució del consum PBA a les unitats d'hospitalització convencional i a les unitats d'UCI.




Unitats de cures intensives (UCI)

Resultats del consum de preparats de base alcohòlica (PBA) per a la higiene de mans

Taula 110: Nombre total de litres de PBA entregats a les unitats de cures intensives (UCI) x 1.000 estades (pacients-dies). Any 2020.

Grup	Nre. centres amb UCI	Litres PBA	Estades	Litres PBA/estades x 1.000	IC 95%
Grup I	9	38.039	199.380	190,79	[188,87 a 192,71]
Grup II	18	15.824	108.060	146,44	[144,16 a 148,74]
Grup III	6	2.191	10.175	215,33	[206,41 a 224,54]
TOTAL	33	56.054	317.615	176,48	[175,03 a 177,95]

Figura 106: Litres de PBA a les unitats segons grup d'hospital. Any 2020.




Resultats de la prevalença de llits amb dispensador de PBA ubicats al punt d'atenció

Taula 111: Prevalença de llits d'hospitalització amb dispensador de PBA al punt d'atenció. Any 2020.

Grup	Nre. centres amb UCI	Llits hosp. amb PBA al punt d'atenció	Llits hosp. evaluats	Prevalença de llits amb PBA al punt d'atenció
Grup I	9	745	747	99,73
Grup II	18	452	453	99,78
Grup III	5	45	45	100,00
TOTAL	32	1.242	1.245	99,76

Figura 107: Distribució de la prevalença de llits d'hospitalització amb dispensador de PBA al punt d'atenció als diferents centres segons grup de centre. Any 2020.



Evolució de la prevalença de llits d'hospitalització amb dispensador de PBA al punt d'atenció

Taula 112: Evolució de la prevalença de llits d'hospitalització amb dispensador de PBA al punt d'atenció.

Any	Unitats d'hospitalització convencional					Unitats d'UCI				
	Grup I	Grup II	Grup III	Grup IV	Global	Grup I	Grup II	Grup III	Grup IV	Global
2014	73,40	80,02	51,01	NaN	70,08	100,00	100,00	73,53	-	98,53
2015	70,24	72,25	64,56	75,68	69,81	96,75	98,52	89,74	-	97,11
2016	75,04	80,30	76,42	98,31	77,89	98,22	99,47	100,00	-	98,80
2017	80,54	80,19	85,60	98,68	81,98	99,48	99,75	100,00	-	99,61
2018	81,17	84,24	83,99	98,56	83,43	86,72	91,44	234,29	-	95,14
2019	83,77	77,90	87,80	100,00	82,60	97,00	97,57	110,00	-	97,72
2020	85,21	88,60	84,35	100,00	86,48	99,73	99,78	100,00	-	99,76

Figura 108: Evolució de la prevalença de llits d'hospitalització amb dispensador de PBA al punt d'atenció.

