



Théorème ergodique pour cocycle harmonique, applications au milieu aléatoire. Ergodic theorem for harmonic cocycle, applications in random environment.

Jérôme Depauw

► To cite this version:

Jérôme Depauw. Théorème ergodique pour cocycle harmonique, applications au milieu aléatoire. Ergodic theorem for harmonic cocycle, applications in random environment.. 2013. <hal-00858760>

HAL Id: hal-00858760

<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00858760>

Submitted on 6 Sep 2013

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Théorème ergodique pour cocycle harmonique,
applications au milieu aléatoire
Ergodic theorem for harmonic cocycle,
applications in random environment

Jérôme Depauw

18 janvier 2013

Résumé

Dans ce travail est démontré le théorème ergodique ponctuel pour cocycle harmonique de degré 1 d'une action mesurable stationnaire de \mathbb{Z}^d sur un espace de probabilité. Ceci constitue un prolongement de l'article de Boivin et Derriennic (1991), qui portait sur les cocycles non nécessairement harmoniques. L'hypothèse d'harmonicité permet, dans le cas elliptique, d'abaisser la condition d'intégrabilité à L^2 , alors que Boivin et Derriennic ont montré que la condition optimale dans le cas non harmonique est la finitude de la norme de Lorentz $L_{d,1}$. Ils ont montré notamment que L^d ne suffit pas. Le présent travail constitue aussi une suite à un article de Berger et Biskup (2007) qui portait sur le cas harmonique non elliptique, en dimension $d = 2$. Enfin des applications de ce théorème au milieu aléatoire sont présentées.

Abstract. In this work we prove the pointwise ergodic theorem for harmonic degree 1 cocycle of a measurable stationary action of \mathbb{Z}^d on a probability space. In a precedent paper Boivin and Derriennic (1991) studied this theorem for not necessarily harmonic cocycles. The harmonic hypothesis allows, in the elliptic case, to change the integrability condition to L^2 , while Boivin and Derriennic showed that the optimum condition in the non-harmonic case is the finiteness of Lorentz's norm $L_{d,1}$. They showed in particular that L^d is not enough. Berger and Biskup published in 2007 a paper on the harmonic not elliptic case, but only in dimension $d = 2$. Finally, applications of this theorem in random media are presented.

1 Introduction

L'objet de ce travail est le théorème ergodique ponctuel pour cocycle harmonique d'une action stationnaire de \mathbb{Z}^d (théorème 1 ci-dessous). La présentation du cadre dans lequel se place ce résultat fait l'objet de cette introduction. C'est aussi l'occasion de présenter deux applications de ce théorème. Cette introduction est divisée en trois paragraphes. Le premier paragraphe propose quelques rappels sur le théorème ergodique en dimension 1. Le second porte sur la notion de cocycle de degré 1 en dimension d et sur le théorème ergodique associé. Enfin dans le troisième nous présentons la notion de cocycle harmonique, le théorème ergodique

qui fait l'objet de cet article, et son rôle dans certaines questions issues du domaine du milieu aléatoire.

1.1 Théorème ergodique en dimension $d = 1$

Soit un espace de probabilité (Ω, \mathcal{A}, P) , et T une transformation mesurable, inversible, telle que T et T^{-1} préservent la probabilité P . Le théorème ergodique ponctuel de Birkhoff énonce que pour toute fonction intégrable f sur Ω , les moyennes $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \circ T^k$ convergent presque sûrement, lorsque n tend vers l'infini. Si la transformation T est ergodique, c'est-à-dire n'admet pas d'ensemble invariant de probabilité non égale à 0 ou 1, la limite est constante, égale à l'intégrale $\int_{\Omega} f dP$ de la fonction f .

Ce résultat, ainsi que ses différentes démonstrations, sont devenues très classiques. Il est cependant utile, afin de rendre plus naturel le passage à la dimension supérieure, de rappeler une de ces démonstrations. Celle présentée ici pour T ergodique consiste en trois étapes.

On constate d'abord que la convergence est aisée à vérifier sur les cobords, c'est-à-dire sur les fonctions f pouvant s'écrire $f = g \circ T - g$, avec $g \in L^1$. En effet dans ce cas, les termes de la somme $S_n(\omega) = \sum_{k=0}^{n-1} f \circ T^k(\omega)$ se simplifient deux à deux, celle-ci s'écrit $S_n = g \circ T^n - g$. La convergence ponctuelle des moyennes de Césaro $\frac{1}{n} S_n$ vers 0, qui se résume donc à celle du terme $\frac{1}{n} g \circ T^n$, est alors une application directe du théorème de Borel-Cantelli. En effet celui-ci assure qu'une condition suffisante à cette convergence presque sûre est que la série

$$\sum_{n=1}^{+\infty} P\left(\left|\frac{1}{n} g \circ T^n\right| > \varepsilon\right)$$

converge pour tout ε . Par invariance de P sous l'action de T , cela revient à la convergence de la série

$$\sum_{n=1}^{+\infty} P(|g| > n\varepsilon).$$

Ceci est bien une condition équivalente à la convergence de l'intégrale $\int_{\Omega} |g| dP$.

La deuxième étape de la démonstration du théorème ergodique consiste à vérifier que toute fonction intégrable de moyenne nulle peut être approchée dans L^1 par des cobords. Cette propriété de densité peut être déduite du théorème de Hahn-Banach. En effet d'après ce théorème, s'il existait une fonction f d'intégrale nulle qui ne soit pas dans l'adhérence de l'espace des cobords, alors il existerait une forme linéaire nulle sur l'espace des cobords et non nulle sur f . Une forme linéaire de L^1 s'identifiant à une fonction $h \in L^{\infty}$, on aurait donc

$$\int (g \circ T - g)h dP = 0 \text{ pour tout } g \in L^1, \quad \text{et} \quad \int fh dP \neq 0.$$

De la première condition et de l'ergodicité de T on déduit que h est constante, la deuxième condition contredit alors le fait que f est d'intégrale non nulle. Ceci prouve la densité cherchée.

La démonstration du théorème ergodique ponctuelle s'achève en montrant que l'ensemble des fonctions f vérifiant le théorème ergodique ponctuel est fermé dans L^1 . Ceci est une conséquence de l'inégalité maximale

$$P\left(\sup_n \left|\frac{1}{n} S_n\right| > \varepsilon\right) < \frac{\int_{\Omega} |f| dP}{\varepsilon}$$

dont nous ne détaillons pas la démonstration ici. Cette inégalité maximale est le point délicat de la démonstration du théorème ergodique ponctuel.

1.2 Théorème ergodique en dimension $d \geq 1$

Il y a plusieurs généralisations possibles du théorème ergodique au cas multidimensionnel. La plus connue est celle de Wiener, qui consiste à faire des moyennes sur des cubes de dimension d dans \mathbb{Z}^d (voir [Wie39]).

Une autre généralisation du théorème (et de la démonstration) exposé ci-dessus à la dimension $d \geq 1$ est la suivante. Soient les transformations T_1, \dots, T_d mesurables inversibles, préservant la probabilité P . Lorsque de plus elles commutent deux à deux, on obtient une action de \mathbb{Z}^d en considérant pour $\vec{n} = (n_1, \dots, n_d) \in \mathbb{Z}^d$ la transformation $T_{\vec{n}} = T_1^{n_1} \circ \dots \circ T_d^{n_d}$. Commençons, par analogie avec la démonstration en dimension 1, à nous intéresser à la convergence ponctuelle des quantités $\frac{1}{|\vec{n}|} S_{\vec{n}}(\omega)$ vers 0, pour $|\vec{n}|$ tendant vers l'infini, où

$$\begin{aligned} - S_{\vec{n}} &= g \circ T_{\vec{n}} - g; \\ - |\vec{n}| &= \sum_{i=1}^d |n_i|. \end{aligned}$$

Celle-ci se résume, comme ci-dessus, à la convergence vers zéro du terme $\frac{1}{|\vec{n}|} g \circ T_{\vec{n}}$. Il découle à nouveau du théorème de Borel-Cantelli qu'une condition suffisante à cette convergence est que la série

$$\sum_{n_1=-\infty}^{+\infty} \dots \sum_{n_d=-\infty}^{+\infty} P\left(\left|\frac{1}{|\vec{n}|} g \circ T_{\vec{n}}\right| > \varepsilon\right)$$

converge pour tout ε . Or pour tout entier n , le nombre de vecteurs \vec{n} de norme $|\vec{n}|$ fixée, égale à n , est de l'ordre de n^{d-1} . Par invariance de T , la convergence de la série ci dessus revient donc à la convergence de la série

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^{d-1} P(|g| > n\varepsilon),$$

ce qui est cette fois une condition équivalente à la convergence de l'intégrale $\int_{\Omega} |g|^d dP$. Ainsi on voit que la condition d'intégrabilité pour la convergence ponctuelle étudiée dans ce paragraphe dépend de la dimension de l'action : c'est $g \in L^d$.

Pour identifier l'adhérence de l'espace des sommes $S_{\vec{n}}$ considérées ci-dessus, on remarque que celles-ci vérifient l'équation

$$S_{\vec{n}+\vec{m}} = S_{\vec{n}} + S_{\vec{m}} \circ T_{\vec{n}}. \quad (1)$$

Nous introduisons donc la notion correspondante, par la définition suivante.

Définition 1 (Cocycle de degré 1). Un cocycle de degré 1 d'une action T mesurable stationnaire de \mathbb{Z}^d est un processus $(S_{\vec{n}})_{\vec{n} \in \mathbb{Z}^d}$ vérifiant l'équation (1) ci-dessus.

Cette notion de cocycle de degré 1 d'une action multidimensionnelle, introduite ici de manière qui peut sembler détournée, à l'occasion d'une démonstration, apparaît en fait dans de nombreuses questions de théorie ergodique. Citons les principales, sans vouloir être exhaustif.

1. Dans l'étude des systèmes dynamiques sous l'aspect de la cohomologie des groupes, les cocycles de degré $1 \leq k \leq d$ ont été notamment étudiés par Mackey [Mac66], Feldman et Moore [FM77a] et [FM77b], Katok et Katok [KK95], Depauw [Dep02].

2. Les cocycles de degré 1 d'action stationnaire de \mathbb{Z}^d et à valeurs dans \mathbb{R}^d joue un rôle particulier, car ils représentent une déformation aléatoire du réseau \mathbb{Z}^d , lorsque l'on considère ce dernier plongé dans \mathbb{R}^d . Ils interviennent dans la construction du flot spécial en dimension d (voir [Kat77]).
3. Ils apparaissent aussi dans certaines démonstrations du théorème limite central multidimensionnel pour marche aléatoire en milieu aléatoire. En effet la déformation du réseau associée permet de transformer ce type de marche aléatoire en martingale. Or on sait que la condition de martingale joue un rôle crucial dans le théorème limite central. La littérature sur ce sujet est très abondante. Sur le rôle du théorème ergodique ponctuel pour cocycle de degré 1 dans cette méthode de démonstration du théorème limite central on renvoie au survey [Bis11], et notamment au paragraphe intitulé « Sublinearity of the corrector ».
4. Enfin l'équation de cocycle de degré 1 a une interprétation physique qui fait qu'elle apparait dans le domaine du milieu aléatoire, et notamment des réseaux de conductances stationnaires. En effet elle est vérifiée par la différence de potentiel entre l'origine et le point \vec{n} , lorsque l'accroissement de ce potentiel le long des arêtes du réseau \mathbb{Z}^d est stationnaire. Ce potentiel est un moyen d'étudier la résistivité équivalente du milieu infini. Citons notamment Golden et Papanicolaou [GP83].

Les points 3 et 4 sont exposés de manière plus détaillée dans le paragraphe suivant.

Ne considérant ici essentiellement que des cocycles de degré 1, la spécification du degré sera souvent sous entendue.

Revenons au problème du théorème ergodique ponctuel. Ce théorème est énoncé ci-dessous (théorème de Boivin-Derriennic), mais commençons par rappeler, sans entrer dans les détails, le principe de sa démonstration, qui suit le schéma vu dans le paragraphe précédent sur la dimension 1. Supposons que l'action T est ergodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ensemble invariant par les d transformations T_1, \dots, T_d simultanément, sauf de mesure 0 ou 1. On peut vérifier que les cobords, c'est-à-dire les cocycles s'écrivant sous la forme $S_{\vec{n}} = g \circ T_{\vec{n}} - g$, sont denses dans l'espace des cocycles d'intégrale nulle. Ensuite une inégalité maximale permet de montrer que les cocycles vérifiant le théorème ergodique forment un espace fermé pour la norme adéquate. Là encore, il y a une différence notable avec la dimension $d = 1$. La norme majorante dans l'inégalité maximale n'est pas la norme L^1 , ni même la norme L^d . Boivin et Derriennic ont montré dans [BD91] que la norme optimale est la norme de Lorentz $L_{d,1}$, qui s'intercale entre les normes L^d et $L^{d+\varepsilon}$.

Ces questions ne peuvent être détaillées ici. Pour fixer les idées, donnons seulement un énoncé avec une condition d'intégrabilité plus forte que nécessaire, en terme d'espace L^p . On aura besoin de considérer la base canonique de \mathbb{R}^d , notée $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_d)$.

Théorème (Boivin & Derriennic). Soit $(S_{\vec{n}})_{\vec{n} \in \mathbb{Z}^d}$ un cocycle d'une action T mesurable stationnaire ergodique de \mathbb{Z}^d . Si il existe $\varepsilon > 0$ tel que les fonctions $f_i = S_{\vec{e}_i}$ soient de norme $L^{d+\varepsilon}$ finie pour $i = 1, \dots, d$ alors on a la convergence ponctuelle

$$\frac{S_{\vec{n}} - \sum_{i=1}^d n_i (\int_{\Omega} f_i dP)}{|\vec{n}|} \longrightarrow 0$$

pour $|\vec{n}|$ tendant vers l'infini.

Remarque 1. Les mêmes auteurs ont aussi montré que dès que les fonctions f_i sont intégrables, la convergence ci-dessus a lieu au sens de la norme L^1 .

Remarque 2. Le terme soustrait au numérateur est l'intégrale de la fonction $S_{\vec{n}}$. En effet, de l'équation de cocycle (1) et de la stationnarité de l'action T on déduit

$$\int_{\Omega} S_{\vec{n}+\vec{m}} dP = \int_{\Omega} S_{\vec{n}} dP + \int_{\Omega} S_{\vec{m}} dP.$$

Il en découle immédiatement, en écrivant $\vec{n} = \sum_{i=1}^d n_i \vec{e}_i$, que

$$\int_{\Omega} S_{\vec{n}} dP = \sum_{i=1}^d n_i \int_{\Omega} f_i dP.$$

1.3 Théorème ergodique pour cocycles harmoniques

Les cocycles évoqués dans les points 3 et 4 vérifient une propriété supplémentaire d'harmonicité. Détaillons cela en commençant par le point 3. Soient (Ω, \mathcal{A}, P) un espace de probabilité et T une action mesurable stationnaire ergodique de \mathbb{Z}^d engendrée par d transformations commutantes T_1, \dots, T_d . Soient c_1, \dots, c_d des fonctions mesurables > 0 . Pour chaque $\omega \in \Omega$, on considère la marche aléatoire sur \mathbb{Z}^d consistant à sauter d'un point \vec{n} à ses $2d$ plus proches voisins $\vec{n} \pm \vec{e}_i$, avec des probabilités données par les fonctions $(c_i)_i$ par

$$\begin{aligned} P_{\omega}(X_{k+1} = \vec{n} + \vec{e}_i / X_k = \vec{n}) &= \frac{c_i(T_{\vec{n}}\omega)}{\bar{c}(T_{\vec{n}}\omega)}; \\ P_{\omega}(X_{k+1} = \vec{n} - \vec{e}_i / X_k = \vec{n}) &= \frac{c_i(T_{\vec{n}-\vec{e}_i}\omega)}{\bar{c}(T_{\vec{n}}\omega)}, \end{aligned} \quad (2)$$

où \bar{c} est la normalisation appropriée : $\bar{c} = \sum_{i=1}^d (c_i + c_i \circ T_i^{-1})$.

L'intérêt de définir une marche aléatoire à partir des fonctions c_i est que cette marche est l'analogue, en temps et en espace discret, d'une diffusion dans un milieu aléatoire déterminé par ω . Cela se voit en écrivant le générateur \mathcal{L}_{ω} associé, défini sur les fonctions u de \mathbb{Z}^d par l'espérance conditionnelle

$$(\mathcal{L}_{\omega}u)(\vec{n}) = E_{\omega}\left(u(X_{k+1}) - u(X_k) / X_k = \vec{n}\right),$$

où l'indice ω est là pour rappeler que les probabilités de sauts définissant la marche aléatoire $(X_k)_k$ dépendent de l'environnement aléatoire ω . Pour faire apparaître ce lien avec les diffusions, il faut donner l'expression de \mathcal{L}_{ω} à l'aide des fonctions c_i . Notons pour cela τ_i la translation de \mathbb{Z}^d de vecteur \vec{e}_i , et posons $\partial_i = \tau_i - I$ et $\partial_i^* = \tau_i^{-1} - I$. Enfin, à toute fonction c définie sur Ω , et à tout $\omega \in \Omega$, associons la fonction c_{ω} définie sur \mathbb{Z}^d par $c_{\omega}(\vec{n}) = c(T_{\vec{n}}\omega)$. Alors un calcul élémentaire permet de vérifier que, pour toute fonction u définie sur \mathbb{Z}^d , on a

$$\mathcal{L}_{\omega}u = \frac{1}{\bar{c}_{\omega}} \sum_{i=1}^d \partial_i^* \left((c_i)_{\omega} (\partial_i u) \right). \quad (3)$$

On perçoit sans peine l'analogie avec l'opérateur de diffusion de la chaleur associé à un milieu de conductivité thermique A , et de capacité thermique

λ , usuellement écrit

$$\mathcal{L} : u \mapsto \frac{1}{\lambda} \operatorname{div} \left(A(\operatorname{grad} u) \right).$$

La conductivité thermique de l'arête $[\vec{n}, \vec{n} + \vec{e}_i]$, à environnement ω fixé, est pour nous égale à $(c_i)_\omega(\vec{n}) = c_i(T_{\vec{n}}\omega)$, pour $i = 1, \dots, d$, et la capacité thermique du nœud \vec{n} à $\bar{c}_\omega(\vec{n}) = \bar{c}(T_{\vec{n}}\omega)$.

Dans l'idée d'aborder la question du théorème limite central pour la marche aléatoire $(X_k)_k$, il est naturel d'étudier les fonctions u harmoniques, c'est-à-dire vérifiant $\mathcal{L}_\omega u = 0$. En effet, dans ce cas la marche aléatoire Y définie sur \mathbb{R} par $Y_k = u(X_k)$ est une martingale, et est donc bien placée pour vérifier le théorème limite central. En fait, pour ne pas perdre la structure aléatoire stationnaire définissant les probabilités de saut de la marche, on cherche u sous la forme d'un cocycle. Plus précisément on cherche les cocycles $S_{\vec{n}}$ tels que pour tout ω , la fonction $u(\vec{n}) = S_{\vec{n}}(\omega)$ annule l'opérateur \mathcal{L}_ω . En remplaçant dans (3) on obtient la notion suivante.

Définition 2 (Cocycle harmonique). Le cocycle $(S_{\vec{n}})$ de degré 1 est harmonique s'il vérifie

$$\sum_{i=1}^d (T_i^{-1} - I)(c_i f_i) = 0,$$

où on a noté $f_i = S_{\vec{e}_i}$.

Dans l'optique de démontrer le théorème limite central pour $(X_k)_k$, l'intérêt d'un théorème ergodique ponctuel pour ce type de cocycle peut être expliqué rapidement de la façon suivante. Admettons qu'un tel cocycle existe, avec de plus les conditions d'intégrales $\int_\Omega f_1 dP = 1$ et $\int_\Omega f_i dP = 0$, pour $2 \leq i \leq d$. Supposons de plus que ce cocycle vérifie le théorème ergodique énoncé ci-dessus (théorème de Boivin-Derriennic). Considérons la martingale Y définie par $Y_k = S_{X_k}(\omega)$. Celle-ci vérifie

$$\frac{Y_k - X_k^{(1)}}{|X_k|} \rightarrow 0$$

pour $|X_k|$ tendant vers l'infini, où $X_k^{(1)}$ désigne la première coordonnée de X_k . Autrement dit, l'écart entre la martingale Y_k et la coordonnée $X_k^{(1)}$ est négligeable devant $|X_k|$. On peut en déduire que si Y_k vérifie le théorème limite central, il en est de même de $X_k^{(1)}$. Pour démontrer que Y_k vérifie le théorème limite central, on peut utiliser un théorème limite central pour martingale, comme le théorème de Brown [Bro71]. Cette méthode de démonstration du théorème limite central pour $(X_k^{(1)})_k$, dite « méthode de la martingale » est détaillée dans [Koz85]).

En fait l'existence d'un cocycle harmonique d'intégrales données est prouvée dans le cas elliptique, c'est-à-dire le cas où les conductances sont bornées inférieurement et supérieurement par des constantes strictement positives. Énonçons ce résultat dû à Kunnemann (voir [Kün83]).

Théorème (Kunnemann). Supposons qu'il existe des constantes $0 < a < b$ telles que $a < c_i < b$ pour $i = 1, \dots, d$. Alors pour tout vecteur $\vec{y} = (y_1, \dots, y_d) \in \mathbb{R}^d$ il existe un unique cocycle harmonique $(S_{\vec{n}})_{\vec{n} \in \mathbb{Z}^d}$ tel que les fonctions définies par $f_i = S_{\vec{e}_i}$ vérifient $f_i \in L^2$ et $\int_\Omega f_i dP = y_i$, pour $1 \leq i \leq d$.

Notons que l'intégrabilité L^2 donné par ce théorème ne suffit pas pour que le théorème de Boivin-Derriennic s'applique. Cette intégrabilité a été

améliorée par Boivin pour la dimension $d = 2$ (voir [Boi93]) puis par l'auteur de cet article pour $d \geq 3$ (voir [Dep99]) de la manière suivante.

Théorème (Boivin, Depauw). Supposons qu'il existe des constantes $0 < a < b$ telles que $a < c_i < b$ pour $i = 1, \dots, d$. Alors il existe un $p > 2$ tel que le cocycle donné par le théorème de Kunnemann ci-dessus vérifie $f_i \in L^p$ pour $1 \leq i \leq d$.

Ce résultat de Boivin en dimension $d = 2$ rend opérationnelle la méthode de la martingale expliquée ci-dessus dans cette dimension. En effet c'est l'intégrabilité qui permet d'appliquer le théorème de Boivin-Derriennic (voir [Boi93]).

L'objet de ce travail est de montrer que le cocycle de Kunnemann vérifie le théorème ergodique ponctuel en toute dimension.

Théorème 1. *Supposons qu'il existe des constantes $0 < a < b$ telles que $a < c_i < b$ pour $i = 1, \dots, d$. Alors le cocycle $(S_{\vec{n}})_{\vec{n} \in \mathbb{Z}^d}$ donné par le théorème de Kunnemann ci-dessus vérifie*

$$\frac{S_{\vec{n}} - \sum_{i=1}^d n_i (\int_{\Omega} f_i dP)}{|\vec{n}|} \rightarrow 0$$

presque surement, pour $|\vec{n}|$ tendant vers l'infini.

Ainsi la méthode de la martingale proposée par Kozlov pour démontrer le théorème limite central pour ce type de marche aléatoire fonctionne en toute dimension (notons que ce théorème limite central est déjà démontré, par Boivin et Depauw dans [BD03], mais avec une méthode spectrale plus compliquée).

Pour achever cette introduction, présentons rapidement l'autre application de ce théorème, évoquée point 4 page 4 ci-dessus. Considérons un réseau de conductances électriques aléatoires, tel que, à ω fixé, la conductance de l'arête $[\vec{n}, \vec{n} + \vec{e}_i]$ soit $c_i(T_{\vec{n}}\omega)$. Cherchons un cocycle $(S_{\vec{n}})_{\vec{n}}$ tel que la fonction u définie sur le réseau \mathbb{Z}^d par $u(\vec{n}) = S_{\vec{n}}(\omega)$ soit le potentiel électrique dans le réseau. Cela signifie que la quantité $f_i(\omega) = S_{\vec{e}_i}(\omega)$ est l'accroissement de potentiel dans l'arête $[0, \vec{e}_i]$. Il s'ensuit par la loi de Ohm que $c_i(\omega)f_i(\omega)$ est l'intensité de courant dans cette arête. L'équation d'harmonicité du cocycle $S_{\vec{n}}$ de la définition 3 exprime alors la loi des nœuds, selon laquelle la somme des intensités sur les $2d$ arêtes arrivant à un nœud donné est nulle. Ainsi un cocycle harmonique définit un potentiel électrique, à accroissement stationnaire. Le théorème 1 s'interprète donc comme montrant l'existence d'un potentiel à l'infini, dans un réseau stationnaire elliptique de conductance. Ce résultat complète un de nos articles précédents sur l'existence d'un flux de courant à l'infini. Ce dernier reposait sur le théorème ergodique ponctuel pour cocycle de degré $d-1$. Ces deux résultats (existence du potentiel et du courant stationnaire, convergeant à l'infini dans presque tous les environnements) montre que la conductivité équivalente du milieu infini est visible dans presque toutes les réalisations de ce milieu. On renvoie à [Dep99], ainsi qu'à [Dep07] pour la version pour milieu continu.

2 Démonstration du théorème 1

La démonstration du théorème 1 proposée ci-dessous ne suit pas un raisonnement par densité des cobords comme celles présentées dans l'introduction. On se base d'une part sur le théorème ergodique en dimension 1, qui, dans le cadre de la dimension d , assure la convergence cherchée dans

toutes les directions rationnelles, et d'autre part sur la régularité de Hölder des fonctions harmoniques sur les réseaux. Pour cette régularité, qui est une version discrète du célèbre résultat de de Giorgi (voir [DG57]), nous nous appuyons sur un l'article de Delmotte [Del97].

Cette continuité höldérienne a pour conséquence la proposition suivante.

Proposition 1. *Supposons qu'il existe des constantes $0 < a < b$ telles que $a < c_i < b$ pour $i = 1, \dots, d$. Alors il existe $\alpha > 0$ vérifiant : pour tout cocycle harmonique $(S_{\vec{n}})_{\vec{n}}$ tel que les fonctions $f_i = S_{\vec{e}_i}$ soient dans L^2 il existe, avec probabilité 1, une constante C telle que pour tout $R \geq 1$ et tout $\vec{m}, \vec{n} \in \mathbb{Z}^d$ on a*

$$\text{si } |\vec{m}| < R \text{ et } |\vec{n}| < R \text{ alors } |S_{\vec{m}}(\omega) - S_{\vec{n}}(\omega)| \leq RC \left(\frac{|\vec{m} - \vec{n}|}{R} \right)^\alpha.$$

Remarque 3. La constante C , explicitée ligne (4) ci-dessous, dépend de ω . Mais pour ne pas alourdir les notations, ce dernier est omis.

Démonstration de la proposition 1. — Commençons par le lemme suivant. On rappelle que ∂_i et ∂_i^* désignent les opérateurs aux différences finies présentés ci-dessus lors du calcul de l'opérateur \mathcal{L}_ω , et que $|\cdot|$ est la norme introduite précédemment, égale à la somme des valeurs absolues des coordonnées. Remarquons que pour deux points $\vec{m}, \vec{n} \in \mathbb{Z}^d$, l'entier $|\vec{m} - \vec{n}|$ est le nombre d'arêtes nécessaire pour relier ces deux points. Notamment ces points sont voisins ssi $|\vec{m} - \vec{n}| = 1$. Enfin pour tout entier $R \geq 1$, l'expression « boule de rayon R » désigne les points \vec{n} vérifiant $|\vec{n}| \leq R$.

Lemme 1 (Inégalité de Poincaré). *Pour toute fonction u définie sur le réseau \mathbb{Z}^d et tout entier $R \geq 1$ on a*

$$\sum_{|\vec{n}| \leq R} |u(\vec{n}) - \bar{u}_R|^2 \leq R^2 4 \sum_{|\vec{n}| \leq R+1} \sum_{i=1}^d \left(|\partial_i u(\vec{n})|^2 + |\partial_i^* u(\vec{n})|^2 \right),$$

où \bar{u}_R désigne la moyenne de u sur la boule de rayon R .

Démonstration de lemme. — Ce résultat est des plus classiques. Rappelons en néanmoins la démonstration pour la clarté de l'exposé. La boule de rayon R dans \mathbb{Z}^d sera notée B dans cette démonstration, et son cardinal $|B|$. La somme à majorer s'écrit

$$\sum_{|\vec{n}| \leq R} \left| u(\vec{n}) - \frac{1}{|B|} \sum_{|\vec{m}| \leq R} u(\vec{m}) \right|^2 = \sum_{|\vec{n}| \leq R} \left| \frac{1}{|B|} \sum_{|\vec{m}| \leq R} (u(\vec{n}) - u(\vec{m})) \right|^2,$$

ce qui, en posant le changement d'indice $\vec{m} \rightarrow \vec{\ell}$ défini par $\vec{m} = \vec{n} + \vec{\ell}$, est encore égale à

$$\sum_{|\vec{n}| \leq R} \left| \frac{1}{|B|} \sum_{|\vec{n} + \vec{\ell}| \leq R} (u(\vec{n}) - u(\vec{n} + \vec{\ell})) \right|^2.$$

D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée à la somme intérieure, cela est majoré par

$$\sum_{|\vec{n}| \leq R} \frac{1}{|B|} \sum_{\substack{\vec{\ell} \\ |\vec{n} + \vec{\ell}| \leq R}} (u(\vec{n}) - u(\vec{n} + \vec{\ell}))^2.$$

Or on a

$$u(\vec{n}) - u(\vec{n} + \vec{\ell}) = \sum_{\vec{k} \in \gamma_{\vec{\ell}}} \partial_{(i)}^{(*)} u(\vec{n} + \vec{k}),$$

où $\gamma_{\vec{\ell}}$ désigne un chemin de 0 à $\vec{\ell}$, c'est à dire une suite de sommets voisins dont le premier est 0 et le dernier est un voisin de \vec{n} ; l'indice i , ainsi que la présence ou non de l'étoile, varient en fonction de la direction de l'arête joignant les sommets voisins (c'est pourquoi ils sont notés entre parenthèses). On peut de plus choisir ce chemin pour que le nombre d'arêtes qui le composent soit égale à $|\vec{\ell}|$, et pour que les chemins $\vec{n} + \gamma_{\vec{\ell}}$, avec \vec{n} et $\vec{n} + \vec{\ell} \in B$, soient inclus dans la boule de rayon $R + 1$, ce que l'on suppose fait dans la suite. On a donc, à nouveau d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\left(u(\vec{n}) - u(\vec{n} + \vec{\ell})\right)^2 \leq |\vec{\ell}| \sum_{\vec{k} \in \gamma_{\vec{\ell}}} \left(\partial_{(i)}^{(*)} u(\vec{n} + \vec{k})\right)^2,$$

ce qui peut être encore majoré par

$$|\vec{\ell}| \sum_{\vec{k} \in \gamma_{\vec{\ell}}} \sum_{i=1}^d \left(\left(\partial_i^* u(\vec{n} + \vec{k})\right)^2 + \left(\partial_i u(\vec{n} + \vec{k})\right)^2 \right).$$

En divisant par $|B|$, en sommant sur \vec{n} , et en échangeant les sommes en \vec{k} et \vec{n} , on a

$$\sum_{|\vec{n}| \leq R} \frac{1}{|B|} \left(u(\vec{n}) - u(\vec{n} + \vec{\ell})\right)^2 \leq |\vec{\ell}| \sum_{\vec{k} \in \gamma_{\vec{\ell}}} \sum_{|\vec{n}| \leq R} \frac{1}{|B|} \sum_{i=1}^d \left(\left(\partial_i^* u(\vec{n} + \vec{k})\right)^2 + \left(\partial_i u(\vec{n} + \vec{k})\right)^2 \right).$$

Or dans la somme intérieure en \vec{n} du membre de droite, l'argument $\vec{n} + \vec{k}$ de ∂u varie sur un ensemble contenu dans la boule de rayon $R + 1$. Le membre de droite est donc majoré par

$$|\vec{\ell}| \sum_{\vec{k} \in \gamma_{\vec{\ell}}} \sum_{|\vec{n}| \leq R+1} \frac{1}{|B|} \sum_{i=1}^d \left(\left(\partial_i^* u(\vec{n})\right)^2 + \left(\partial_i u(\vec{n})\right)^2 \right).$$

La somme en \vec{n} ne dépend plus de \vec{k} . Comme la somme en \vec{k} porte sur $|\vec{\ell}|$ termes, c'est encore majoré par

$$|\vec{\ell}|^2 \sum_{|\vec{n}| \leq R+1} \frac{1}{|B|} \sum_{i=1}^d \left(|\partial_i u(\vec{n})|^2 + |\partial_i^* u(\vec{n})|^2 \right).$$

Il reste à sommer en $\vec{\ell}$, qui est de norme $\leq 2R$. Comme cette somme porte sur $|B|$ termes, cela démontre bien le lemme. \square

Passons à la démonstration de la proposition 1. Rappelons la proposition 6.2 de [Del97]. Bien qu'il n'y ait rien d'aléatoire dans l'article de Delmotte, nous conserverons notre notation d'un milieu dépendant de ω , pour ne pas introduire de nouvelles notations. Notamment une fonction u sera harmonique si elle vérifie $\mathcal{L}_\omega(u) = 0$, où \mathcal{L}_ω est l'opérateur introduit dans l'égalité (3).

Proposition (Delmotte). Il existe des constantes α et C_1 ne dépendant que de la dimension d , et des bornes d'ellipticité a et b , telles que pour toute fonction u harmonique définie sur \mathbb{Z}^d on a :

$$\text{si } |\vec{m}|, |\vec{n}| < R \text{ alors } |u(\vec{m}) - u(\vec{n})| \leq C_1 \max_{|\vec{\ell}| \leq 2R} |u(\vec{\ell})| \left(\frac{|\vec{m} - \vec{n}|}{R} \right)^\alpha.$$

Appliquée à la fonction u définie sur \mathbb{Z}^d par $u(\vec{n}) = S_{\vec{n}}(\omega)$, ou plus précisément à $u - \bar{u}_{4R}$, cette proposition s'écrit

$$\text{si } |\vec{m}|, |\vec{n}| < R \text{ alors } |S_{\vec{m}}(\omega) - S_{\vec{n}}(\omega)| \leq C(R, \omega) \left(\frac{|\vec{m} - \vec{n}|}{R} \right)^\alpha.$$

avec

$$C(R, \omega) = C_1 \max_{|\vec{\ell}| \leq 2R} \left| S_{\vec{\ell}}(\omega) - \frac{1}{|B_{4R}|} \sum_{\vec{n} \in B_{4R}} S_{\vec{n}}(\omega) \right|.$$

Rappelons enfin la proposition 5.3 du même article.

Proposition (Delmotte). Il existe une constante C_2 ne dépendant que de la dimension d , et des bornes d'ellipticité a et b , telle que si $\mathcal{L}_\omega u \geq 0$, alors

$$\max_{B_{2R}} u \leq C_2 \left(\frac{1}{|B_{4R}|} \sum_{\vec{\ell} \in B_{4R}} u(\vec{\ell})^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

D'après cette proposition, appliquée à la fonction $u - \bar{u}_{4R}$ puis à son opposée $-u + \bar{u}_{4R}$, on a

$$C(R, \omega) \leq C_1 C_2 \left(\frac{1}{|B_{4R}|} \sum_{\vec{\ell} \in B_{4R}} \left| S_{\vec{\ell}}(\omega) - \frac{1}{|B_{4R}|} \sum_{\vec{n} \in B_{4R}} S_{\vec{n}}(\omega) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Enfin l'inégalité de Poincaré (lemme 1) assure que ce majorant est lui-même majoré par

$$C'(R, \omega) = C_1 C_2 \left(\frac{(4R)^2}{|B_{4R}|} \sum_{|\vec{n}| \leq 4R+1} \sum_{i=1}^d |f_i(T_{\vec{n}}\omega)|^2 + |f_i(T_{\vec{n}-\vec{e}_i}\omega)|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

En divisant par R , on achève la démonstration de la proposition 1 avec

$$C = \sup_{R \geq 1} \frac{1}{R} C'(R, \omega), \quad (4)$$

qui est presque sûrement finie d'après le théorème ergodique ponctuel de Wiener sur les boules de \mathbb{Z}^d (voir [Wie39]), et l'intégrabilité L^2 des fonctions f_i . \square

Nous sommes maintenant en mesure de démontrer le théorème 1. Soit $(S_{\vec{n}})_{\vec{n}}$ le cocycle donné par le théorème de Kunnemann. Soit $\vec{n} \in \mathbb{Z}^d$. D'après l'équation (1) définissant les cocycles de degré 1, on a pour tout entier $k \geq 1$

$$S_{k\vec{n}} = \sum_{j=0}^{k-1} S_{\vec{n}} \circ T_{\vec{n}}^j.$$

D'après le théorème ergodique en dimension 1 appliqué la fonction $S_{\vec{n}}$ et la transformation $T_{\vec{n}}$, la quantité

$$\frac{S_{k\vec{n}} - k \sum_{i=1}^d n_i \int_{\Omega} f_i dP}{k|\vec{n}|}$$

converge donc presque sûrement, pour k tendant vers l'infini. La transformation $T_{\vec{n}}$ n'est pas nécessairement ergodique. Mais d'après la remarque 1 qui suit l'énoncé du théorème ergodique de Boivin-Derriennic, et l'hypothèse d'ergodicité de l'action T , on a la convergence dans L^1 vers 0. Donc la limite ponctuelle vaut aussi 0.

Soit un entier n fixé. Le nombre de vecteur \vec{n} à coordonnées entières vérifiant $|\vec{n}| = n$ est fini. Donc d'après ce qui précède, avec probabilité 1, pour tout ε , il existe un entier $R_0 \geq 1$ tel que

$$\text{si } kn \geq R_0 \text{ et si } |\vec{n}| = n \text{ alors } \left| \frac{S_{k\vec{n}}(\omega) - k \sum_{i=1}^d n_i \int_{\Omega} f_i dP}{kn} \right| \leq \varepsilon. \quad (5)$$

Notons E_n l'ensemble des multiples des points de \mathbb{Z}^d de norme n , soit

$$E_n = \{k\vec{n}, k \in \mathbb{Z}, |\vec{n}| = n\}.$$

On a alors le lemme élémentaire suivant

Lemme 2. *Soit $n \geq 1$. Pour tout $\vec{m} \in \mathbb{Z}^d$ il existe $\vec{\ell} \in E_n$ tel que*

$$|\vec{\ell}| \leq |\vec{m}| \text{ et } |\vec{\ell} - \vec{m}| \leq n + \frac{|\vec{m}|}{n}d.$$

Démonstration. — Considérons la division euclidienne de $|\vec{m}|$ par n

$$|\vec{m}| = kn + r,$$

avec $0 \leq r \leq n - 1$. Le vecteur $\vec{x} = \frac{\vec{m}}{|\vec{m}|}n$ a pour norme n . Ses coordonnées $(x_i)_{1 \leq i \leq d}$ ne sont pas nécessairement entières, mais il existe un vecteur \vec{n} à coordonnées entières de norme n , à une distance $\leq d$ de ce dernier. En effet, en notant n'_i la partie entière de x_i , pour $i = 1, \dots, d$, et en posant

$$K = \sum_{i=1}^d (x_i - n'_i) = n - \sum_{i=1}^d n'_i,$$

on voit que K est un entier vérifiant $0 \leq K \leq d - 1$. Considérons alors $n_i = n'_i + 1$ si $i \leq K$ et $n_i = n'_i$ si $i \geq K + 1$. Le point \vec{n} ainsi défini vérifie bien $|\vec{n}| = n$ et $|\vec{n} - \vec{x}| \leq d$.

Posons $\vec{\ell} = k\vec{n}$. On a

$$|\vec{m} - \vec{\ell}| \leq \left| \vec{m} - \frac{\vec{m}}{|\vec{m}|}nk \right| + \left| \frac{\vec{m}}{|\vec{m}|}nk - \vec{\ell} \right| \leq r + kd,$$

ce qui est bien majoré par $n + \frac{|\vec{m}|}{n}d$. Ceci démontre le lemme 2. \square

Pour $0 < \varepsilon < 1/2$ fixé, choisissons $n > d/\varepsilon$, puis $R_0 > n/\varepsilon$. Avec ce choix, le lemme précédent assure que pour tout \vec{m} tel que $|\vec{m}| > R_0$ il existe $\vec{\ell} \in E_n$ tel que $|\vec{\ell}| \leq |\vec{m}|$ et $|\vec{\ell} - \vec{m}| < 2\varepsilon|\vec{m}|$.

On déduit alors de la proposition 1 appliquée à $R = |\vec{m}|$ que

$$\left| \frac{S_{\vec{m}}(\omega)}{|\vec{m}|} - \frac{S_{\vec{\ell}}(\omega)}{|\vec{m}|} \right| \leq C(2\varepsilon)^\alpha.$$

De la majoration $\left| \sum_{i=1}^d (m_i - \ell_i) \int_{\Omega} f_i dP \right| \leq |\vec{m} - \vec{\ell}| \max_i \left| \int_{\Omega} f_i dP \right|$ il découle que

$$\left| \frac{S_{\vec{m}}(\omega) - \sum_{i=1}^d m_i \int_{\Omega} f_i dP}{|\vec{m}|} - \frac{S_{\vec{\ell}}(\omega) - \sum_{i=1}^d \ell_i \int_{\Omega} f_i dP}{|\vec{m}|} \right|$$

est majoré par

$$C(2\varepsilon)^\alpha + 2\varepsilon \max_i \left| \int_\Omega f_i dP \right|.$$

Enfin, on peut choisir R_0 suffisamment grand pour que (5) soit vérifié. Or, pour tout \vec{m} tel que $|\vec{m}| > R_0 \left(1 - 2\frac{d}{n}\right)^{-1}$ et $\vec{\ell}$ donné par le lemme 2, on a $R_0 \leq |\vec{\ell}| \leq |\vec{m}|$. Donc d'après (5) et la ligne précédente

$$\left| \frac{S_{\vec{m}}(\omega) - \sum_{i=1}^d m_i \int_\Omega f_i dP}{|\vec{m}|} \right| \leq C(2\varepsilon)^\alpha + \left(2 \max_i \left| \int_\Omega f_i dP \right| + 1 \right) \varepsilon.$$

Comme ε est arbitrairement petit, cela montre bien la convergence ponctuelle de

$$\left| \frac{S_{\vec{m}}(\omega) - \sum_{i=1}^d m_i \int_\Omega f_i dP}{|\vec{m}|} \right|$$

vers 0, pour $|\vec{m}|$ tendant vers l'infini, ce qui démontre le théorème 1. \square

3 Question

La question naturelle à la suite de ce travail est : dans quelles conditions peut-on étendre le théorème 1 au cas non elliptique. Dans le cas où les conductances $c_i \circ T_{\vec{n}}$, pour $\vec{n} \in \mathbb{Z}^d$ et $i = 1, \dots, d$, sont indépendantes, ce problème est notamment abordé dans [BP07]. Dans le cas où les conductances sont simplement supposées de loi stationnaire, nous n'avons qu'une référence : l'article de Berger-Biskup [BB07]. Cet article se place dans le cadre de la percolation, c'est-à-dire avec des fonctions c_i prenant les valeurs 0 ou 1. La convergence ponctuelle du cocycle (souvent appelé « correcteur » dans la méthode de la martingale évoquée ci-dessus) qui fait l'objet du théorème 5.1, est démontré pour la dimension 2. La méthode proposée ne passe pas à des dimensions plus grandes.

Références

- [BB07] N. BERGER et M. BISKUP – « Quenched invariance principle for simple random walk on percolation clusters », *Probab. Theory Related Fields* **137** (2007), no. 1-2, p. 83–120.
- [BD91] D. BOIVIN et Y. DERRIENNIC – « The ergodic theorem for additive cocycles of \mathbf{Z}^d or \mathbf{R}^d », *Ergodic Theory Dynam. Systems* **11** (1991), no. 1, p. 19–39.
- [BD03] D. BOIVIN et J. DEPAUW – « Spectral homogenization of reversible random walks on \mathbb{Z}^d in a random environment », *Stochastic Process. Appl.* **104** (2003), no. 1, p. 29–56.
- [Bis11] M. BISKUP – « Recent progress on the random conductance model », *Probab. Surv.* **8** (2011), p. 294–373.
- [Boi93] D. BOIVIN – « Weak convergence for reversible random walks in a random environment », *Ann. Probab.* **21** (1993), no. 3, p. 1427–1440.
- [BP07] M. BISKUP et T. M. PRESCOTT – « Functional CLT for random walk among bounded random conductances », *Electron. J. Probab.* **12** (2007), p. no. 49, 1323–1348.
- [Bro71] B. M. BROWN – « Martingale central limit theorems », *Ann. Math. Statist.* **42** (1971), p. 59–66.

- [Del97] T. DELMOTTE – « Inégalité de Harnack elliptique sur les graphes », *Colloq. Math.* **72** (1997), no. 1, p. 19–37.
- [Dep99] J. DEPAUW – « Flux moyen d'un courant électrique dans un réseau aléatoire stationnaire de résistances », *Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist.* **35** (1999), no. 3, p. 355–370.
- [Dep02] —, « Génération des cocycles de degré ≥ 2 d'une action mesurable stationnaire de \mathbb{Z}^d », *Ergodic Theory Dynam. Systems* **22** (2002), no. 1, p. 153–169.
- [Dep07] —, « Resistivity of an infinite three dimensional stationary random electric conductor », *Comm. Math. Phys.* **274** (2007), no. 2, p. 381–397.
- [DG57] E. DE GIORGI – « Sulla differenziabilità e l'analiticità delle estremali degli integrali multipli regolari », *Mem. Accad. Sci. Torino. Cl. Sci. Fis. Mat. Nat. (3)* **3** (1957), p. 25–43.
- [FM77a] J. FELDMAN et C. C. MOORE – « Ergodic equivalence relations, cohomology, and von Neumann algebras. I », *Trans. Amer. Math. Soc.* **234** (1977), no. 2, p. 289–324.
- [FM77b] —, « Ergodic equivalence relations, cohomology, and von Neumann algebras. II », *Trans. Amer. Math. Soc.* **234** (1977), no. 2, p. 325–359.
- [GP83] K. GOLDEN et G. PAPANICOLAOU – « Bounds for effective parameters of heterogeneous media by analytic continuation », *Comm. Math. Phys.* **90** (1983), no. 4, p. 473–491.
- [Kat77] A. B. KATOK – « The special representation theorem for multi-dimensional group actions », *Dynamical systems, Vol. I—* Warsaw, Soc. Math. France, Paris, 1977, p. 117–140. Astérisque, No. 49.
- [KK95] A. KATOK et S. KATOK – « Higher cohomology for abelian groups of toral automorphisms », *Ergodic Theory Dynam. Systems* **15** (1995), no. 3, p. 569–592.
- [Koz85] S. M. KOZLOV – « The averaging method and walks in inhomogeneous environments », *Russian Math. Surveys* **40** (1985), no. 2(242), p. 73–145.
- [Kün83] R. KÜNNEMANN – « The diffusion limit for reversible jump processes on \mathbf{Z}^d with ergodic random bond conductivities », *Comm. Math. Phys.* **90** (1983), no. 1, p. 27–68.
- [Mac66] G. W. MACKEY – « Ergodic theory and virtual groups », *Math. Ann.* **166** (1966), p. 187–207.
- [Wie39] N. WIENER – « The ergodic theorem », *Duke Math. J.* **5** (1939), no. 1, p. 1–18.