



TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO PERIAPICAL REFRACTÁRIA AO TRATAMENTO ENDODÔNTICO

¹Flávia Vorranna Santos Farias; ²George Adão Santos Farias; ³Sormani Bento Fernandes de Queiroz

¹Discentes do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão

² Cirurgião-dentista, Faculdade Católica Rainha do Sertão

²Docente do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão

Introdução: O objetivo precípua da terapia endodôntica é tratar ou prevenir o desenvolvimento de lesões perirradiculares. Assim, o sucesso do tratamento endodôntico pode ser caracterizado como ausência de doença perirradicular após um período de preservação suficiente. Entretanto, microrganismos resistentes à terapia endodôntica ou que invadem o sistema de canais radiculares pós-tratamento podem desenvolver uma lesão perirradicular, sendo denominada de lesão periapical refratária. **Proposição:** Neste trabalho temos o objetivo de relatar um caso clínico. **Relato de caso:** Paciente do sexo feminino, de 42 anos, leucoderma, foi selecionada a partir de registros da clínica endodôntica da Faculdade Católica Rainha do Sertão, tendo realizado tratamento endodôntico há 2 anos, com lesão periapical associada ao dente tratado, afim de se identificar o sucesso ou insucesso do tratamento. Em radiografia periapical de controle foi evidenciado o aumento da lesão e caracterizado o insucesso. O caso foi submetido a cirurgia periapical, na clínica odontológica da Faculdade Católica Rainha do Sertão, e o material colhido da lesão submetido a análise histomorfológica com laudo final de cisto periapical. O caso está sob preservação. **Considerações finais:** O relatado clínico e publicações levantadas trazem a luz a discussão dos fatores associados ao insucesso do tratamento endodôntico, a necessidade da preservação do tratamento endodôntico e as indicações e contra-indicações de cirurgias periapical.

Palavras-chave: Periodontite Periapical. Tratamento do Canal Radicular. Cirurgia Bucal.