

Electrocardiograma de Marcapaso

Pablo FERNÁNDEZ BANIZI, Hector A. FIANDRA, Daniel O. FIANDRA, Diego LUPANO

Reblampa 78024-176

En la Figura 1, J.C.A., sexo femenino, 56 años, que refiere fundamentalmente palpitaciones y mareos de breve duración. No hubo documentación de arritmias en el ECG basal. Se observa en la primera parte del trazado un ritmo sinusal de 94pm, con BAV de 1º grado, intervalo PR a 0.38s. Luego de un latido ectópico ventricular, con un acoplamiento de aproximadamente 230ms., se observa una brusca disminución del intervalo PR a 0.20s. y una ligera disminución de la frecuencia sinusal 83pm. Este comportamiento se repetía en forma periódica frente a latidos ectópicos con acoplamiento adecuado.

COMENTARIO

Este comportamiento nos muestra claramente la presencia de una doble vía nodal, con conducción en la primera parte del trazado por la vía lenta, luego de un extraestímulo apropiado ésta se bloquea, pasando a conducir normalmente por la vía con comportamiento rápido, hasta que un nuevo latido ectópico apropiado bloquea esta vía y se produce el mecanismo inverso. Estos datos son de utilidad para planear la terapéutica, incluyendo la ablación por radiofrecuencia.

