


Variables sociodemográficas y Estrés Académico Autopercebido: Análisis relacional con el consumo de sustancias psicoactivas.

Rodríguez Ivana Cecilia, Abeldaño Ariel, Fonseca Gabriel, Aramburú Guillermo José

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca, México
Universidad de la Frontera

INTRODUCCIÓN

Cuando el estudiante estima que los requerimientos académicos exceden sus capacidades, comienza a sentirse estresado, sus pensamientos y emociones serán negativas, consecuentemente, su esfuerzo y productividad disminuirán, presentando lo que denominamos distrés. Deberá establecer entonces un cambio de perspectiva en sus comportamientos para adaptarse al nuevo entorno. Esto trae consigo la necesidad adoptar estrategias de afrontamiento distintas de las que disponía. Sin embargo, una gran parte de los estudiantes, carecen de esas estrategias o presentan conductas inadecuadas. Pudiendo ser el consumo de Sustancias Psicoactivas (SP) intentos disfuncionales de manejo de estas dificultades.



MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal. El universo de estudio fueron los alumnos matriculados para el cursado del Ciclo Introductorio de la Facultad de Odontología en el año 2016. La recolección de la información se realizó a través de dos cuestionarios, el Inventario SISCO del Estrés Académico y el cuestionario de Factores de Riesgo y Protección para el consumo de Drogas en Jóvenes. Se caracterizó el estrés como así también el consumo de SP. Se realizó el análisis descriptivo de los datos y para la comparación de medias se llevó a cabo el test T con un nivel de significación del 5%.

RESULTADOS

El 98,3% de los alumnos manifestó tener estrés en un nivel medianamente alto ($p < 0.05$). El consumo de alcohol y energizantes mostró un aumento significativo ($p = 0,022$ / $p = 0,026$). Y el consumo de marihuana aumentó significativamente en el sexo masculino ($p > 0,021$). No se obtuvieron datos significativos en cuanto a la relación sexo-consumo de alcohol, tabaco y energizantes.

CONCLUSIONES

El estrés académico y el consumo en los jóvenes representan una problemática desde el punto de vista social-comunitario y también desde el punto de vista académico por lo que es importante plantear posibles estrategias de tipo institucional.

PALABRAS CLAVE: Estrés Académico – Consumo - Sustancias Psicoactivas

Ancho Interdentario en Zona Anterior de Maxila de Sujetos con Deformidad Facial Clase III. Opciones en Segmentación Maxilar and Surgery First.

Leonardo Brito Leal, Javier Villa Cañete, Pablo Navarro Cáceres, Sergio Olate Morales

Universidad Mayor
Universidad de La Frontera

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta investigación fue describir morfológicamente el hueso interdentario en el sector anterosuperior de sujetos con deformidad facial de clase III (DF-III), candidatos a osteotomía de Le Fort I con segmentación anterior del maxilar.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyeron 35 sujetos candidatos a cirugía ortognática con DF-III, de ambos sexos, que presentaron tomografía computarizada de haz cónico de maxila donde se midió el ancho de hueso interproximal presente desde el canino superior derecho al canino superior izquierdo, identificando 5 zonas de medición interdientaria; se estableció una zona inferior, a 5 mm desde la cresta ósea cervical y una zona superior a 10 mm del mismo punto. Para las mediciones se realizó un coeficiente de correlación intraclase y posteriormente se aplicó la prueba T para muestras relacionadas y la prueba de correlación de *Pearson* considerando un valor de $p < 0.05$. Los resultados mostraron que existía concordancia ($ICC = 0.984$) en las mediciones. En todos los espacios interproximales, la zona apical fue significativamente más ancha que la zona inferior ($p < 0.05$).

RESULTADOS

La zona entre incisivos centrales fue la de mayor ancho con un promedio de 2.42 mm (± 0.682) en la región inferior y 4.27 mm (± 0.992) en la región superior y fue seguida por el espacio entre caninos e incisivos laterales derecho e izquierdo; los espacios interproximales mínimos observados en la región más cervical (5 mm desde la cresta ósea interproximal) fueron de entre 1.1 y 1.5 mm sugiriendo potenciales daños dentarios en procedimientos de osteotomía segmentaria a ese nivel.

CONCLUSIONES

Se puede concluir que los espacios interdentarios son limitados y presentan potencial riesgo de lesiones dentarias y periodontales; el sector entre incisivos centrales parece ser el más adecuado para el desarrollo de osteotomías interdientaria

PALABRAS CLAVE: cirugía ortognática, cirugía primero, segmentación de maxila.