

## APPLICATION VALUE OF THE CARDIOPULMONARY EXERCISE TESTING AFTER MYOCARDIAL REVASCULARIZATION PROCEDURES.

Cazacu Janna<sup>1</sup>

Scientific advisor: Vataman Eleonora<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Cardiology Discipline, Nicolae Testemitanu University.

**Introduction.** Cardiopulmonary exercise testing (CPET) is a useful tool for assessment patients' functional capacity after an acute coronary event. **Aim:** evaluation of functional capacity by CPET at 3 months after myocardial revascularization by coronary artery bypass grafting (CABG) or percutaneous coronary angioplasty (PCI). **Methods.** A prospective study that included 114 patients (mean age-61.0±8.2 years, 89.4% being men), who were divided into 2 groups according to the type of myocardial revascularization performed 3 months ago: CABG (40.3%) or PCI (59.7%). Echocardiography and CPET were performed in all subjects. Statistical parameters used: mean and standard deviation, percentages, t-Student test. **Results.** Initial heart rate (HR) was significantly higher in patients post-CABG ( $79.6 \pm 9.5$  vs  $74.0 \pm 11.8$ c/min,  $p < 0.05$ ), but the maximum HR reached during exercise prevailed in the post-PCI group ( $114.8 \pm 16.7$  vs  $106.7 \pm 15.2$ c/min,  $p < 0.05$ ). Thus, the HR reserve was lower in post-PCI patients ( $43.6 \pm 17.2$  vs  $51.1 \pm 15.0$ c/min,  $p < 0.05$ ). The work rate was similar in both groups (CABG- $104.5 \pm 35.5$ W, PCI- $112.2 \pm 34.6$ W,  $p = 0.3$ ). However, peak oxygen consumption ( $\text{VO}_{2\text{p}}$ ) as well as  $\text{VO}_{2\text{p}}$  related to body mass and work rate were significantly higher in post-PCI patients ( $\text{VO}_{2\text{p}}: 1280.9 \pm 351$  vs  $1108.4 \pm 370$ ml/min,  $p = 0.05$ ;  $\text{VO}_{2}/\text{kg}: 15.6 \pm 4.3$  vs.  $12.6 \pm 3.7$ ml/min/kg,  $p < 0.01$ ;  $\text{VO}_{2}/\text{WR}: 8.0 \pm 2.0$  vs.  $6.3 \pm 2.2$ ml/min/W,  $p < 0.01$ ). The oxygen uptake efficiency slope (OUES) also registered higher values in the PCI group ( $2011.7 \pm 481$  vs  $1809.4 \pm 479$ ,  $p = 0.05$ ). **Conclusion.** Although exercise capacity is similar at 3 months after myocardial revascularization by CABG or PCI,  $\text{VO}_{2\text{p}}$ ,  $\text{VO}_{2}/\text{kg}$ ,  $\text{VO}_{2}/\text{WR}$  and OUES are significantly higher in post-PCI patients.

**Keywords:** CPET, exercise capacity, myocardial revascularization.

## VALOAREA APLICATIVĂ A TESTULUI DE EFORT CARDIOPULMONAR DUPĂ PROCEDURILE DE REVASCULARIZARE MIOCARDICĂ

Cazacu Janna<sup>1</sup>

Conducător științific: Vataman Eleonora<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Disciplina de cardiologie, USMF „Nicolae Testemitanu”.

**Introducere.** Testul de efort cardiopulmonar (CPET) este un instrument util pentru aprecierea capacitatei funcționale după suportarea unor evenimente coronariene acute. **Scop:** evaluarea capacitatei de efort prin intermediul CPET la 3 luni după revascularizare miocardică prin by-pass coronarian (B/Pc) sau angioplastie coronariană percutană (PCI). **Metode.** Studiu prospectiv care a inclus 114 pacienți ( $61.0 \pm 8.2$ ani, 89,4% - bărbați), divizați în funcție de tipul revascularizării miocardice suportate 3 luni în urmă: B/Pc (40,3%) sau PCI (59,7%). Ecocardiografia și CPET s-au efectuat tuturor subiecților. Parametrii statistici utilizati: media și deviația standard, procentaje, test t-Student. **Rezultate.** Frecvența cardiacă (FC) inițială a fost mai mare la pacienții post-B/Pc ( $79,6 \pm 9,5$  vs.  $74,0 \pm 11,8$ c/min,  $p < 0,05$ ), în schimb FC maxim atins în timpul efortului fizic a prevalat în grupul post-PCI ( $114,8 \pm 16,7$  vs.  $106,7 \pm 15,2$ c/min,  $p < 0,05$ ). Astfel, rezerva FC a fost mai mică la bolnavii post-PCI ( $43,6 \pm 17,2$  vs.  $51,1 \pm 15,0$ c/min,  $p < 0,05$ ). Toleranța la efort a fost similară în ambele grupuri (B/Pc- $104,5 \pm 35,5$ W, PCI- $112,2 \pm 34,6$ W,  $p = 0,3$ ). Totuși, consumul de oxigen de vârf ( $\text{VO}_{2\text{p}}$ ), precum și  $\text{VO}_{2\text{p}}$  raportat la masa corporală și la efortul efectuat au fost mai mari la bolnavii post-PCI ( $\text{VO}_{2\text{p}}: 1280,9 \pm 351$  vs.  $1108,4 \pm 370$ ml/min,  $p = 0,05$ ;  $\text{VO}_{2}/\text{kg}: 15,6 \pm 4,3$  vs.  $12,6 \pm 3,7$ ml/min/kg,  $p < 0,01$ ;  $\text{VO}_{2}/\text{WR}: 8,0 \pm 2,0$  vs.  $6,3 \pm 2,2$ ml/min/W,  $p < 0,01$ ). Curba eficienței captării  $\text{O}_2$  (OUES), la fel, a înregistrat valori superioare în grupul PCI ( $2011,7 \pm 481$  vs.  $1809,4 \pm 479$ ,  $p = 0,05$ ). **Concluzii.** Deși capacitatea de efort este similară la 3 luni după revascularizarea miocardică prin B/Pc sau PCI,  $\text{VO}_{2\text{p}}$ ,  $\text{VO}_{2}/\text{kg}$ ,  $\text{VO}_{2}/\text{WR}$  și OUES sunt semnificativ mai mari la bolnavii post-PCI.

**Cuvinte cheie:** CPET, capacitate de efort, revascularizare miocardică.