

ردیابی و شناسایی باکتری *Wolbachia* در زنبور *Trichogramma brassicae* (Hym.: Trichogrammatidae)

شهرام فرخی^{*}، مارینوس اریس هویخنس^۱، رسول زارع^۲ و پاتریک وربارشات^۳

۱- بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، مؤسسه‌ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، ۲- آزمایشگاه حشره‌شناسی دانشگاه واخینیگن، هلند، ۳-

بخش تحقیقات رستنی‌ها، مؤسسه‌ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران.

^{*}مشنول مکاتبات، پست الکترونیکی: shahram.farrokhi@gmail.com

Detection of *Wolbachia* bacterium in Iranian strain of *Trichogramma brassicae* (Hym., Trichogrammatidae)

S. Farrokhi^{۱&*}, M. E. Huigens^۲, R. Zare^۳ and P. Verbaarschot^۲

1. Biological Control Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran, 2. Laboratory of Entomology, Wageningen University, The Netherlands, 3. Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran.

*Corresponding author, E-mail: shahram.farrokhi@gmail.com

چکیده

باکتری‌های *Wolbachia* (*a*-proteobacteria) هم‌زیست‌های درون سلولی هستند که در بافت‌های تناسلی تعدادی از بندپایان یافت می‌شوند. القاء بکر ماده‌زایی در زنبورهای تریکوگراما اغلب توسط این باکتری که از طریق سیتوپلاسم تخم منتقل می‌شود، صورت می‌گیرد. در این تحقیق، آلدگی به باکتری *Wolbachia* در ۴۹/۵، ۳/۶ و ۲/۵ درصد از افراد جمعیت‌های طبیعی زنبور *Trichogramma brassicae* Bezdenko که به ترتیب از بابلسر، چمستان و نور (استان مازندران) جمع‌آوری شده بودند با روش PCR و همسانه‌سازی ژن *wsp* مشاهده شد. توالی ژن *wsp* استرین باکتری مربوط به بابلسر تعیین و با کد FJ441291 و نام *wBa_{T.bra}* در بانک ژن جهانی (GenBank) به ثبت رسید. براساس درخت فیلوزنیکی استرین‌های *Wolbachia* و استنمه به زنبور تریکوگراما، هر دو استرین ایرانی *wBa_{T.bra}* و *Uro3* به یک گروه (Sib) تعلق دارند. باتوجه به آلدگی درصد قابل توجهی از جمعیت زنبور *T. brassicae* بابلسر که گونه‌ی غالب در کشور محسوب می‌شود، مزیت‌های استفاده از لاین تک‌جنسي حاصل از این جمعیت در برنامه‌های کنترل بیولوژیک قابل ارزیابی می‌باشد.

واژگان کلیدی: PI-*Wolbachia*، زنبور تریکوگراما، ژن *wsp*، فیلوزنی، ماده‌زایی، کنترل بیولوژیک

Abstract

Wolbachia (*a*-proteobacteria) strains are intracellular endosymbiont bacteria found in reproductive tissues of many arthropod species. In *Trichogramma* wasps, thelytokous parthenogenesis is mostly induced by this bacterium which inherited transovarially. In this study, the *Wolbachia* infection was detected based on the PCR method and *wsp* gene cloning in 49.5, 3.6 and 2.5% of Baboulsar, Chamestan and Nour populations of *Trichogramma brassicae* Bezdenko collected from Mazandaran province. The Baboulsar bacterium strain is submitted to GenBank (FJ441291) under the name *wBa_{T.bra}*. The phylogenetic tree based on *wsp* sequences of *Wolbachia* strains in *Trichogramma* wasps indicates that the Iranian strains, *wBa_{T.bra}* and *Uro3* belonged to the same group (Sib group). With regard to the high rate infection in Baboulsar population of *T. brassicae* as a dominant species in Iran, it will be possible to assess the potential advantages of its asexual line in biological control projects.

Key words: PI-*Wolbachia*, *Trichogramma* wasp, *wsp* gene, phylogeny, thelytoky, biological control

مقدمه

زنبورهای جنس *Trichogramma* Westwood با داشتن حدود ۱۸۰ گونه بزرگ‌ترین و شناخته شده‌ترین جنس از خانواده Trichogrammatidae می‌باشند که به عنوان عامل کنترل بیولوژیک بالپولک‌داران خسارت‌زا از آن‌ها استفاده می‌شود (Pintureau, 1990; Smith, 1996; Hassan *et al.*, 1998; Pinto, 1998) هکتار از باغ‌ها و مزارع کشور رهاسازی تریکوگراما علیه آفات مختلف، به‌ویژه کرم ساقه‌خوار برنج، (*Chilo suppressalis* (Walker)) در شالیزارهای گیلان و مازندران انجام شده است (Ebrahimi, 1999). بررسی‌های فونستیک در ایران منجر به شناسایی و گزارش ۱۱ گونه زنبور تریکوگراما شده که در بین آن‌ها *Trichogramma brassicae* Bezdenko بیشترین فراوانی و گسترش را داشته است (Shojai *et al.*, 1990; Ebrahimi, 1999).

در انتخاب سوش مناسب زنبور تریکوگراما برای استفاده در یک برنامه‌ی رهاسازی، عوامل کلیدی مختلف شامل پذیرش گیاه و حشره‌ی میزبان، تحمل شرایط محیطی، توانایی پارازیته کردن سنین مختلف میزبان و قدرت جستجوگری مطرح می‌باشند (Doutt, 1958; Trumble & Alvarado-Rodriguez, 1998) این ویژگی‌ها در سوش‌های بومی بیشتر مصدقان دارند، به‌ویژه آنکه در شرایط مزرعه نیز دارای قدرت پارازیتیسم بالاتری هستند. درنتیجه، تازمانی که سوش‌های بومی زنبور تریکوگراما مناسب و کارآمد باشند به گونه‌های وارداتی ترجیح داده می‌شوند (Hassan, 1994). موقفيت پارازیتوئیدهای تخم در رهاسازی‌ها می‌تواند به نحوه‌ی تولید مثل آن‌ها نیز بستگی داشته باشد (Stouthamer, 1993; 2003). شیوه‌ی تولید مثلی متداول در تریکوگراما، نرزایی (arrhenotoky) است که نتاج نر از تخمهای تلقیح نشده و نتاج ماده از تخمهای بارور شده به وجود می‌آیند. روش تولید مثلی دیگری که در این زنبورها دیده می‌شود، ماده‌زایی (thelytoky) است که در زنبورهای ماده‌زا تخمهای تلقیح نشده نیز به نتاج ماده تبدیل می‌شوند. در حدود ۱۰ درصد از گونه‌های تریکوگراما، آلدگی به باکتری *Wolbachia* گزارش شده است. این باکتری باعث القاء ماده‌زایی می‌شود (Pintureau *et al.*, 2002; Almeida, 2004) در زنبور تریکوگراما، این جمعیت‌های ماده‌زا می‌توانند از نظر کارایی مؤثرتر از نمونه‌های دوجنسی باشند که مزیت‌هایی به آن‌ها نسبت داده شده (Stouthamer, 1993; 2003).

و در این راستا بررسی‌های مقایسه‌ای نیز صورت گرفته است (Farrokhi *et al.*, 2010; Silva, 1999).

باکتری‌های *Wolbachia* (α -proteobacteria) هم‌زیست درون سلولی تعدادی از بندپایان و نماتدهای فیلاریا می‌باشند که اغلب موجب تغییراتی در ویژگی‌های تولید مثلی آن‌ها می‌شوند (Taylor & Hoerauf, 1999; Werren, 1997). این عوامل میکروبی می‌توانند بسته به نوع میزبان تغییرات مختلفی را شامل ناسازگاری سیتوپلاسمی^۱، مؤنث‌سازی^۲، نرکشی^۳ و القاء ماده‌زایی^۴ در شیوه‌ی تولید مثل آن‌ها موجب شوند (O'Neill *et al.*, 1997; Stouthamer *et al.*, 1999). همچنین، آن‌ها می‌توانند در برخی موارد باروری میزبان خود را به مقدار قابل توجهی افزایش دهند یا قادر هرگونه اثر آشکاری باشند (Girin & Bouletreau, 1995; Vavre *et al.*, 1999). بررسی فیلوزنی استرین‌های این باکتری بر مبنای ژن‌های 16S rRNA، *ftsZ* و به‌ویژه^۵ *wsp*، آن‌ها را به شش بالاگروه (A-F) تقسیم نموده که اعتبار بالاگروه‌های A و B به‌طور کامل مورد تأیید می‌باشد (Zhou *et al.*, 1998). براساس آخرین نتایج تحقیقاتی، یازدهمین بالاگروه (K) نیز معرفی شده است (Ros *et al.*, 2009).

در بین ۱۸ گونه زنبور *Trichogramma* که به عنوان میزبان PI-*Wolbachia* گزارش شده‌اند، آلدگی در دو گونه‌ی *T. oleae* Voegelé & Pointel و *T. cordubensis* Vargas & Cabello مربوط به استرین‌هایی از بالاگروه B می‌باشد، به نحوی که آلدگی در تمام افراد جمعیت وجود دارد (حالت همگانی یا fixed). آلدگی در سایر گونه‌ها که استرین‌هایی متعلق به هر دو بالاگروه A و B را شامل می‌شود، به صورت مختلط است (حالت mixed یا اختلاطی از افراد آلد و غیرآلد) و تنها در تعدادی از افراد جمعیت که دارای تراکم مناسبی از باکتری می‌باشند ماده‌زایی دیده می‌شود (Stouthamer, 1997). در ایران تنها یک مورد آلدگی به این باکتری (استرین *Uro3*) در زنبور *Trichogramma embryophagum* (Hartig) (2001) از *T. brassicae* ارومیه گزارش شده است. با بررسی وضعیت بکرزایی در ۱۱ سوش ایرانی زنبور

^۱- Cytoplasmic incompatibility (CI)

^۲- Feminization

^۳- Male-killing

^۴- Parthenogenesis inducing (PI)

^۵- *Wolbachia* outer surface protein gene

که توسط Attaran (2002) انجام شد، با وجود بالا بودن نسبت افراد ماده در برخی اکوتیپ‌ها، شواهدی دال بر آلودگی به باکتری عامل ماده‌زایی به دست نیامد. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا با توجه به کاربرد بهنسبت وسیع زنبور تریکوگراما در کشور و اهمیت اقتصادی استفاده از زنبورهای تک‌جنسی (unisexual)، ضمن بررسی شیوه‌ی تولید مثلی در اکوتیپ‌های بومی این زنبور، عامل ماده‌زایی در بین آن‌ها با روش‌های مولکولی ردیابی و شناسایی شود.

مواد و روش‌ها

جمع‌آوری و نگهداری اکوتیپ‌های زنبور تریکوگراما

برای دست‌یابی به نمونه‌های ماده‌زای زنبور، در سال‌های ۱۳۸۴-۸۵ تخم‌های پارازیته‌ی بال‌پولکداران از گیاهان مختلف شامل برنج و علف‌های هرز حاشیه‌ی شالیزارها، به‌ویژه گیاه مستک (توق) (*Xanthium strumarium* L.) (Asterales: Asteraceae) جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. بیشتر نمونه‌ها در اواسط شهریور ماه که برنج در بیشتر شالیزارها برداشت شده بود، از مناطق شمالی و مرکزی استان مازندران به دست آمدند. علاوه‌بر این، برای دست‌یابی به افراد ماده‌زا، جستجو در بین نمونه‌های ارسالی از نقاط مختلف ایران و جمعیت‌های تک‌جنسی و دوجنسی زنبورهای تریکوگراما ادامه یافت. این زنبورها در بخش تحقیقات کترل بیولوژیک مؤسسه‌ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور به صورت زنده نگهداری می‌شوند (جدول ۱).

پس از خروج زنبورها، هر یک از سوش‌ها به تفکیک در شرایط $10^{\circ}\text{C} \pm 20$ رطوبت نسبی 60 ± 10 درصد و طول دوره‌ی روشنایی ۱۶ و تاریکی ۸ ساعت روی تخم بید غلات پرورش داده شدند. برای تعیین وضعیت بکریابی و تولید مثل زنبورها، تخم‌های پارازیته به صورت انفرادی و مجزا در لوله‌های شیشه‌ای (12×75 میلی‌متر) قرار داده شدند. پس از خروج حشرات کامل نسل اول، تخم تازه‌ی میزان واسطه طور جداگانه در اختیار زنبورهای ماده‌ی باکره (isofemale) گذاشته شد و در نهایت نسبت جنسی نتاج آن‌ها مشخص گردید. با مشاهده‌ی افراد ماده‌زا و دوجنسی در یک جمعیت، نسبت به ایجاد لاین‌های خالص و تداوم پرورش آن‌ها در همان شرایط محیطی اقدام شد.

شناسایی زنبورها و ردیابی باکتری *Wolbachia*

برای شناسایی زنبورها علاوه بر تهیه‌ی اسلاید میکروسکوپی از شاخک و زنیتالیای نر و استفاده از کلید مربوط به صفات مرفوژیک (Ebrahimi *et al.*, 1998)، از روش مولکولی نیز برای تعیین اندازه‌ی ناحیه‌ی ITS2 و مقایسه‌ی آن در نمونه‌های مختلف استفاده شد (Silva, 1999; Stouthamer *et al.*, 1999) برای تعیین اندازه‌ی ناحیه‌ی ITS2 و مقایسه‌ی آن در نمونه‌های مختلف استفاده شد (Silva, 1999; Stouthamer *et al.*, 1999). در موارد مشکوک به آلودگی میکروبی که تمام نتاج زنبورهای باکره، ماده و یا ترکیبی از نر و ماده بودند (deuterotoky یا thelytoky) ابتدا زنبورهای ماده با محلول آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین هیدروکلراید به نسبت ۵۰ میلی‌گرم در یک میلی‌لیتر آب و عسل (Tagami *et al.*, 2002) تغذیه شدند و دوباره نحوه‌ی تولید مثل آن‌ها پس از چهار نسل بررسی شد. در صورت بازگشت به حالت دوجنسی احتمال آلودگی به باکتری القاء‌کننده‌ی بکرزایی زیاد بود که برای تأیید نهایی، ژن *wsp* به روش مولکولی و با استفاده از PCR ردیابی و تعیین توالی شد (Pintureau *et al.*, 2002; Gonçalves *et al.*, 2006).

استخراج DNA و انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)

استخراج DNA نمونه‌های مورد نظر، طبق روش Huigens *et al.* (2004) انجام شد. در مواردی که هدف آزمایش ردیابی باکتری در یک جمعیت یا لاین مشخص بود، به جای یک زنبور از پنج زنبور ماده استفاده شد. به‌این ترتیب که ابتدا به هریک از لوله‌های ۰/۵ میلی‌لیتری محتوی زنبور، ۵۰ میکرولیتر Chelex-100 Proteinase K (۲۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر) افزوده شد. نمونه‌ها حداقل به مدت ۴ ساعت در انکوباتور ۵۶°C و متعاقب آن ۱۰ دقیقه در دمای ۹۵°C قرار داده شدند و درنهایت تا پیش از انجام واکنش PCR نمونه‌ها در دمای ۴°C نگهداری شدند. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در دستگاه Eppendorf thermocycler در لوله‌های ۰/۰۲ میلی‌لیتری با حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر شامل ۵ میکرولیتر DNA نمونه‌ی مورد نظر، ۵ میکرولیتر ۵X green PCR reaction buffer (Promega, Madison, WI, USA) و ۰/۵ میکرولیتر از مخلوط dNTPs (هر کدام با غلظت ۱۰ میلی‌مول)، ۰/۵ میکرولیتر از آغازگرهای

۱- Internal transcribed spacer-2

۲- Polymerase chain reaction

۵) *Go Taq polymerase* forward و reverse با غلظت ۲۵ پیکومول بر میکرولیتر، ۰/۱۲۵ میکرولیتر (Promega, Madison, WI, USA) و ۱۱/۸۷۵ میکرولیتر آب مقطر استریل انجام واحد بر میلی لیتر) شد. آغازگرهای ITS2 و *wsp* و برنامه‌ی مربوط به هریک از آنها که به ترتیب برای شناسایی زنبور و باکتری استفاده شدند عبارتند از: ۳'-*TGTGA*ACTGCAGGACACATG-۳'، ITS2-forward ۵'-TGTGAACTGCAGGACACATG-۳'، ITS2-reverse ۵'-GTCTTGCGCTGCTGAG-۳' (۴۰ ۹۴°C دقيقه در ۳۳، ۹۴°C تکرار از ۴۰ ثانیه)، ۷۲°C (۴۵ ثانیه) و در نهایت بعد از آخرین چرخه، ۱۰ دقيقه در ۷۲°C ۵۳°C (*wsp*-forward (81F) ۵'-TGGTCCAATAAGTGATGAAGAAC-3'؛ Gonçalves *et al.*, 2006) (یک دقيقه)، ۵۰°C (یک دقيقه)، ۷۲°C (یک دقيقه) و در نهایت بعد از آخرین چرخه، ۵ دقيقه در ۷۲°C (Braig *et al.*, 1998). در نهایت پس از انجام الکتروفورز محصول PCR نمونه‌های اصلی (جمعیت‌های مورد اشاره در شکل ۱) به همراه نمونه‌های استاندارد موجود در آزمایشگاه حشره‌شناسی دانشگاه واخینینگ و نشانگر نزدیکی ۱۰۰ جفت باز روی ژل آگارز ۱/۵٪ حاوی اتیدیوم بروماید، از ژل‌های مربوطه عکس تهیه شد.

همسانه‌سازی (cloning) و تعیین توالی ژن‌های ITS2 و *wsp*

به منظور اطمینان از دقیقیت در شناسایی زنبورهای مناطق با بلسر (جمعیت‌های آلوده و غیرآلوده)، فردوس و نوا، توالی ناحیه‌ی ITS2 پس از همسانه‌سازی در چهار نمونه تعیین شد. این عمل در مورد ژن *wsp* نیز برای بررسی فیلوژنی استرین باکتری همزیست وابسته به جمعیت آلوده‌ی با بلسر (B 11W⁺) انجام شد. پس از انجام PCR و راندن نمونه‌ها روی ژل الکتروفورز و برش قطعات ژل حاوی محصولات ITS2 و *wsp* خالص‌سازی آنها با کیت MinElute Gel Extraction (Qiagen) صورت گرفت. در مرحله‌ی بعد، طبق دستورالعمل کیت CloneJet PCR Cloning (Fermentas) هریک از قطعات مورد نظر به تفکیک وارد یک حامل پلاسمیدی (pJET1.2/blunt plasmid vector) شدند. سپس پلاسمیدها به درون سلول‌های باکتری Stratagene, La Jolla, CA, USA) *Escherichia coli* x12 منتقل شده و باکتری‌ها روی محیط آب آگار و مخمر درون تشتک‌های پتری به قطر ۷ سانتی‌متر در دمای ۳۷°C به مدت ۱۲ ساعت

کشت داده شدند. درنهایت، با استفاده از کیت Plasmid Miniprep (Sigma-Aldrich) مورد نظر صورت گرفت و پیش از ارسال آنها برای تعیین توالی، خالص‌سازی قطعات DNA با انجام PCR دوباره نمونه‌ها، از صحت الحق قطعات ITS2 و *wsp* اطمینان حاصل شد.

بررسی فیلوزنیک باکتری


برای تعیین فیلوزنی تنها استرین ایرانی باکتری *Wolbachia* که در این تحقیق توالی ژن *wsp* آن به دست آمد، از ۴۲ نمونه‌ی دیگر، متعلق به بندپایانی از سه قاره‌ی آسیا، اروپا و آمریکا شامل ۱۵ گونه زنبور تریکوگراما استفاده شد. با توجه به امکان انتقال افقی این باکتری بین گونه‌های مختلف جانوری، انتخاب استرین‌های باکتری تنها بر مبنای ارتباط تاکسونومیک میزان صورت نگرفته است. توالی‌های به دست آمده در این تحقیق با نرم‌افزار GeneDoc مرتب شده و به روش pairwise alignment با تغییرات جزئی با یکدیگر تطبیق داده شدند. آنالیزهای فیلوزنیک به روش maximum parsimony براساس تنظیم اولیه‌ی برنامه‌ی MEGA3 (Kumar *et al.*, 2004) انجام شدند. مبنای آنالیز در این شیوه، روش جستجوهای اکتشافی (heuristic searches) به همراه یک روش مرحله به مرحله بود و محدود فضاهای خالی، به عنوان داده‌های گم شده در نظر گرفته شدند. استرین مربوط به زنبور *Encarsia formosa* Gahan که به لحاظ نحوه‌ی القاء بکرزایی و پایداری آن در جمعیت میزان خود از وضعیت موجود در زنبور تریکوگراما متمایز می‌باشد، به عنوان outgroup منظور شد. درجه‌ی اعتبار شاخه‌های درخت با ۱۰۰۰ تکرار bootstrap محاسبه شد.

نتایج

ردیابی باکتری *Wolbachia*

در بین ۲۲ سوش یا جمعیت مختلف زنبور تریکوگراما، علاوه‌بر جمعیت‌های تک‌جنSSI فردوس (شمال‌غرب خراسان جنوبی) و نوا (مازندران) که به ترتیب از آفات کلیدی باغ‌های انار و سیب جمع‌آوری و تمام افراد آنها ماده بودند، تنها در تک‌ماده‌های باکره‌ی سه جمعیت بابلسر، چمستان و نور بکرماده‌زایی (thelytokous parthenogenesis) با مقادیر متفاوت مشاهده شد. شیوه‌ی تولید مثلی در این سه جمعیت که روی گیاه مستک و تخمه‌ای پارازیته‌ی

ساقه‌خوار اروپایی ذرت جمع‌آوری شده بودند، بر اثر تغذیه‌ی زنبورها با عسل آگشته به آنتی‌بیوتیک یا پرورش آنها در دمای ۲۸–۳۰°C به حالت عادی بازگشت. با ردیابی باکتری *Wolbachia* در هفت نمونه از زنبورها و براساس نتایج بررسی‌های مولکولی، آلدگی باکتریایی در پنج جمعیت ماده‌زا و دو جنسی مشاهده شد (شکل ۱).



شکل ۱- محصول PCR ژن *wsp* در جمعیت‌های مختلف زنبور تریکوگراما: ۱، دوجنسی بابلسر (B 13); ۲، ماده‌زای بابلسر (B 11W⁺); ۳، ماده‌زای تیمارشده با آنتی‌بیوتیک (B 11W⁻); ۴، نوا؛ ۵، فردوس؛ ۶، زهک؛ ۷، گورband؛ ۸، بیله‌سوار؛ ۹، قلعه‌قاضی؛ ۱۰، شاهد منفی؛ M نشانگر نرده‌بانی ۱۰۰ جفت باز.

Fig. 1. The *wsp* PCR products of *Trichogramma* populations: lane 1, Babolsar bisexual (B 13); lane 2, Babolsar thelytokous (B 11W⁺); lane 3, cured line by antibiotic (B 11W⁻); lane 4, Nava; lane 5, Ferdows; lane 6, Zehak; lane 7, Gourband; lane 8, Bilehsavar; lane 9, Ghaleghazi; lane 10, negative control; M, 100bp marker.

از مجموع بررسی‌ها و آزمایش‌های مختلف چنین نتیجه‌گیری می‌شود که عامل ماده‌زای در ۴۹/۵، ۳/۶ و ۲/۵ درصد از افراد بررسی شده در جمعیت‌های بابلسر، چمستان و نور که براساس صفات مرفو‌لژیک *T. brassicae* تشخیص داده شدند، باکتریایی است. در جمعیت‌های تک‌جنسی فردوس و نوا که نشانه‌ای از وجود باکتری دیده نشد و با اعمال تیمارهای حرارتی

و آنتی‌بیوتیکی نیز افراد نر ظاهر نشدن، ماده‌زایی دارای منشأ ژنتیکی است. در چهار جمعیت بیله‌سوار (شمال استان اردبیل)، قلعه‌قاضی، گوربند و زهک (استان‌های جنوب و جنوب شرقی) با وجود مثبت بودن نتیجه‌ی ردیابی باکتری *Wolbachia*, ماده‌زایی مشاهده نشد که علت آن می‌تواند به نوع استرین یا غلطت اولیه‌ی باکتری موجود در بدن زنبور مربوط باشد (جدول ۱). اما در اکوتیپ زهک حدود ۰.۲٪ از ماده‌های باکره به حالت نر-ماده‌زایی (deuterotoky) نتاج نر و ماده تولید نمودند.

شناسایی زنبورها

شناسایی جمعیت‌های بابلسر، بیله‌سوار و زهک با روش مولکولی با نتایج مبتنی بر صفات مرفو‌لوژیک مطابقت داشت که درنهایت نیز جمعیت‌های بابلسر و بیله‌سوار *T. brassicae* و زهک *Trichogramma pintoi* Voegelé معرفی شدند. تمایز جمعیت‌های قلعه‌قاضی و گوربند به‌دلیل تشابه مرفو‌لوژیک *Trichogramma evanescens* Westwood و *T. brassicae*, بر مبنای اندازه‌ی ناحیه‌ی ITS2 صورت گرفت و هر دو نمونه *T. evanescens* تشخیص داده شدند. شناسایی اکوتیپ‌های تک‌جنSSI فردوس و نوا به‌دلیل فقدان جنس نر تنها از طریق مقایسه‌ی اندازه‌ی محصول PCR و نتیجه‌ی تأثیر آنتی‌بیوتیک بر نحوه‌ی تولید مثل زنبورها امکان‌پذیر بود. به‌دلیل عدم آلدگی باکتریایی در این دو اکوتیپ، منشأ ماده‌زایی آن‌ها ژنتیکی تشخیص داده شد. با توجه به اینکه ماده‌زایی ژنتیکی تنها در گونه‌ی *Trichogramma cacoeciae* Marchal گزارش شده بود (Vavre *et al.*, 2004), درابتدا چنین بمنظر می‌رسید که هر دو اکوتیپ می‌باید متعلق به همین گونه باشند. اما براساس تفاوت نمونه‌های فردوس و نوا از نظر اندازه‌ی ناحیه‌ی ITS2 و همچنین تعیین توالی و تطابق انجام شده با سایر نمونه‌های بانک ژن، اکوتیپ‌های فردوس و نوا به‌ترتیب *T. embryophagum* و *T. cacoeciae* تشخیص داده شدند.

تعیین توالی ژن‌های ITS2 و wsp

توالی ناحیه‌ی ITS2 در لاین‌های ماده‌زا (آلدگه به *Wolbachia*) و دوجنسی جمعیت بابلسر (T. brassicae) که روی حشره و گیاه میزبان مشابهی در یک منطقه جمع‌آوری شده بودند،

جدول ۱ - جمعیت‌های بررسی شده زنبور *Trichogramma* نوع بکرزاپی و آلودگی آن‌ها به *Wolbachia* باکتری

Table 1. The studied populations of *Trichogramma* wasps, their parthenogenesis and *Wolbachia*-infection.

Population	Host plant	Host (insect)	Initial sex ratio (female %)	Number of studied isofemale (virgin) wasps	Thelytokous isofemale (%)	Parthenogenesis result*	<i>Wolbachia</i> detection
Amol	Mastak ¹	<i>Ostrinia nubilalis</i>	54%	47	0	A	-
Gelyerd (Mazandaran)	Mastak	<i>O. nubilalis</i>	55%	65	0	A	-
Ejbarkola (Amol)	Rice	<i>Chilo suppressalis</i>	63%	17	0	A	-
Mahmudabad	Mastak	<i>O. nubilalis</i>	60%	25	0	A	-
Galeshpole (Mazandaran)	Mastak	<i>O. nubilalis</i>	59%	102	0	A	-
Babolsar	Mastak	<i>O. nubilalis</i>	74%	107	49.5%	A/T	P
Babol	Mastak	<i>O. nubilalis</i>	54%	11	0	A	-
Chamestan	Mastak	<i>O. nubilalis</i>	59%	28	3.6%	A/T	P
Nour	Mastak	<i>O. nubilalis</i>	63%	40	2.5%	A/T	P
Nava	Apple	<i>Cydia pomonella</i>	67-100%	30	100%	T/A	N
Ferdows (Khorasan)	Pomegranate	<i>Ectomyelois ceratoniae</i>	100%	30	100%	T	N
Gorgan	Cotton	<i>Helicoverpa armigera</i>	70%	20	0	A	-
Aliabad (Gorgan)	Cotton	<i>H. armigera</i>	61%	17	0	A	-
Shastkola (Gorgan)	Trap ²	? <i>Sitotroga cerealella</i>	55%	16	0	A	-
Gonbad	Cotton	<i>H. armigera</i>	59%	16	0	A	-
Rasht (Insectarium)	?	? <i>Sitotroga cerealella</i>	77%	28	0	A	-
Bilehsavar	Cotton	<i>H. armigera</i>	72%	37	0	A	P
Moghan	Cotton	<i>H. armigera</i>	68%	29	0	A	-
Zehak (Zabol)	Panirak ³	<i>Vanessa cardui</i>	65%	34	0	A/D	P
Ghalehghazi (Bandar-Abbas)	Panirak	<i>V. cardui</i>	49%	32	0	A	P
Gourband (Minab)	Panirak	<i>V. cardui</i>	64%	30	0	A	P
Bagh Malek (Khuzestan)	?	?	?	25	0	A	-

* Thelytoky/Arrhenotoky/Deuterotoky (T/A/D).

1- *Xanthium strumarium*; 2- *Sitotroga* egg; 3- *Malva neglecta*.

P = Positive; N = Negative.

نشان‌دهندهٔ تشابه ژنتیکی بسیار زیاد آن‌ها می‌باشد. در مورد جمعیت‌های فردوس و نوا، همان‌طور که در قسمت قبلی اشاره شد، با وجود شباهت توالی ناحیهٔ ITS2 این دو اکو‌تیپ، در بین ۵۷۶ باز، ۲۲ تفاوت نیز وجود داشت. با در نظر گرفتن تغییر سیستم تولید مثلی اکو‌تیپ

نوا از حالت ماده‌زایی کامل (تک‌جنسی) به دو جنسی پس از چندین نسل پرورش در دماهای مختلف و همچنین تفاوت در اندازه‌ی محصول PCR ناحیه‌ی مزبور، این دو جمعیت مربوط به دو گونه‌ی متفاوت می‌باشند.

با تعیین توالی ژن *wsp* استرین باکتری *Wolbachia* که از زنبورهای ماده‌زای جمعیت بابلسر (*T. brassicae*) به دست آمده بود و مقایسه‌ی آن با سایر استرین‌های موجود در بانک ژن، شباهت بسیار زیادی بین استرین جدید ایرانی (*wBa_{T.bra}*) و استرین ژاپنی (*WDen Fukuyama*) که از زنبور *Trichogramma dendrolimi* Matsumura گزارش شده مشاهده گردید، به‌نحوی که تفاوت آن‌ها تنها در ۳ باز بود (شکل ۲). توالی‌های مربوط به ژن *wsp* استرین ایرانی باکتری *Wolbachia* و ناحیه‌ی ITS2 زنبور *T. brassicae* آلوده به این باکتری با استفاده از برنامه‌ی Sequin به بانک ژن (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank>) ارائه و در نهایت با کدهای FJ441291 و FJ441292 به ترتیب برای استرین *wBa_{T.bra}* و زنبور میزان آن (11 Tbra-B) به ثبت رسید.

فیلوژنی باکتری *Wolbachia*

همان‌طور که از نتایج به دست آمده از تشکیل درخت فیلوژنی باکتری *Wolbachia* مشاهده می‌شود (شکل ۳)، استرین *wBa_{T.bra}* (که در این بررسی از *T. brassicae* بابلسر شناسایی شد) به همراه دیگر استرین ایرانی *T. embryophagum* (*Uro3*، ارومیه) در گروه Sib از بالاگروه B قرار گرفتند. استرین‌های AB094397 (*WDen Fukuyama*) و AY634680 مربوط به گونه‌ی *Chouioia cunea* Yang (Hym.: Eulophidae) و EU181443 (*T. dendrolimi*) (پارازیت شفیره‌ی پروانه‌ی تارتان پائیزی، *Hyphantria cunea* (Drury) در چین) بیشترین قرابت را با استرین *wBa_{T.bra}* دارند (شکل‌های ۲ و ۳). سایر استرین‌های وابسته به زنبور *T. brassicae* که از فرانسه، آلمان و چین گزارش شده‌اند در دو گروه دیگر (Chi و Kue) از بالاگروه‌های B و A قرار دارند. شاخص‌های محاسبه‌شده، مثل $CI = 0/6137$ نشان از پایداری درخت ترسیم شده دارد (شکل ۳).

wBa	1	TGGTCCAATAAGTGTGAAGAAACTAGCTACTACGTTCGTTACAATACAACGGTGAAT	60
WDen	1	TGGTCCAATAAGTGTGAAGAAACTAGCTACTACGTTCGTTACAATACAACGGTGAAT	60
wBa	61	TTTACCTTTTATACAAAAGTTGATGGTTAAAAATTCAACAG G TAAAGAGGAGGATAG	120
WDen	61	TTTACCTTTTATACAAAAGTTGATGGTTAAAAATTCAACAA G TAAAGAGGAGGATAG	120
wBa	121	TCCTTAAAAAGATCTTTATAGCTGG T TCGCATTGGTTATAAAATGGATGACAT	180
WDen	121	TCCTTAAAAAGATCTTTATAGCTGG C GG T TCGCATTGGTTATAAAATGGATGACAT	180
wBa	181	CAGAGTTGATGTTGAAGGGCTTACTCAGCATTGGCTAAAATAAGCTGTAATAGATGC	240
WDen	181	CAGAGTTGATGTTGAAGGGCTTACTCAGCATTGGCTAAAATAAGCTGTAATAGATGC	240
wBa	241	TTCTGAATCACATGTTGCAGACAGTTAACAGCATTTCAGGATTGGTTAACGTTTATTA	300
WDen	241	TTCTGAATCACATGTTGCAGACAGTTAACAGCATTTCAGGATTGGTTAACGTTTATTA	300
wBa	301	TGATATAGTGTGAAGATATGCCTATCACTCCATACGTTGGTGTGGTGTGGCAGC	360
WDen	301	TGATATAGTGTGAAGATATGCCTATCACTCCATACGTTGGTGTGGTGTGGCAGC	360
wBa	361	ATATATCAGCAATCCTCAAACGCTGCTGAAGTTAAAGATCAAAGGAGGTTCGGTTTG	420
WDen	361	ATATATCAGCAATCCTCAAACGCTGCTGAAGTTAAAGATCAAAGGAGGTTCGGTTTG	420
wBa	421	TTATCAAGAAAAGCTGGTTAGTTATGATGTAGCCCCAGAAATCAAACCTTTGCTGG	480
WDen	421	TTATCAAGAAAAGCTGGTTAGTTATGATGTAGCCCCAGAAATCAAACCTTTGCTGG	480
wBa	481	AGCTCGTTACTTCGGTTCTATGGTCTAGTTTGATAAGGAGCAGCTAAGGGTGTGATGG	540
WDen	481	AGCTCGTTACTTCGGTTCTATGGTCTAGTTTGATAAGGAGCAGCTAAGGGTGTGATGG	540
wBa	541	TATCAAAAATGTTCTTACAACACTTTGGTCAGAAGCTGGAGTAGCGTTAATT	599
WDen	541	TATCAAAAATGTTCTTACAACACTTTGGTCAGAAGCTGGAGTAGCGTTAATT	599

شکل ۲ - توالی‌های ژن *wsp* باکتری *Wolbachia* در استرین‌های *wBa_{T.bra}* (مربوط به سوش بابلسر، ایران) و *WDen* (*T. dendrolimi* فوکویاما، ژاپن). حروف ضخیم موارد اختلاف را نشان می‌دهد.

Fig. 2. The *wsp* sequences: *wBa*, *Wolbachia* strain of *T. brassicae* (Babousar, Iran); *WDen*, *Wolbachia* strain of *T. dendrolimi* (AB094397, Fukuyama, Japan). Bold letters indicate the differences.

بحث

براساس نتایجی که از ردیابی باکتری *Wolbachia* به عنوان مهم‌ترین عامل ماده‌زایی در زنبورهای تریکوگراما به دست آمد (جدول ۱)، می‌توان اظهار نمود که دست‌یابی به استرین‌های جدیدی که القاء بکرزاوی (PI) توسط آنها محرز شده باشد، به بررسی دقیق و گسترده‌ای نیاز دارد و احتمال می‌رود ردیابی آن در بین تمام گونه‌های موجود و در همهی مناطق امکان‌پذیر نباشد. با وجودی که تعداد و پراکنش نمونه‌های بررسی شده نمی‌تواند شاخص دقیقی از کل

کشور باشد، اما تاکنون از ۱۱ گونه‌ی شناخته شده در ایران، باکتری مزبور در دو گونه‌ی *T. brassicae* از ارومیه و *T. embryophagum* از بابلسر گزارش شده است. در دنیا نیز این نوع باکتری (PI-Wolbachia) به عنوان عامل القاء‌کننده‌ی ماده‌زایی در حدود ۱۰٪ از گونه‌های تریکوگراما مطرح شده است (Huigens & Stouthamer, 2003). پیش‌ازاین، از آسیا تنها یک گزارش از کشور چین در مورد آلدگی زنبور *T. brassicae* به عنوان گونه‌ای که تولید انبوه آن به صورت تجاری در سطح گستره‌های از کشورها مطرح می‌باشد، وجود داشته (بانک اطلاعاتی www.wolbachia.sols.uq.edu.au) که با مشخص شدن آلدگی درصد قابل ملاحظه‌ای (۴۹/۵٪) از جمعیت بابلسر می‌توان با انجام تحقیقات مقایسه‌ای و هدفمند جنبه‌های کاربردی استفاده از لاین‌های تک‌جنسي *T. brassicae* را، به ویژه علیه ساقه‌خوارهای برنج و ذرت، مورد بررسی قرار داد. در این ارتباط تحقیقاتی در زمینه‌ی مقایسه‌ی برخی از ویژگی‌های زیستی جمعیت‌های دوجنسی و ماده‌زای این گونه (Farrokhi et al., 2010) و امکان انتقال افقی درون‌گونه‌ای و بین‌گونه‌ای این باکتری همزیست انجام شده (Farrokhi et al., 2008) و مطالعات تكمیلی در سطح مزرعه در حال انجام است.


براساس درخت فیلوزنی استرین‌های *Wolbachia* همزیست زنبورهای تریکوگراما و تعداد دیگری از بندپایان (شکل ۳)، استرین *wBa_{T.bra}* با استرین‌های عامل ماده‌زایی در جمعیت‌های *T. oleae* و *T. cordubensis* و *S2* و *Grey* در یک گروه قرار دارد که آلدگی آنها به حالت همگانی و تثیت‌شده (fixed) است. این موضوع با در نظر گرفتن میزان شیوع و گسترش آلدگی طبیعی در جمعیت بابلسر می‌تواند بیانگر پتانسیل بالای این استرین در ایجاد و تثیت ماده‌زایی در تمام افراد لاین تک‌جنسي حاصل از آن باشد، بهنحوی که براساس گفته‌ی Huigens & Stouthamer (2003) کم‌ترین هزینه‌ی سازگاری (fitness cost) را نیز برای میزان خود خواهد داشت. با توجه به اینکه در شرایط طبیعی امکان انتقال افقی باکتری از گونه‌ای به گونه‌ی دیگر بر اثر سوپرپارازیتیسم و مولتیپارازیتیسم وجود دارد، نمی‌توان ارتباط دقیقی میان استرین‌های باکتری با میزان و یا پراکنش جغرافیایی آنها برقرار نمود. اما همان‌طور که اشاره شد از جنبه‌ی کاربردی شاید بتوان آلدگی به استرین *wBa_{T.bra}* را در درصد قابل توجهی از افراد جمعیت بابلسر (۴۹/۵٪)، با هم‌گروهی و تشابه ژنتیکی این باکتری با استرین‌های *Grey* و

S2 مرتبط دانست. زیرا در اغلب جمعیت‌هایی که آلدگی آن‌ها به حالت mixed می‌باشد (Stouthamer, 1989; Stouthamer & Kazmer, 1994; Stouthamer et al., 2001) فراوانی افراد آلدده کمتر از ۵٪ است (Miura et al., 2009). برای اظهار نظر قطعی در این زمینه، در بررسی‌های تکمیلی استفاده از سیستم^۱ MLST که ابزار مناسبی برای مطالعات تکاملی و رشته‌کاری جمعیت می‌باشد (Baldo et al., 2006) می‌تواند به تفسیر بهتر نتایج کمک نماید.

با در نظر گرفتن نتایج این بررسی و مواردی که از وجود باکتری در مناطق کم ارتفاع و حتی گرمسیر مانند حاشیه‌ی دریای خزر و استان‌های جنوب شرقی کشور به دست آمد، چنین برداشت می‌شود که با وجود تأثیر منفی گرمابر تراکم و قدرت افزایش باکتری *Wolbachia*، امکان دست‌یابی به استرین‌های جدیدی از این باکتری در میکروکلیماهای خاصی از مناطق کم ارتفاع و هم‌سطح دریا نیز وجود دارد. بر این اساس، ضمن در نظر گرفتن نتیجه‌گیری Monje et al. (2005) که در مناطق مرتفع ۱۱۰۰ تا ۳۷۰۰ متر از سطح دریا) مرکزی اکوادر رابطه‌ی مثبتی بین ارتفاع و فراوانی استرین‌های ماده‌زا به دست آورده، نباید برای یافتن استرین‌های جدید *Wolbachia* هیچ منطقه‌ی اقلیمی را از نظر دور داشت، به طوری که جمعیت‌هایی از *T. deion* Pinto & Oatman و *Trichogramma kaykai* Pinto & Stouthamer که آلدگی باکتریایی در تعدادی از افراد آن به صورت مختلط وجود داشته از صحراهای مجاوه در جنوب غربی آمریکا جمع‌آوری شده‌اند (Stouthamer, 1997; Stouthamer et al., 2001).

در مورد تفاوت‌های بین دو جمعیت فردوس و نوا می‌توان ماده‌زا بین در چندین نسل از جمعیت نوا را به خالص‌نبودن جمعیت زنبور و هیبریداسیون ناشی از آن نسبت داد که Stouthamer et al. (1990) به مواردی از این پدیده در سوش‌های معینی از گونه‌های منطقه‌ی *T. embryophagum* و *T. cacoeciae* اشاره نموده‌اند. اما به هر حال با توجه به پاله‌آرکتیک مانند تشابه ظاهری و حتی رشته‌کاری این دو گونه، برای اظهار نظر قطعی لازم است تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

۱- Multilocus sequence typing



شکل ۳- درخت فیلوزنیکی که براساس توالی‌های زن wsp استرین‌های باکتری *Wolbachia* به روش maximum parsimony ساخته شده است. اسمای مربوط به گونه‌ی میزبان، استرین باکتری و محل جمع‌آوری نمونه‌ها است. اعداد مجاور محل انشقاق بیانگر درجه‌ی اعتبار bootstrap در ۱۰۰۰ تکرار می‌باشد. Consistency index (CI) = ۰/۶۱۳۷، Tree length = ۳۳۴، Retention index (RI) = ۰/۸۸۱۷

Fig. 3. Phylogenetic tree based on *wsp* sequences of *Wolbachia*, constructed from a maximum parsimony analysis. Names correspond to source of strains. Numbers near the nodes indicate percentages of 1000 bootstrap replicates. Consistency index (CI) = 0.6137, Retention index (RI) = 0.8817, Tree length = 334.

از تشابه ژنتیکی لاین‌های دوجنسی و ماده‌زای آلوده به باکتری جمعیت بابلسر (*T. brassicae*) چنین برداشت می‌شود که اختلاف جزئی در ناحیه‌ی ITS2 مربوط به تفاوت‌های فردی است و نمی‌توان آن را به اختلاف در سطوح بالاتر نسبت داد. طبق نظر Mayr *et al.* (1953) گونه‌های هم‌جا (sympatric) که جدایی تولید مثلی نداشته و روی یک میزبان زندگی می‌کنند قادر اختلاف ژنتیکی می‌باشند (به نقل از Steiner (1994)). بر این اساس، افراد ماده‌زا و دوجنسی که در تحقیق حاضر از دو دسته تخم پارازیته‌ی ساقه‌خوار اروپایی و روی دو بوته‌ی مستک و تقریباً نزدیک بهم (۱۰ الی ۱۰۰ متر) جمع‌آوری شده‌اند، نمی‌توانند یوویتیپ‌های گونه‌ی *T. brassicae* محسوب شوند. ضمن اینکه تمام زنبورهای خارج شده از یک دسته تخم، ماده‌زا نبوده و در کنار آن‌ها افراد دوجنسی غیرآلوده نیز در جمعیت وجود داشته است. لذا بهتر است با در نظر گرفتن تأثیر آنتی‌بیووتیک بر طیف وسیعی از میکروارگانیزم‌های موجود در بدن زنبورهای تریکوگراما، در مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی افراد تک‌جنسی و دوجنسی علاوه‌بر افراد تیمار شده با آنتی‌بیووتیک (لاین دوجنسی حاصل از جمعیت آلوده به باکتری)، در صورت امکان از افراد دوجنسی طبیعی نیز استفاده شود تا علاوه‌بر کاستن از خطای آزمایش، بر دقت و اعتبار نتایج آن افزوده گردد.

در جمعیت‌های بیله‌سوار (*T. brassicae*), زهک (*T. pintoi*), قلعه‌قاضی و گوربند (*T. evanescens*) با وجود مثبت بودن نتیجه‌ی ردیابی باکتری *Wolbachia*, شیوه‌ی تولید مثلی به صورت دوجنسی یا نرزایی بود. مشابه این وضعیت را Song & Shen (2006) در چهار گونه‌ی غالب در چین، *T. ostriniae* Pang & Chen و *T. evanescens*, *T. chilonis* Ishii, *T. dendrolimi* گزارش نموده و علت آن را به یک نوع مکانیزم جدید و یا پائین بودن غلط‌نمایی باکتری نسبت داده‌اند. برای تعیین علت دقیق این پدیده بررسی‌های تکمیلی ضروری می‌باشد.

سپاس‌گزاری

بدین‌وسیله ضمن قدردانی از مهندس محمود حسن‌زاده، مهندس رجب شکری و سایر عزیزانی که در جمع‌آوری، تهیه و ارسال نمونه‌ها همکاری نمودند، از دکتر محمدرضا عطاران و دکتر ابراهیم ابراهیمی بهدلیل در اختیار گذاشتن نمونه‌های زنبور و شناسایی اولیه‌ی آن‌ها،

صمیمانه سپاس‌گزاری می‌شود. این پژوهش با حمایت مالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک مؤسسه‌ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و آزمایشگاه حشره‌شناسی دانشگاه واخنینگن هلند به انجام رسیده است.

منابع

- Almeida, R. P.** (2004) *Trichogramma* and its relationship with *Wolbachia*: identification of *Trichogramma* species, phylogeny, transfer and costs of *Wolbachia* symbionts. Ph. D. Thesis. Wageningen University, The Netherlands, 142 pp.
- Attaran, M. R.** (2002) Evaluation of biological attribution of local ecotypes of *Trichogramma brassicae* Bezsd. (Hym., Trichogrammatidae) in central and eastern costal regions of Caspian sea. Ph. D. Thesis. Islamic Azad University, Iran, 184 pp. [In Persian with English summary].
- Baldo, L., Dunning Hotopp, J. C., Jolley, K. A., Bordenstein, S. R., Biber, S. A., Choudhury, R. R., Hayashi, C., Maiden, M. C. J., Tettelin, H. & Werren, J. H.** (2006) Multilocus sequence typing system for the endosymbiont *Wolbachia pipiensis*. *Applied and Environmental Microbiology* 72(11), 7098-7110.
- Braig, H. R., Zhou, W., Dobson, S. & O'Neill, S. L.** (1998) Cloning and characterization of a gene encoding the major surface protein of the bacterial endosymbiont *Wolbachia*. *Journal of Bacteriology* 180, 2373-2378.
- Doutt, R. D.** (1958) The biology of parasitic hymenoptera. *Annual Review of Entomology* 4, 161-182.
- Ebrahimi, E.** (1999) Morphological and enzymatic study of the genus *Trichogramma* in Iran. Ph. D. Thesis. Tarbiat Modarres University, Iran, 149 pp. [In Persian with English summary].
- Ebrahimi, E.** (2001) Study on the effect of *Wolbachia* on thelytoky of an Iranian strain of *Trichogramma*. *Applied Entomology and Phytopathology* 68, 99-105. [In Persian with English summary].
- Ebrahimi, E., Pintureau, B. & Shojai, M.** (1998) Morphological and enzymatic study of the genus *Trichogramma* in Iran. *Applied Entomology and Phytopathology* 66, 122-141. [In Persian with English summary].
- Farrokhi, S., Ashouri, A., Huigens, M. E. & Verbaarschot, P.** (2008) Horizontal transmission of *Wolbachia* in *Trichogramma* wasps (Hym., Trichogrammatidae).

- Iranian Journal of Plant Protection Science* 41(2), 315-325. [In Persian with English summary].
- Farrokhi, S., Ashouri, A., Shirazi, J., Allahyari, H. & Huigens, M. E.** (2010) A comparative study on the functional response of *Wolbachia*-infected and uninfected forms of the parasitoid wasp *Trichogramma brassicae*. *Journal of Insect Science* 10, 167.
- Girin, C. & Bouletreau, M.** (1995) Microorganism-associated variation in host infestation efficiency in a parasitoid wasp *Trichogramma bourarachae*. *Experientia* 52, 398-402.
- Gonçalves, C. I., Huigens, M. E., Verbaarschot, P., Duarte, S., Mexia, A. & Tavares, J.** (2006) Natural occurrence of *Wolbachia*-infected and uninfected *Trichogramma* species in tomato fields in Portugal. *Biological Control* 37, 375-381.
- Hassan, S. A.** (1994) Strategies to select *Trichogramma* species for use in biological control. pp. 55-71 in Wajnberg, E. & Hassan, S. A. (Eds) *Biological control with egg parasitoids*. 304 pp. CAB International, Wallingford, UK.
- Hassan, S. A., Hafes, B., Degrande P. E. & Herai, K.** (1998) The side-effects of pesticides on the egg parasitoid *Trichogramma cacoeciae* Marchal (Hym., Trichogrammatidae), acute dose-response and persistence tests. *Journal of Applied Entomology* 122, 569-573.
- Huigens, M. E., Almeida, R. P., Boons, P. A. H., Luck, R. F. & Stouthamer, R.** (2004) Natural interspecific and intraspecific horizontal transfer of parthenogenesis-inducing *Wolbachia* in *Trichogramma* wasps. *Proceedings of the Royal Entomological Society of London B* 271, 509-515.
- Huigens, M. E. & Stouthamer, R.** (2003) Parthenogenesis associated with *Wolbachia*. pp. 247-266 in Bourtzis, K. & Miller, T. A. (Eds) *Insect symbiosis*. 347 pp. CRC Press.
- Kumar, S., Tamura, K. & Nei, M.** (2004) MEGA3: integrated software for molecular evolutionary genetics analysis and sequence alignment. *Briefings in Bioinformatics* 5, 150-163.
- Miura, K., Yamanaka, T., Suzuki, Y., Tagami, Y. & Davis, A. P.** (2009) Male rescue maintains low frequency parthenogenesis-inducing *Wolbachia* infection in *Trichogramma* populations. *Population Ecology* 51, 245-252.
- Monje, J. C., Ponce, F. & Zebites, C. P. W.** (2005) Widespread occurrence of a thelytokous population of *Trichogramma pretiosum* Riley (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in

- the highlands of Ecuador with notes on other indigenous egg parasitoids. *Entomologentagung 2005, Dresden* 114.
- O'Neill, S. L., Hoffmann, A. A. & Werren, J. H.** (1997) *Influential passengers: inherited microorganisms and arthropod reproduction*. 232 pp. Oxford University Press, Oxford.
- Pinto, J. D.** (1998) Systematics of the North American species of *Trichogramma* Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae). *Memoirs of the Entomological Society of Washington* 22, 1-287.
- Pintureau, B.** (1990) Polymorphisme, biogéographie et spécificité parasitaire des trichogrammes européens. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 95, 17-38.
- Pintureau, B., Grenier, S., Heddi, A. & Charles, H.** (2002) Biodiversity of *Wolbachia* and of their effects in *Trichogramma* (Hymenoptera: Trichogrammatidae). *Annales de la Société Entomologique de France* (n.s.) 38(4), 333-338.
- Ros, V. I. D., Fleming, V. M., Feil, E. J. & Breeuwer, J. A. J.** (2009) How diverse is the genus *Wolbachia*? Multiple-gene sequencing reveals a putatively new *Wolbachia* supergroup recovered from spider mites (Acari: Tetranychidae). *Applied and Environmental Microbiology* 75(4), 1036-1043.
- Shojaei, M., Tergari, S., Azma, M. & Nasrollahi, A. A.** (1990) Faunistic study of beneficial parasitoid wasps *Trichogramma* and prospect for their application in agricultural field in Iran. *Iranian Research Organization for Science and Technology*, 33-47. [In Persian with English Summary].
- Silva, I. M. M. S.** (1999) Identification and evaluation of *Trichogramma* parasitoids for biological pest control. Ph. D. Thesis. Wageningen University, The Netherlands, 151 pp.
- Smith, S. M.** (1996) Biological control with *Trichogramma*: advances, successes and potential for their use. *Annual Review of Entomology* 41, 375-406.
- Song, Y. & Shen, Z. R.** (2006) Distribution of *Wolbachia* in major *Trichogramma* wasps in China and their impacts on reproduction of the hosts. Available on: <http://www.ipmst.org/MemberDetails.aspx?PhotoID=103> (accessed August 2011).
- Steiner, W. W. M.** (1994) Genetics and insect biotypes: evolutionary and practical implications. pp. 1-18 in Narang, S. K., Bartlett, A. C. & Faust, R. M. (Eds) *Applications of genetics to arthropods of biological control significance*. 199 pp. CRC Press.

- Stouthamer, R.** (1989) Causes of thelytoky and crossing incompatibility in several *Trichogramma* species. Ph. D. Thesis. University of California, Riverside, CA.
- Stouthamer, R.** (1993) The use of sexual versus asexual wasps in biological control. *Entomophaga* 38, 3-6.
- Stouthamer, R.** (1997) *Wolbachia*-induced parthenogenesis. pp. 102-124 in O'Neill, S. L., Hoffmann, A. A. & Werren, J. H. (Eds) *Influential passengers: inherited microorganisms and arthropod reproduction*. 232 pp. Oxford University Press, Oxford.
- Stouthamer, R.** (2003) The use of unisexual wasps in biological control. pp. 93-113 in van Lenteren, J. C. (Ed.) *Quality control and production of biological control agents: theory and testing procedures*. 327 pp. CABI Publishing, Wallingford.
- Stouthamer, R., Hu, J., van Kan, F. J. P. M., Platner G. R. & Pinto, J. D.** (1999) The utility of internally transcribed spacer 2 DNA sequences of the nuclear ribosomal gene for distinguishing sibling species of *Trichogramma*. *BioControl* 43, 421-440.
- Stouthamer, R. & Kazmer, D. J.** (1994) Cytogenetics of microbe-associated parthenogenesis and its consequences for gene flow in *Trichogramma* wasps. *Heredity* 73, 317-327.
- Stouthamer, R., Pinto, J. D., Platner, G. R. & Luck, R. F.** (1990) Taxonomic status of thelytokous forms of *Trichogramma*. *Annals of the Entomological Society of America* 83, 475-481.
- Stouthamer, R., van Tilborg, M., de Jong, H., Nunney, L. & Luck, R. F.** (2001) Selfish element maintains sex in natural populations of a parasitoid wasp. *Proceedings of the Royal Entomological Society of London B* 268, 617-622.
- Tagami, Y., Miura, K. & Stouthamer, R.** (2002) Positive effect of fertilization on the survival rate of immature stages in a *Wolbachia*-associated thelytokous line of *Trichogramma deion* and *T. kaykai*. *Entomologia Experimentalis et Applicata* 105, 165-167.
- Taylor, M. J. & Hoerauf, A.** (1999) *Wolbachia* bacteria of filarial nematodes. *Parasitology Today* 15, 437-442.
- Trumble, J. T. & Alvarado-Rodriguez, B.** (1998) Trichogrammatid egg parasitoids in the management of vegetable-crop insect pests. pp. 158-184 in Ridgway, R. L., Hoffmann, M. P., Inscoe M. N. & Glenister, C. S. (Eds) *Mass-reared natural enemies: application, regulation, and needs*. 332 pp. Thomas Say Publications in Entomology, Entomological Society of America, Lanham, MD, USA.

- Vavre, F., de Jong, J. H. & Stouthamer R.** (2004) Cytogenetic mechanism and genetic consequences of thelytoky in the wasp *Trichogramma cacoeciae*. *Heredity* 93, 592-596.
- Vavre, F., Girin, C. & Bouletreau, M.** (1999) Phylogenetic status of a fecundity-enhancing *Wolbachia* that does not induce thelytoky in *Trichogramma*. *Insect Molecular Biology* 8, 67-72.
- Werren, J. H.** (1997) Biology of *Wolbachia*. *Annual Review Entomology* 42, 587-609.
- Zhou, W., Rousset, F. & O'Neill, S.** (1998) Phylogeny and PCR-based classification of *Wolbachia* strains using *wsp* gene sequences. *Proceedings of the Royal Entomological Society of London B* 265, 509-515.