



## UvA-DARE (Digital Academic Repository)

### Landschapscompletering voor een betere plaagbeheersing

van Rijn, P.C.J.

**Publication date**

2016

**Document Version**

Final published version

**Published in**

Landschap

[Link to publication](#)

**Citation for published version (APA):**

van Rijn, P. C. J. (2016). Landschapscompletering voor een betere plaagbeheersing. *Landschap*, 33(1), 41-43. <http://www.landschap.nl/tijdschrift/>

**General rights**

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

**Disclaimer/Complaints regulations**

If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: <https://uba.uva.nl/en/contact>, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

# Landschapscompletering voor een betere plaagbeheersing

landschapscompletering  
populatiodynamica  
natuurlijke plaagbestrijding  
ecosysteemdiensten  
akkerranden

Veel diersoorten zijn afhankelijk van meer dan één type habitat. Voor roofinsecten die een rol spelen bij de natuurlijke bestrijding van plagen in de akkerbouw is een model ontwikkeld dat berekent hoe groot het relatieve belang is van elk habitat voor de instandhouding van de doelsoort en wat de optimale samenstelling van het landschap zou kunnen zijn. De kunst is om te zorgen dat er gedurende het jaar geen gaten vallen in de beschikbaarheid van essentiële hulpbronnen.

De leidende theorie in de landschapsecologie was tot voor kort de metapopulatietheorie die stelt dat lokale populaties in stand worden gehouden door voldoende grootte van en uitwisseling tussen fragmenten van geschikt habitat. In de praktijk blijken de voorwaarden voor deze theorie, zoals een onafhankelijke kans op uitsterven van subpopulaties, zich maar zelden voor te doen (Fronhofer et al., 2012). Een alternatieve ruimtelijke benadering van populaties biedt de landschapscompleteringstheorie (Dunning et al., 1992; Pope et al., 2000). Deze is gebaseerd op de aanname dat verschillende, voldoende nabijgelegen, habitats specifieke en essentiële hulpbronnen leveren (zoals prooien, nectar, beschutting, overwinteringsmogelijkheid) die nodig zijn voor de volbrenging van de levenscyclus van de betreffende soorten.

In de onderliggende studie in de Hoeksche Waard is de landschapscompleteringstheorie modelmatig uitgebouwd om de invloed van het landschap op de plaagbestrijding door belangrijke natuurlijke vijanden zoals zoöfage zweefvliegen te bestuderen (Holland et al., 2012). In het agrarisch gebied zijn deze soorten van meerdere habitats afhankelijk. Larven voeden zich met bladluizen in de gewassen, terwijl adulte zweefvliegen op zoek gaan naar nectar en pollen in andere habitats zoals akkerranden (Van Rijn & Wäckers, 2016). Maar ze zijn van nog meer habitats afhankelijk, omdat elk habitat slechts een deel van het seizoen de nodige hulpbronnen kan leveren (Van Rijn, 2014a).

## Werkwijze




Er is een dynamisch voedselwebmodel opgesteld met een habitatstructuur. De roverpopulatie bestaat uit meerdere stadia, waarbij het adulte stadium zichzelf en haar nakomelingen over de diverse habitats kan verdelen, afhankelijk van waar de hoogste fitness kan worden verkregen. De habitats zijn hiërarchisch gestructureerd: zo zijn luisrijke akkers en hun bloemrijke akkerranden verbonden via kleinschalig foerageergedrag, terwijl akkers en houtige habitats verbonden zijn via het grootschaliger dispersiegedrag. De habitats verschillen van elkaar in het type voedsel (bloemen of bladluizen) en in de periode waarin ze voedsel ter beschikking hebben (Van Rijn, 2014a; 2014b). Elk habitat heeft zijn eigen bladluissoort. In het (versimpelde) voorbeeld bestaat het landschap uit houtige elementen, twee akkerbouwgewassen (tarwe en aardappel) en kruidige elementen met bloemen in de vorm van akkerranden. De rovers overwinteren in houtige gewassen.

## Resultaten

In figuur 1 is een voorbeeld van de modeluitkomsten weergegeven in het geval dat alle genoemde habitats aanwezig zijn. Het landschap is 'compleet'. Gedurende het hele seizoen dat de rovers niet in winterrust zijn, zijn er prooien (bladluizen) aanwezig en gelijktijdig bloemen (als bron van nectar en stuifmeel) in de nabijheid. Aanvankelijk kan de roverpopulatie zich ontwikkelen op houtige gewassen (H1 in de figuur), waar bladluizen

**Dr. P.C.J. van Rijn**  
Instituut voor Biodiversiteit  
en Ecosysteem Dynamica  
(IBED), Universiteit van  
Amsterdam, Science Park  
904, 1098 XH Amsterdam  
P.C.J.vanRijn@uva.nl





te verwachten. Voor kruipende rovers gelden andere relaties. De modelanalyse onderstreept het belang van halfnatuurlijke landschapselementen voor natuurlijke plaagbestrijding en laat – in tegenspraak met de gangbare opvatting – tevens zien dat kruidige habitats zoals akkerranden het gebrek aan houtige habitats niet geheel kunnen compenseren. Beide zijn onmisbaar voor de instandhouding van natuurlijke vijanden.

Mogelijk kan het gebruik van dergelijke habitatgestructureerde populatiemodellen ook tot nieuwe inzichten leiden bij andere soortgroepen of ecosystemendiensten waar landschapscompletering een rol kan spelen. In alle gevallen is het van belang voldoende kennis te hebben over de specifieke biologie van de betreffende soorten. Ook moet duidelijk zijn welke habitats essentiële hulpbronnen bieden en in welke periode van het jaar ze dat doen.

**Figuur 2** effecten van het weglaten van habitats uit een 'compleet' landschap op de gemiddelde roverpopulatie (bovenste paneel) en bladluispopulaties in andere habitats (onderste paneel). Een kruis geeft aan dat de (hoofd)habitat ontbreekt.

**Figuur 3** invloed grootte houtig habitat in 'compleet' landschap op de gemiddelde grootte van de rover- en de bladluispopulaties (log-schaal). De sterkste plaagreductie treedt op bij circa 20% houtig habitat.

## Literatuur

Dunning, J.B., B.J. Danielson & H.R. Pulliam, 1992. Ecological processes that affect populations in complex landscapes. *Oikos* 65: 169-175.

Fronhofer, E.A., A. Kubisch, F.M. Hilker, T. Hovestadt & H.J. Poethke, 2012. Why are metapopulations so rare? *Ecology* 93: 1967-1978.

Holland J.M., H. Oaten, S. Moreby, T. Birkett, J. Simper, S. Southway & B.M. Smith, 2012. Agri-environmental scheme enhancing ecosystem services: a demonstration of improved biological control in cereal crops. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 155: 147-52.

Pope, S.E., L. Fahrig & N.G. Merriam, 2000. Landscape complementation and metapopulation effects on leopard frog populations. *Ecology* 81: 2498-2508.

Van Rijn, P.C.J. & F.L. Wäckers, 2016. Nectar accessibility determines fitness, flower choice and abundance of hoverflies that provide natural pest control. *Journal of Applied Ecology*, doi: 10.1111/1365-2664.12605.

Rijn, P.C.J. van, 2014a. Which shrubs and trees can conserve natural enemies of aphids in spring? *IOBC-WPRS Bulletin* 100: 137-141.

Rijn, P.C.J. van, 2014b. Biodiversiteit Voortgang Programma Hoeksche Waard 2012-2014: Effecten op vegetatie. Rapportage voor SHW, 20p.