

Papéis Avulsos de Zoologia

PAPÉIS AVULSOS ZOOL. S. PAULO, VOL. 22, ART. 7: 57-59

10.IX.1968

UMA NOVA ESPÉCIE DE *PHAETHORNIS* (AVES, TROCHILIIDAE)

ROLF GRANTSAU

ABSTRACT

A new species of *Phaethornis*, *maranhaoensis*, sp. n., is described based on a series of males collected at Imperatriz, Maranhão, Brazil. The new species is compared to *nattereri* and *idaliae*, its closest relatives.

Entre o material ornitológico coletado em uma expedição que realizei ao longo da Rodova Belém-Brasília em dezembro de 1966, encontra-se uma série de machos de uma espécie nova de *Phaethornis*, que descrevo abaixo. Estes exemplares foram coletados cêrca de 8 km ao sul de Imperatriz, em região arbustiva, com inúmeras ilhas de mata muito densa.

Phaethornis maranhaoensis, sp. n.

Holótipo, ♂ adulto, de Imperatriz, Maranhão, Brasil, 15.XII. 1966 (Grantsau n. 5307; no Departamento de Zoologia, São Paulo).

DESCRIÇÃO

Dorso da cabeça castanho escuro, costas e asas brilhantes, brônzeo-esverdeado; coberteiras superiores da cauda brônzeo-esverdeadas, com barras castanho-vermelhado claro. Rêmiges castanho-negro, com brilho purpúreo; ventre castanho-avermelhado, garganta e lados desta mais escuros que o ventre; superfície e faixa da garganta, assim como as coberteiras inferiores da cauda, ocre claro. Região do ouvido negro-castanha. Penas caudais brônzeo-esverdeado na metade basal, as médias brônzeo-esverdeado, exceto o ápice que é branco; as laterais com faixa negra larga, subterminal e ápices castanho claros; o par junto às médias também com ápices brancos. Parte superior do bico negra, parte inferior amarela com ápice escuro; pernas castanho-negras. Pêso, 2 g. Comprimento total, 109 mm; comprimento da asa, 44 mm; comprimento da cauda, 39 mm; comprimento do bico, 24 mm.

Fêmea desconhecida.

Rua Vicente de Carvalho 864, São Bernardo do Campo, São Paulo.
Trabalho elaborado com auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

Parátipos: 6 ♂♂ (n. 5308-5313) coletados junto com o holótipo (em minha coleção); 2 ♂♂ (Museu Nacional, Rio de Janeiro, n. 17987-17988), de São Bento, Maranhão, 10.IV e 13.IV.1923, E. Snethlage col.

Medidas (mínima, máxima e média, esta entre parênteses, em mm)

comprimento da asa	43 - 46	(44,1)
comprimento da cauda	39 - 43	(41,4)
comprimento do bico	23 - 26	(24,0)

Canto: "zag zag tib zib übo üb, zag zag zib zib zag zag zib zib übo üb ..."; o "übo üb" não é regularmente emitido, sendo frequentemente eliminado do canto. O canto da espécie foi gravado.



Fig. 1, *Phaethornis maranhaoensis*, sp. n., holótipo.

DISCUSSÃO TAXONÔMICA

A forma da cauda desta espécie nova é muito semelhante àquela da fêmea de *Phaethornis idaliae*, mas, como as penas caudais desta última são tôdas verde-escuro com ápices brancos, não é possível confundir as duas espécies. *P. maranhaoensis* também é muito parecida com *nattereri*, entretanto, como sua cauda difere tanto na forma como na cor, também entre estas duas espécies não pode haver confusão. *P. maranhaoensis*, além do mais, tem garganta mais escura e lados da garganta mais avermelhados. Um caráter certo para distinguir as duas espécies, são as coberteiras superiores da cauda brônzeo-esverdeadas com barra castanho-avermelhada em *maranhaoensis*, e uniformemente castanho-avermelha-

do em *nattereri*. A distância entre a ponta da pena caudal média e a próxima é de 13-17 mm em *nattereri*, e somente 9-10 mm na espécie nova (figs. 2 e 3).




Fig. 2, cauda do holótipo de *P. maranhaoensis*, sp. n.; fig. 3, cauda do macho adulto de *P. nattereri* (Santo Antonio, Cuiabá, Mato Grosso).

AGRADECIMENTOS

Pela permissão de estudo de material para comparação agradeço aos Drs. P. E. Vanzolini e H. F. de A. Camargo, do Departamento de Zoologia, São Paulo, e ao Dr. H. Sick, do Museu Nacional, Rio de Janeiro. Agradeço ainda ao Dr. H. Reichardt pela tradução e pelo preparo do manuscrito. Aos Sr. e Sra. Sarzier, que contribuíram para os bons resultados da excursão.

