Stellingen

behorende bij het proefschrift

Fetal non-cardiac thoracic and abdominal structural anomalies -conventional and colour coded Doppler ultrasound-

1. Intrathoracale cysteuze afwijkingen, geassocieerd met hydrops foetalis en een polyhydramnion, zijn suggestief voor congenitale cysteuze adenomatoïde malformatie van de long.

2. Het "double bubble" teken heeft een grote voorspellende waarde voor een duodenumobstructie en is in hoge mate geassocieerd met andere structurele en chromosomale afwijkingen.

3. Hoewel kleuren Doppler echoscopie de visualisatie van het foetale vaatsysteem vergemakkelijkt, is de waarde hiervan voor de prenatale diagnostiek van structurele afwijkingen vooralsnog beperkt.

4. Ook in ervaren handen is foetale chirurgie bij congenitale hernia diaphragmatica omstreden.

5. Electieve sectio caesarea verbetert de prognose van een foetus met een buikwanddefect niet.

6. Het strikte onderscheid tussen symmetrische en asymmetrische groeivertraging is arbitrair en kunstmatig.

7. Het poliklinisch routinematig inwendig onderzoeken van klachtenvrije zwangeren berust niet op evidence based medicine.

8. Bij voortijdig gebroken vliezen à terme heeft een expectatief beleid gedurende tenminste 48 uur de voorkeur en is medisch verantwoord.