

Papéis Avulsos de Zoologia

MUSEU DE ZOOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ISSN 0031-1049

PAPÉIS AVULSOS ZOOL., S. PAULO, 36(16): 169-170

20.X.1985

NOTHOBACHIA ABLEPHARA: CORREÇÃO DA LOCALIDADE TIPO E NOTA SOBRE EXEMPLARES ADICIONAIS (SAURIA, TEIIDAE)

MIGUEL TREFAUT RODRIGUES

Descrevi o gênero *Nothobachia* Rodrigues, 1984, para alojar a nova espécie *N. ablephara*, caracterizada principalmente pela ausência de pálpebra e de ouvido externo, tendo como localidade tipo São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. No rótulo do exemplar constava como coletor "Fundação Ruralista", uma entidade de apoio ao homem do campo.

Poucos meses atrás vim a encontrar casualmente o coletor do holótipo, Padre Lira Parente, da Fundação Ruralista de São Raimundo Nonato, que identificou com precisão a localidade tipo e conseguiu mais uma série de seis espécimes. Nesta nota corrijo a localidade tipo e forneço dados sobre os novos espécimes.

A localidade tipo de *Nothobachia ablephara*

Tanto o holótipo como os novos espécimes foram coletados em uma das áreas de trabalho da Fundação Ruralista de São Raimundo Nonato, situada em Sal, um vilarejo (09°11'S, 42°03'W) a aproximadamente 80 km a sudeste da sede do município. Segundo informações do coletor a paisagem local é de caatinga e os lagartos, abundantes na área, foram encontrados no chão, entre madeiras velhas amontoadas.

Exemplares adicionais

Os novos espécimes concordam muito bem em escamação e no padrão de colorido com a descrição original. A tabela abaixo mostra as medidas e dados merísticos relevantes. A concordância em foliose cefálica e número de poros pré-anais dos machos (3/3) é perfeita. A única diferença que merece destaque é uma anomalia nos pares de mentais mostrada pelo exemplar 63456. Ao contrário dos demais, que apresentam dois pares de mentais em contato na linha mediana, ele tem apenas um escudo no lado direito, resultante da fusão dos gulares direitos do primeiro e segundo par; no esquerdo os mentais são iguais aos dos demais espécimes.

Os novos exemplares também concordam com o parátipo em apresentar invariavelmente dois dedos nos membros posteriores, ao contrário do holótipo,

que tem dois no esquerdo, mas apenas um no direito. Este tipo de variação, aparentemente não devida a mutilação, já foi constatada em outros microteídeos adaptados à vida subterrânea (Dixon, 1973).

Nothobachia ablephara
Sal, Plaúf

MZUSP	Sexo	Comprimento		Dorsais	Ventrals	Cinta	Gulares
		corpo	cauda				
63549	♂	38	51	43	33	21	8
63547	♂	42	—	43	34	20	8
63548	♀	37	46	46	35	21	8
63546	♀	51	—	46	35	20	7
63545	♀	52	—	44	36	21	7
63550	♀	54	—	46	37	20	8

REFERÊNCIAS

- Dixon, J.R., 1973. A systematic review of the teiid lizards, genus *Bachia*, with remarks on *Heterodactylus* and *Anotosaura*. Misc. Publ. Univ. Kansas Mus. Nat. Hist. 57: 47 pp.
- Rodrigues, M. T., 1984. *Nothobachia ablephara*: novo gênero e espécie do nordeste do Brasil (Sauria, Teiidae). Papéis Avulsos Zool., S. Paulo 35 (28): 361-366.