

Situação: O preprint foi submetido para publicação em um periódico

Acessibilidade aos serviços de saúde e posição dos usuários no espaço social em Salvador, Bahia, 2006: um estudo transversal

Daiane Celestino Melo, Ligia Maria Vieira-da-Silva, Alcione Brasileiro Oliveira Cunha, Maria da Conceição Nascimento Costa, Shirley Andrade Cruz

<https://doi.org/10.1590/s1679-49742021000200021>

Este preprint foi submetido sob as seguintes condições:

- O autor submissor declara que todos os autores responsáveis pela elaboração do manuscrito concordam com este depósito.
- Os autores declaram que estão cientes que são os únicos responsáveis pelo conteúdo do preprint e que o depósito no SciELO Preprints não significa nenhum compromisso de parte do SciELO, exceto sua preservação e disseminação.
- Os autores declaram que a pesquisa que deu origem ao manuscrito seguiu as boas práticas éticas e que as necessárias aprovações de comitês de ética de pesquisa estão descritas no manuscrito, quando aplicável.
- Os autores declaram que os necessários Termos de Consentimento Livre e Esclarecido de participantes ou pacientes na pesquisa foram obtidos e estão descritos no manuscrito, quando aplicável.
- Os autores declaram que a elaboração do manuscrito seguiu as normas éticas de comunicação científica.
- Os autores declaram que o manuscrito não foi depositado e/ou disponibilizado previamente em outro servidor de preprints ou publicado em um periódico.
- O autor submissor declara que as contribuições de todos os autores estão incluídas no manuscrito.
- O manuscrito depositado está no formato PDF.
- Os autores declaram que caso o manuscrito venha a ser postado no servidor SciELO Preprints, o mesmo estará disponível sob licença [Creative Commons CC-BY](#).
- Caso o manuscrito esteja em processo de avaliação ou sendo preparado para publicação mas ainda não publicado por um periódico, os autores declaram que receberam autorização do periódico para realizar este depósito.

Submetido em (AAAA-MM-DD): 2021-03-02

Postado em (AAAA-MM-DD): 2021-03-02



Como citar este artigo:

Melo DC, Vieira-da-Silva LM, Cunha ABO. Acessibilidade aos serviços de saúde e posição dos usuários no espaço social em Salvador, Bahia, 2006: um estudo transversal. *Epidemiol Serv Saude* [preprint]. 2021 [citado 15 fev. 2021]:[19 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1679-49742021000200021>

Artigo original

Acessibilidade aos serviços de saúde e posição dos usuários no espaço social em Salvador, Bahia, 2006: um estudo transversal*

Accessibility to health services and position of users in the social space in Salvador, Bahia, Brazil, 2006: a cross-sectional study

Accesibilidad a los servicios de salud y posición de los usuarios en el espacio social en Salvador, Bahía, Brasil, 2006: un estudio transversal

Daiane Celestino Melo¹ - orcid.org/0000-0002-0791-8100

Ligia Maria Vieira-da-Silva¹ - orcid.org/0000-0003-2518-411X

Alcione Brasileiro Oliveira Cunha¹ - orcid.org/0000-0003-4426-4254

Maria da Conceição Nascimento Costa¹ - orcid.org/0000-0001-7275-4280

Shirley Andrade Cruz² - orcid.org/0000-0003-2318-6656

¹Universidade Federal da Bahia, Instituto de Saúde Coletiva, Salvador, BA, Brasil

²Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador, BA, Brasil

Endereço para correspondência:

Daiane Celestino Melo – Universidade Federal da Bahia, Instituto de Saúde Coletiva, Rua Basílio da Gama, s/n, Campus Universitário, Canela, Salvador, BA, Brasil. CEP: 40110-040

E-mail: daianecelestino@hotmail.com

*Manuscrito originado da dissertação de Mestrado intitulada ‘Acessibilidade aos serviços de saúde e posição no Espaço Social de usuários da rede básica em uma Capital do nordeste do Brasil’, defendida por Daiane Celestino Melo junto ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia em 2016. Financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): Processo CNPq nº 401961/2005-2.

Recebido em 13/07/2020

Aprovado em 05/10/2020

Editor associado: Bruno Pereira Nunes - orcid.org/0000-0002-4496-4122

Resumo

Objetivo: Analisar a associação entre posição social e acesso aos serviços de saúde.

Métodos: Estudo transversal em unidades da rede básica de saúde de Salvador, Bahia, Brasil, onde foi implementado um plano para melhorar a acessibilidade. Empregou-se teste qui-quadrado de Pearson e regressão logística. **Resultados:** Participaram 467 usuários, dos quais 75,6% não concluíram o ensino médio, 78,7% tinham renda inferior a dois salários mínimos e 51,8% exerciam ocupações intermediárias/qualificadas. Renda baixa associou-se a chegar na unidade de saúde na noite anterior ou antes das 8h (*odds ratio* = 2,09 – IC_{95%} 1,13;3,87) e dispende mais tempo para marcar consulta (*odds ratio* = 2,13 – IC_{95%} 1,05;4,31). Ocupação elementar associou-se ao agendamento presencial da consulta (*odds ratio* = 1,68 – IC_{95%} 1,14;2,45). Escolaridade e trajetória social não mostraram associação significativa com utilização de serviços de saúde. **Conclusão:** Permaneceram desigualdades sociais no acesso aos serviços após intervenção para melhoria da acessibilidade.

Palavras-chave: Acesso aos Serviços de Saúde; Atenção Primária à Saúde; Disparidades nos Níveis de Saúde; Estudos Transversais.

Abstract

Objective: To analyze the association between social position and access to health services. **Methods:** Cross-sectional study in selected health units of Salvador, Bahia, Brazil. Pearson's chi-square test and logistic regression were used. **Results:** 467 users participated, 75.6% did not finish high school; 78.7% had <2 minimum wages; 51.8% had intermediate/qualified occupations. Low income was associated with arriving at the health unit the night before or before 8 am. (odds ratio = 2.09 – 95%IC 1.13;3.87) and spend more time making an appointment (odds ratio = 2.13 – 95%IC 1.05;4.31). Elementary occupation was associated with scheduling with face-to-face appointment scheduling (odds ratio = 1.68 – 95%IC 1.14;2.45). Education and social trajectory showed no significant association with the use of health services. **Conclusion:** Social inequalities in access to services remained after intervention to improve accessibility.

Keywords: Health Services Accessibility; Primary Health Care; Health Status Disparities; Cross-Sectional Studies.

Introdução

A busca pela redução das desigualdades em saúde tem sido uma diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS),¹ incorporada por diversos países, ainda que de forma insuficiente.²⁻⁴ Embora suas principais causas sejam sociais, a oferta acessível de serviços de saúde de qualidade continua a ser destacada como importante ação para a redução dessas desigualdades.⁴

Algumas iniciativas relacionadas à expansão da cobertura assistencial e melhoria da acessibilidade aos serviços de saúde vêm sendo implementadas, em diferentes contextos nacionais, apresentando resultados diferenciados. Conclui-se, desses resultados, não ser o bastante ampliar a oferta para facilitar o acesso. Na Suécia, por exemplo, mostrou-se um efeito paradoxal: uma reforma pela livre escolha na Atenção Primária à Saúde, ao

ampliar a oferta, veio a beneficiar grupos de maior renda, aumentando as desigualdades sociais no país.^{3,5} No Brasil, a expansão da cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) tem sido relacionada à redução da mortalidade infantil em regiões com piores indicadores sociais.⁶ Progressos na utilização dos serviços e melhoria da acessibilidade, a partir da adoção de práticas de acolhimento e reorganização do processo de trabalho, também são relatados em algumas cidades brasileiras.⁷⁻¹⁰

Embora existam vários estudos avaliativos dessas intervenções e outros, sobre barreiras à utilização dos serviços de saúde pelos usuários,¹⁰⁻¹³ poucos analisaram a influência de desigualdades sociais sob situações concretas, em unidades de saúde-alvo de intervenções para a melhoria de sua acessibilidade. Em outras palavras, pergunta-se: programas universais, voltados para melhoria do acesso à Saúde, são utilizados igualmente por pessoas de diferentes grupos sociais?

A resposta a essa indagação requer investigação nos diversos níveis do sistema de saúde, diante da complexidade das intervenções sanitárias. Se as análises de âmbito nacional são necessárias para uma visão de larga escala, avaliações locais permitem uma compreensão em maior profundidade, a partir da observação de intervenções específicas, particularmente sobre o componente sócio-organizacional da acessibilidade.¹⁴

Em Salvador, estado da Bahia, a Secretaria Municipal de Saúde elaborou, em junho de 2005, um projeto visando melhorar a acessibilidade e aperfeiçoar o acolhimento ao usuário da Atenção Básica na principal cidade baiana. Entre outros objetivos, o projeto em questão visava extinguir filas evitáveis, implantar o agendamento de consultas e reorientar o fluxo de pacientes.¹⁵ No ano seguinte, uma avaliação da implantação do mesmo projeto revelou melhoria no acesso às unidades da rede básica de saúde, especialmente na redução de filas evitáveis e do tempo de espera para marcação de consultas. Contudo, naquelas mesmas unidades, alguns usuários não se beneficiavam das medidas adotadas e continuavam a ter dificuldades de acesso aos serviços.¹⁶ Decorridos 13 anos desde a intervenção citada, o problema da desigualdade social no acesso permanece.

Muito embora iniciativas voltadas à superação dessas barreiras tenham-se implementado, raros estudos avaliaram a persistência das desigualdades após a consecução de programas especialmente desenhados para a extinção das filas e a

redução dos tempos de espera por atendimento, com a abrangência territorial da referida experiência. As evidências aqui produzidas sobre as possibilidades e limites desse tipo de intervenção sanitária poderão contribuir para o aperfeiçoamento das políticas e ações de saúde voltadas para a melhoria do acesso.

O presente artigo teve o objetivo de suprir, ainda que parcialmente, as lacunas assinaladas, e analisar a associação entre a posição no espaço social e o acesso aos serviços entre usuários de unidades da rede básica de saúde onde foi implementado um plano para melhoria da acessibilidade e humanização do acolhimento ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

Métodos

Trata-se de um estudo transversal, abrangendo usuários de unidades da rede básica de saúde de Salvador, Bahia, onde foi implantado um amplo projeto de intervenção intitulado ‘Acolhimento na atenção básica em Salvador, BA: plano para melhoria da acessibilidade e humanização do acolhimento’.¹⁵

Em 2007, Salvador contava com 419 estabelecimentos de saúde (unidades básicas, especializadas e serviços de emergência), sendo 38% públicos, 6% filantrópicos e 56% privados/lucrativos.¹⁷ A cobertura da Atenção Básica em dezembro de 2007 era de 34%, segundo o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS).¹⁸

A intervenção para melhorar a acessibilidade e humanizar o acolhimento ocorreu em 2005, em todas as 103 unidades da Atenção Básica do município, e consistiu na implantação de sistema de marcação permanente de consultas, presencial ou por telefone, e na implantação de lista de espera, visando extinguir as filas e viabilizar atendimentos no mesmo dia da procura. Posteriormente, foram incluídas outras ações para qualificar o atendimento ao usuário.¹⁹

O impacto dessas ações foi avaliado em junho de 2006, mediante um inquérito entre usuários de unidades da rede básica de saúde.¹⁶ Estimou-se em 600 o número total de usuários a serem incluído no inquérito, considerando-se uma proporção máxima de 0,50, precisão de 0,02 e poder de 0,80; e definindo-se um intervalo de confiança de 95%

(IC_{95%}). Ao valor encontrado, foram acrescidos 20% para compensar perdas, totalizando 720 usuários. Logo, foram entrevistados 740 usuários, porém 30 entrevistas foram descartadas devido a incompletude dos dados, resultando em uma amostra final de 710 usuários, dos quais 467 oriundos das dez unidades de saúde onde a intervenção fora completamente implantada. A seleção dos usuários foi realizada a partir do número total de atendimentos por unidade de saúde em 2005, mediante amostragem aleatória simples, sem reposição, com alocação proporcional à capacidade de atendimento de cada unidade. Todos os 467 entrevistados constituíram a população a ser analisada. Não foi encontrada diferença no poder das duas amostras: (i) a amostra de 710 usuários do estudo anterior, do qual foi extraída (ii) a amostra de 467 usuários das unidades de saúde abordadas no presente estudo. Tampouco observou-se discrepância entre as principais características sociodemográficas dos usuários que constituíram ambas amostras, elas foram razoavelmente similares.

Considerou-se como ‘acessibilidade’ o leque de características das unidades de saúde que permitem a elas serem mais facilmente utilizadas pelos usuários do sistema, conforme definição de Avedis Donabedian.¹⁴ Já o ‘espaço social’, definido por Bourdieu, é o das relações entre agentes sociais, no caso os usuários da rede básica de saúde de Salvador que ocupam diferentes posições na sociedade, de acordo com a quantidade e composição das diferentes espécies de capitais próprias desses indivíduos, em particular o capital econômico e o capital cultural, bem como sua trajetória social.²⁰ As categorias ‘capital cultural’ e ‘capital econômico’ foram aferidas de forma aproximada, pautadas na escolaridade e na renda familiar respectivamente. Para estimar o capital cultural, foram propostas questões sobre o nível de escolaridade do usuário, de seus pais e de seu cônjuge. As diferentes escolaridades foram agrupadas em duas categorias: médio-baixa, para aqueles que haviam cursado o ensino fundamental incompleto ou completo e os que tinham o ensino médio incompleto; e alta, para os que concluíram o ensino médio e aqueles com ensino superior incompleto, completo ou mais.

A trajetória social foi obtida da comparação da escolaridade do usuário com a de sua família. Das respostas sobre os níveis de escolaridade da mãe e do pai, selecionou-se o maior, para a categoria ‘escolaridade familiar’. Assim, a trajetória social foi classificada da seguinte forma: ascendente (escolaridade do usuário maior que a escolaridade

familiar); estável (escolaridade do usuário igual à escolaridade familiar); e descendente (escolaridade do usuário menor que a escolaridade familiar). Posteriormente, as categorias ‘descendente’ e ‘estável’ foram unificadas por não discriminarem – suficientemente bem – essas diferenças, devido à relativa homogeneidade social da amostra.

O capital econômico foi definido a partir da renda mensal familiar dos usuários das unidades da rede básica de saúde, estratificada pelo número de salários mínimos recebidos: capital econômico alto/médio (para usuários com renda familiar mensal a partir de dois salários mínimos); e baixo (para aqueles com renda familiar mensal inferior a dois salários mínimos). Cumpre observar que em 2006, o valor do salário mínimo no Brasil era de R\$350,00.

As ocupações informadas pelos usuários, assim como as ocupações de seu pai, mãe e cônjuge, foram codificadas segundo a Classificação Brasileira de Ocupações em sua versão de 2002, e agrupadas conforme Santos,²¹ com as devidas adaptações: empregados qualificados; trabalhadores; trabalhadores elementares; por conta-própria; precários; empregados domésticos; empregados especialistas; supervisores; estudantes e estagiários; ‘do lar’ (trabalho doméstico não remunerado); e nunca trabalhou. Estas ocupações foram reagrupadas em duas categorias sócio-ocupacionais: categoria elementar (empregado doméstico; por conta-própria; precário; trabalhador elementar); e categorias intermediária e qualificada (empregado qualificado; empregado especialista; supervisor). Para a categoria sócio-ocupacional dos estudantes/estagiários, do lar ou que nunca haviam trabalhado, considerou-se o capital escolar. Assim, os indivíduos com escolaridade médio-baixa foram inseridos na categoria ocupacional elementar, e aqueles com escolaridade alta integraram a categoria ocupacional intermediária/qualificada. Alguns usuários não souberam informar a escolaridade da mãe; nestes casos, a informação foi inferida pela categoria sócio-ocupacional do pai do usuário.

As variáveis relacionadas à acessibilidade ao serviço de saúde foram: hora de chegada à unidade (não pegou fila e horário administrativo; na noite anterior ou até as 8h da manhã); forma de marcação da consulta (por profissional da unidade ou por telefone ou por lista de espera; presencial); tempo de espera para marcação da consulta (não esperou ou esperou até 15 minutos; esperou de 15 minutos até mais que 1 hora); e tempo

transcorrido desde o agendamento até a realização da consulta (no mesmo dia ou até 2 semanas; entre 3 semanas e mais que 1 mês).

Procedeu-se a análise descritiva uni e bivariada, mediante distribuição de frequências das variáveis sociodemográficas e das variáveis de acesso segundo a posição socioeconômica do indivíduo (escolaridade, renda, ocupação e trajetória social). Para verificar possíveis diferenças entre os grupos, foi aplicado o teste qui-quadrado de Pearson. A associação entre as variáveis de posição socioeconômica e acesso foi verificada pela razão de prevalências (RP) e seus respectivos intervalos de confiança de 95% – IC_{95%} –, estimados em função da *odds ratio* (OR), por regressão logística bivariada. Adotou-se o nível de significância de 5%.

O projeto do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (CEP/ISC/UFBA): Pareceres nº 046/2005 e nº 1.023.121/2015. Todas as entrevistas foram realizadas após os participantes assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Resultados

Entre os 467 usuários de unidades da rede básica de saúde onde se havia implantado o projeto de intervenção, 77,3% eram do sexo feminino, 64,7% tinham de 20 a 49 anos de idade, 60,4% eram casados/conviventes, 75,6% não haviam concluído o ensino médio e 78,7% tinham renda familiar inferior a dois salários mínimos; 71,1% estavam desempregados e 51,8% tinham ocupações intermediárias ou qualificadas (Tabela 1).

A Tabela 2 apresenta a distribuição dos usuários de acordo com as características de posição no espaço social e indicadores de utilização dos serviços de saúde. Observou-se que um capital econômico médio-alto foi associado a maior acesso aos serviços, principalmente a hora de chegada na fila ($p=0,017$), tempo de espera ($p=0,032$) e tempo de agendamento ($p=0,048$). Possuir uma ocupação intermediária ou qualificada foi uma condição sócio-ocupacional associada à marcação da consulta por telefone,

presencialmente na unidade de saúde, ou mediante inscrição em lista de espera ($p=0,007$).

Possuir capital econômico baixo associou-se ao dobro da chance de o usuário esperar em fila ($OR=2,09 - IC_{95\%} 1,13;3,87$) e de chegar na unidade de saúde na noite anterior ou antes das 8 horas da manhã, e ainda, de aguardar mais tempo para marcação da consulta ($OR=2,13 - IC_{95\%} 1,05;4,31$). O fato de o usuário se encontrar na categoria de ocupação elementar associou-se a marcar a consulta de forma presencial ($OR=1,68 - IC_{95\%} 1,14;2,45$), quando comparado ao usuário exercendo ocupação intermediária ou qualificada; e portanto, sem ter utilizado as demais opções de marcação disponibilizadas pela intervenção para um melhor acesso à unidade básica de saúde. Não foram encontradas associações significativas entre os indicadores de utilização dos serviços de saúde, quando consideradas a escolaridade e a trajetória social dos usuários (Tabela 3).

Discussão

Os resultados do presente estudo revelaram que entre os usuários das unidades da rede básica de saúde onde foi realizada a intervenção para melhoria da acessibilidade, não houve diferenças significativas na utilização dos serviços, quando foram consideradas sua escolaridade e trajetória social. Porém, aqueles de baixa renda apresentaram chances maiores de dispendar mais tempo para obter acesso, em relação à hora de chegada na unidade, tempo para agendamento e espera pela consulta. Exercer uma ocupação classificada como elementar também foi um fato associado à marcação de consultas de forma presencial. Ou seja, apesar da implantação de um projeto especificamente voltado para a melhoria da acessibilidade, persistem em Salvador desigualdades no acesso aos serviços da Atenção Básica e a outros serviços de saúde, no que diz respeito a renda e ocupação.

Esses achados podem estar relacionados às características da população estudada, bastante homogênea quanto ao perfil sociodemográfico, e são consistentes com os de outros trabalhos similares: predominância do sexo feminino, baixa renda e baixa escolaridade.^{22,23}

Possivelmente, a ausência de diferença estatisticamente significativa entre o nível de escolaridade dos usuários, sua trajetória social e a utilização dos serviços de saúde, a exemplo do que se verifica em outras pesquisas, decorreu da relativa homogeneidade da amostra quando analisada sob esses fatores.

As diferenças encontradas entre os usuários de baixa renda (menos de dois salários mínimos), em relação à hora de chegada na unidade, tempo de espera e tempo de agendamento da consulta, podem ser explicadas tanto por questões objetivas como pela escassez de recursos financeiros para transporte, além de outras razões, de ordem subjetiva, relacionadas ao chamado '*habitus* de necessidade'.²⁰ Este conceito, desenvolvido por Bourdieu, pode explicar diversas práticas das classes populares que priorizam o que é certo e seguro.

Dormir na fila e chegar antes da abertura do posto, apesar de poder conseguir uma consulta no horário administrativo, pode resultar ou de uma decisão movida pela pequena autonomia frente ao trabalho ou pela otimização do tempo disponível ou simplesmente pelo desconhecimento da existência da facilidade no agendamento implantada.

Essa relação entre o nível de renda e a melhor utilização dos serviços de saúde tem sido evidenciada em outros estudos, tanto em escala nacional, a exemplo das análises de Cambota & Rocha para as macrorregiões e estados do país²⁴ e de Andrade et al. para as macrorregiões,²⁵ como metropolitana, na investigação de Barata sobre a região metropolitana de São Paulo.²⁶

Já o pertencimento a uma categoria sócio-ocupacional intermediária ou qualificada pode influir em maior renda e escolaridade, ampliação das redes sociais, além de provocar outros efeitos importantes, como o aumento do capital simbólico de reconhecimento. Tudo isso, associado a uma trajetória social ascendente, pode estar relacionado com a maior normatividade²⁷ dessas pessoas, e assim explicar o melhor uso observado das facilidades introduzidas: marcação de consultas por telefone, presencialmente ou em lista de espera, e outras formas.

A relação já estabelecida entre trabalho e acesso aos serviços de saúde,^{24,28} também encontrada na população estudada, pode revelar mais do que uma incompatibilidade entre o horário de funcionamento do serviço e o horário disponível para o usuário

empregado. Ela também pode se dever ao fato de o SUS ser a única alternativa assistencial para os desempregados.

A análise da amostra de usuários da rede básica de saúde, participantes deste estudo, revelou uma pequena diferenciação interna entre seus participantes, a despeito de majoritariamente, serem classificados como pertencentes a categorias socioocupacionais intermediárias e qualificadas. Assim, ocupar uma posição no espaço social definida por um maior volume de capital econômico, e exercer ocupação classificada como intermediária ou qualificada, influenciou positivamente na utilização dos rearranjos organizacionais introduzidos pelo programa e, conseqüentemente, assegurou melhor acesso.

O presente estudo traz elementos para a discussão acerca da potencialidade e dos limites de intervenções focadas na dimensão sócio-organizacional da acessibilidade aos serviços de saúde. Ademais, revela-se um nó crítico no acesso à Atenção Básica em Saúde, no caso observado: as filas para marcação de consultas. Diferentemente de iniciativas recentes e relevantes, indutoras de modificações mediante avaliação, a exemplo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), o projeto para melhoria da acessibilidade na rede básica de saúde de Salvador implantou e monitorou mudanças. Seus resultados apontam que a melhoria da acessibilidade e a redução das barreiras na utilização dos serviços de saúde requerem ações específicas, focadas em grupos mais vulneráveis, mesmo no interior das classes populares. Eles também corroboram conclusões de estudos anteriores: não se reduzem desigualdades unicamente com intervenções sobre os serviços de saúde e sim também, ainda que parcialmente, com ações que extrapolam o setor, políticas econômicas e sociais.^{29,30} A incipiente produção científica, no que concerne à avaliação de intervenções promotoras da acessibilidade à saúde e da influência das desigualdades sociais, reflete, outrossim, a escassez dessas intervenções específicas, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual ou nacional.

A extrapolação dos achados aqui apresentados deve ser cautelosa, haja vista referir-se a um único município e sua amostra não ter base populacional, pois foram entrevistados somente usuários que procuraram e tiveram acesso aos serviços de saúde da rede básica. Como os dados apresentados resultaram de um estudo transversal, não é possível estabelecer relação de temporalidade. Não obstante o tempo decorrido, a intervenção

avaliada representa um caso exemplar, a ser observado em seu tempo histórico, capaz de contribuir para o monitoramento de programas de redução das desigualdades no acesso à Atenção Básica em Saúde e seu aperfeiçoamento.

Sem descuidar da busca pela melhoria da qualidade e da efetividade das ações de saúde, a adoção de estratégias direcionadas à discriminação positiva pode diminuir as iniquidades em saúde e favorecer a utilização dos serviços por parte dos usuários mais desprovidos de recursos econômicos e culturais. Eis uma medida importante para o cumprimento de um direito garantido pela Constituição de 1988, o acesso universal à saúde, sobretudo em uma conjuntura de ajuste fiscal e cortes orçamentários na Saúde Pública.

Contribuição das autoras

Melo DC contribuiu para a concepção e planejamento, análise e interpretação dos dados e redação do artigo. Vieira-da-Silva LM contribuiu para a concepção e planejamento, análise dos dados e revisão crítica do conteúdo. Cunha ABO contribuiu para a concepção e planejamento, e revisão crítica do manuscrito. Costa MCN e Cruz SA contribuíram para a análise e interpretação dos dados, e revisão crítica do manuscrito. Todas as autoras aprovaram a versão final do manuscrito e são responsáveis por sua precisão e integridade.

As autoras declaram não existir conflitos de interesse.

Referências

1. Comissão para os Determinantes Sociais da Saúde. Redução das desigualdades no período de uma geração: igualdade na saúde através da ação sobre os seus determinantes sociais: relatório final da Comissão para os Determinantes Sociais da Saúde [Internet]. Portugal.; 2010 [citado 10 mar. 2016]. 276 p. Disponível em: <http://cmdss2011.org/site/wp-content/uploads/2011/07/Redução-das-Desigualdades-no-período.pdf>
2. Paim JS, Travassos CMR, Almeida CM, Bahia L, Macinko J. The Brazilian health system: history, advances, and challenges. *Lancet*. 2011 May 21;377(9779):1778-97. doi: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60054-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60054-8).
3. Burström B, Burström K, Nilsson G, Tomson G, Whitehead M, Winblad U. Equity aspects of the primary health care choice reform in Sweden – a scoping review. *Int*

- J Equity Health. 2017 Jun 28;16(29). doi: <https://doi.org/10.1186/s12939-017-0524-z>.
4. Marmot M, Allen J, Bell R, Goldblatt P. Building of the global movement for health equity: from Santiago to Rio and beyond. *Lancet*. 2012 Jan 14;379(9811):181-8. doi: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)61506-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61506-7).
 5. Jahromi VK, Dehnavieh R, Mehrolhassani MH, Anari HS. Access to healthcare in urban family physician reform from physicians and patients perspective: a survey-based project in two pilot provinces in Iran. *Electron Physician*. 2017 Jan 25;9(1):3653-9. doi: <http://dx.doi.org/10.19082/3653>. eCollection 2017 Jan.
 6. Aquino R, Oliveira N, Barreto ML. Impact of the family health program on infant mortality in Brazilian municipalities. *Am J Public Health*. 2009 Jan;99(1):87-93. doi: <https://doi.org/10.2105/ajph.2007.127480>.
 7. Lopes AS, Vilar RLA, Melo RHV, Franca RCS. O acolhimento na atenção básica em saúde: relações de reciprocidade entre trabalhadores e usuários. *Saude Debate*. 2015;39(104):114-23. doi: <https://doi.org/10.1590/0103-110420151040563>.
 8. Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Reorganização do processo de trabalho: acolhimento à demanda espontânea [Internet]. São Paulo: SMS; 2015 [citado 10 mar. 2016]. 30 p. Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Reorganizacao%20do%20Processo%20de%20Trabalho_At-Basica_V1_out-2016_baixa.pdf
 9. Monteiro JS. Avaliação do acolhimento na unidade de saúde da família Sítio do Cardoso, Madalena-Recife/ PE. *Re Epidemiol Controle Infec*. 2013;3(1):1-5. doi: <http://dx.doi.org/10.17058/reci.v3i1.2701>.
 10. Boccolini CS, Boccolini PMM, Damacena GN, Ferreira APS, Szwarcwald CL. Fatores associados à discriminação percebida nos serviços de saúde do Brasil: resultados da pesquisa nacional de saúde, 2013. *Cienc Saude Colet*. 2016;21(2):371-8. doi: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015212.19412015>.
 11. Lima SAV, Silva MRF, Carvalho EMF, Pessoa EAC, Brito ESV, Braga JPR. Elementos que influenciam o acesso à atenção primária na perspectiva dos profissionais e dos usuários de uma rede de serviços de saúde do Recife. *Physis*. 2015;25(2):635-56. doi: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312015000200016>.
 12. Mendes ACG, Miranda GMD, Figueiredo KEG, Duarte PO, Furtado B. Acessibilidade aos serviços básicos de saúde: um caminho ainda a percorrer. *Cienc Saude Colet*. 2012;17(11):2903-12. doi: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012001100007>.
 13. Sousa FOS, Medeiros KR, Gurgel Júnior GD, Albuquerque PC. Do normativo à realidade do Sistema Único de Saúde: revelando barreiras de acesso na rede de cuidados assistenciais. *Cienc Saude Colet*. 2014;19(4):1283-93. doi: <https://doi.org/10.1590/1413-81232014194.01702013>.
 14. Donabedian A. Los espacios de la salud: aspectos fundamentales de la organización de la atención médica. México, DF: Fondo de Cultura Económica; 772 p. 1988.
 15. Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Acolhimento na atenção básica em Salvador: plano para melhoria da acessibilidade. Salvador: SMS; 2005.

16. Vieira-da-Silva LM, Chaves SCL, Esperidião MA, Lopes-Martinho RM. Accessibility to primary healthcare in the capital city of a northeastern state of Brazil: an evaluation of the results of a programme. *J Epidemiol Community Health*. 2010;64(12):1100-5. doi: <http://dx.doi.org/10.1136/jech.2009.097220>.
 17. Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Relatórios técnicos do plano de acolhimento e melhoria da acessibilidade 2005-2008. Salvador: SMS; 2008.
 18. Ministério da Saúde (BR). *Secretaria de Atenção Primária à Saúde*. Cobertura da Atenção Básica [Internet]. 2017 [citado 10 mar. 2016]. Disponível em: <https://egestorab.saude.gov.br/paginas/ acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml>
- Vieira-da-Silva LM, Esperidião MA, Viana SV, Alves VS, Lemos DVS, Caputo MC, et al. Avaliação da implantação de programa voltado para melhoria da acessibilidade e humanização do acolhimento aos usuários na rede básica Salvador, 2005-2008. *Rev Bras Saude Matern Infant*. 2010;10(Suppl1):131-43. doi: <https://doi.org/10.1590/S1519-38292010000500012>.
19. Bourdieu P. Razões Práticas: Sobre a teoria da ação. Campinas, SP: Papyrus; 1997.
 20. Santos JAF. Uma classificação socioeconômica para o Brasil. *Rev Bras Cienc Soc*. 2005;20(58):27-45. doi: <https://doi.org/10.1590/S0102-69092005000200002>.
 21. Ribeiro MCSA, Barata RB, Almeida MF, Silva ZP. Perfil sociodemográfico e padrão de utilização de serviços de saúde para usuários e não-usuários do SUS—PNAD 2003. *Cienc Saude Colet*. 2006;11(4):1011-22. doi: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232006000400022>.
 22. Paskulin LMG, Valer DB, Vianna LAC. Utilização e acesso de idosos a serviços de atenção básica em Porto Alegre (RS, Brasil). *Cienc Saude Colet*. 2011;16(6):2935-44. doi: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000600031>.
 23. Cambota JN, Rocha FF. Determinantes das desigualdades na utilização de serviços de saúde: análise para o Brasil e regiões. *Pesqui Planej Econ* [Internet]. 2015 [citado 15 fev. 2021];45(2):219-43. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6008/1/PPE_v45_n02_Determinantes.pdf
 24. Andrade MV, Noronha KVMS, Menezes RM, Souza MN, Reis DR, Martins DR, et al. Desigualdade socioeconômica no acesso aos serviços de saúde no Brasil: um estudo comparativo entre as regiões brasileiras em 1998 e 2008. *Econ Aplicada*. 2013;17(4):623-45. doi: <https://doi.org/10.1590/S1413-80502013000400005>.
 25. Barata RB. Acesso e uso de serviços de saúde: considerações sobre os resultados da Pesquisa de Condições de Vida 2006. *Sao Paulo Perspec* [Internet]. 2008 [citado 15 fev. 2021];22(2):19-29. Disponível em: http://produtos.seade.gov.br/produtos/spp/v22n02/v22n02_02.pdf
 26. Vieira-da-Silva L, Nogueira R. Saúde e espaço social. In: Nogueira RP, organizador. *Determinação social da saúde e reforma sanitária*. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Estudos de Saúde; 2010. p. 180-200.
 27. Miquilin IOC, Marín-León L, Monteiro MI, Corrêa Filho HR. Desigualdades no acesso e uso dos serviços de saúde entre trabalhadores informais e desempregados: análise da PNAD 2008, Brasil. *Cad Saude Publica*. 2013;29(7):1392-406. doi: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2013000700013>.

28. Sanchez RM, Ciconelli RM. Conceitos de acesso à saúde. *Rev Panam Salud Publica*. 2012;31(3):260-8. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/S1020-49892012000300012>.
29. Loignon C, Hudon C, Goulet É, Boyer S, De Laat M, Fournier N, et al. Perceived barriers to healthcare for persons living in poverty in Quebec, Canada: the EQUIhealThY project. *Int J Equity Health*. 2015 Jan 17;14(1):4. doi: <https://doi.org/10.1186/s12939-015-0135-5>.

Tabela 1 – Número e percentual de usuários de unidades da rede básica de saúde onde foi implementada uma intervenção para melhoria da acessibilidade, de acordo com características socioeconômicas e demográficas (n=467), Salvador, Bahia, 2006

Características	n	%
Sexo		
Masculino	106	22,7
Feminino	361	77,3
Grupo etário (em anos)		
10-19	55	11,8
20-49	302	64,7
50-59	43	9,2
≥60	67	14,3
Escolaridade		
Médio-baixa	353	75,6
Alta	114	24,4
Situação conjugal		
Solteiro	140	29,9
Viúvo(a)	20	4,3
Casado/convivente	282	60,4
Divorciado(a)	25	5,4
Situação profissional		
Empregado	135	28,9
Desempregado	332	71,1
Renda familiar (em salários mínimos)^{a,b,c}		
<2	350	78,7
≥2	95	21,3
Tempo de residência no município		
Não é residente	4	0,9
<10	47	10,1
≥10	166	35,5
Sempre morou	250	53,5
Categoria sócio-ocupacional^b		
Elementar	222	48,2

Intermediária e qualificada

239

51,8

- a) Oito usuários apresentaram renda familiar superior a cinco salários mínimos.
- b) Excluídos os usuários com informação ignorada.
- c) Salário mínimo vigente no Brasil em 2006: R\$350,00.

Tabela 2 – Número e percentual de usuários de unidades da rede básica de saúde onde foi implementada uma intervenção para melhoria da acessibilidade, de acordo com características de posição no espaço social e indicadores de utilização dos serviços de saúde (n=467), Salvador, Bahia,

2006

Indicadores de acesso		Hora de chegada				Forma de marcação				Tempo de espera		Tempo de agendamento					
		n	Não pegou fila	Noite anterior até as 6h e entre 6h e 8h	P-valor ^a	n	Telefone, profissional e lista de espera	Presencial	P-valor ^a	n	Não esperou/esperou até 15 minutos	De 15 minutos até mais de 1 hora	P-valor ^a	n	Mesmo dia até 2 semanas	Entre 3 semanas e mais de 1 mês	P-valor ^a
Capital cultural	Médio-baixo	353	74,8	25,2		352	37,2	62,8		352	80,7	19,3		325	68,6	31,4	
	Alto	114	73,7	26,3	0,814	114	42,1	57,9	0,351	114	83,3	16,7	0,528	106	75,5	24,5	0,18
Capital econômico^b	Baixo	350	73,4	26,6		349	37,3	62,8		349	79,9	20,1		317	67,5	32,5	
	Médio-alto	95	85,3	14,7	0,017	95	47,4	52,6	0,074	95	89,5	10,5	0,032	92	78,3	21,7	0,04
Categoria Sócio-ocupacional^b	Elementar	222	72,9	27,0		222	31,9	68,0		222	80,6	19,4		206	67,5	32,5	
	Intermediária e qualificada	239	76,1	23,9	0,433	238	44,1	55,9	0,007	238	81,9	18,1	0,720	219	72,6	27,4	0,24
Trajatória^b	Descendente e estável	187	78,6	21,4		187	40,6	59,4		187	85,0	15,0		169	66,9	33,1	
	Ascendente	99	80,8	19,2	0,662	99	48,5	51,5	0,203	99	83,8	16,2	0,791	94	63,8	36,2	0,61

a) Teste qui-quadrado de Pearson.

b) Excluídos os usuários com informação ignorada.

Tabela 3 – Associação entre características de posição no espaço social e indicadores de utilização dos serviços de saúde em unidades da rede básica de saúde onde foi implementada uma intervenção para melhoria da acessibilidade (n=467), Salvador, Bahia, 2006

Indicadores de acesso	Hora de chegada		Forma de marcação		Tempo de marcação		Tempo de agendamento	
	OR ^b	IC _{95%} ^c	OR ^b	IC _{95%} ^c	OR ^b	IC _{95%} ^c	OR ^b	IC _{95%} ^c
Espaço social								
Capital cultural								
Alto	1,00		1,00		1,00		1,00	
Médio-baixo	0,95	0,67;1,36	1,08	0,90;1,29	1,15	0,72;1,84	1,27	0,88;1,85
Capital econômico^a								
Médio-alto	1,00		1,00		1,00		1,00	
Baixo	2,09	1,13;3,87	1,19	0,96;1,46	2,13	1,05;4,31	1,49	0,98;2,27
Categoria sócio-ocupacional^a								
Intermediária e qualificada	1,00		1,00		1,00		1,00	
Elementar	1,13	0,82;1,54	1,68	1,14;2,45	1,07	0,73;1,56	1,18	0,88;1,58
Trajatória^a								
Ascendente	1,00		1,00		1,00		1,00	
Descendente e estável	1,11	0,68;1,81	1,15	0,92;1,44	0,92	0,52;1,62	0,91	0,64;1,29

a) Excluídos os usuários com informação ignorada.

-
- b) OR: *odds ratio* (razão de chances).
c) IC_{95%}: intervalo de confiança de 95%.