

ISSN 0120-4157

Biomédica

Revista del Instituto Nacional de Salud

PUBLICACIÓN ANTICIPADA EN LINEA

El Comité Editorial de *Biomédica* ya aprobó para publicación este manuscrito, teniendo en cuenta los conceptos de los pares académicos que lo evaluaron. Se publica anticipadamente en versión pdf en forma provisional con base en la última versión electrónica del manuscrito pero sin que aún haya sido diagramado ni se le haya hecho la corrección de estilo.

Siéntase libre de descargar, usar, distribuir y citar esta versión preliminar tal y como lo indicamos pero, por favor, recuerde que la versión impresa final y en formato pdf pueden ser diferentes.

Citación provisional:

Canizales CC, Carranza JC, Vallejo GA, DA Urrea. Distribución de *Aedes albopictus* en la ciudad de Ibagué-Colombia: potencial riesgo de brotes de arbovirosis. *Biomédica*. 2023;43 (4).

Recibido: 03-05-23

Aceptado: 25-09-23

Publicación en línea: 28-09-23

Distribución de *Aedes albopictus* en la ciudad de Ibagué-Colombia: potencial riesgo de brotes de arbovirosis

Distribución de *A. albopictus* en Ibagué-Colombia

***Aedes albopictus* distribution in Ibagué, Colombia: the potential risk of arboviral outbreaks**

Cristian Camilo Canizales, Julio Cesar Carranza, Gustavo Adolfo Vallejo, Daniel Alfonso Urrea

Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical, Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia

Correspondencia:

Daniel Alfonso Urrea, Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical, Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia.

Teléfono: +57 82771212 ext. 9348. Celular: 3183877384

daurrea@ut.edu.co

Contribución de los autores:

Cristian Camilo Canizales: colecta en campo de los mosquitos e identificación taxonómica de *A. albopictus*.

Todos los autores participaron en el análisis de los resultados y la redacción del manuscrito.

Introducción. *Aedes albopictus* es un vector de arbovirus como dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla. Los primeros reportes en el continente americano datan del año 1985 y debido a su capacidad de adaptación ecológica y fisiológica, se ha distribuido rápidamente en el territorio colombiano desde su primer reporte en 1998.

Objetivo. Determinar la distribución de *A. albopictus* en las comunas de la ciudad de Ibagué, Colombia.

Materiales y métodos. Los muestreos se realizaron entre mayo y noviembre del año 2022, en las 13 comunas de la ciudad de Ibagué, en zonas con abundante vegetación, empleando aspiradores y redes entomológicas. Los mosquitos fueron transportados al Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical de la Universidad del Tolima, para su determinación taxonómica.

Resultados. Se identificaron 708 ejemplares de *A. albopictus*, distribuidos en las comunas de Ibagué. La mayor abundancia del vector se presentó en las comunas 10, 11, 7, 8, 2 y 9 respectivamente. Las comunas 3, 4, 5, 6, 12 y 13 presentaron abundancias relativas cercanas al 3%, y la comuna 1 tuvo una abundancia del 2%.

Conclusiones. *A. albopictus* está distribuido en todas las comunas de la ciudad de Ibagué, probablemente su dispersión ha sido favorecida por las condiciones ambientales y sociales de esta región. Se recomienda hacer seguimiento anual a las poblaciones de este vector y realizar una caracterización molecular de sus arbovirus. Adicionalmente, conocer la distribución de este mosquito en la ciudad permitirá focalizar las estrategias de control entomológico y prevención de futuros brotes de arbovirosis.

Palabras clave: *Aedes*; arbovirus; control de vectores de las enfermedades; Colombia.

Introduction. *Aedes albopictus* is a vector for arboviruses, such as dengue, Zika, chikungunya and yellow fever. The first *A. albopictus* reports on the American continent date back to 1985; it has spread rapidly throughout Colombia since its first report in 1998, due to its ecological and physiological adaptation capability.

Objective. To determine *A. albopictus* distribution in the Colombian city of Ibagué's 13 communes.

Materials and methods. Sampling was carried out between May and November 2022 in the city of Ibagué's 13 communes; vacuum sampling and sweep-netting entomological nets were used in areas having abundant vegetation. The mosquitoes were transported to the University of Tolima's Tropical Parasitology Research Laboratory (LIPT) for taxonomic determination.

Results. Sampling led to identifying 708 *A. albopictus* specimens distributed throughout Ibagué's 13 communes. The highest vector abundance occurred in communes 10, 11, 7, 8, 2 and 9; communes 3, 4, 5, 6, 12 and 13 had close to 3% relative abundances and commune 1 had 2% abundance.

Conclusions. *A. albopictus* is distributed throughout all the city of Ibagué's communes; its dispersion has probably been favored by this region's environmental and social conditions. It is recommended that this vector's target populations be monitored annually and that the arboviruses found in them should be molecularly characterized. Ascertaining this mosquito's distribution throughout the city will enable focusing entomological control strategies and preventing future arbovirus outbreaks.

Key words: *Aedes*; arboviruses; vector control of diseases; Colombia.

La vigilancia entomológica de vectores de arbovirus es un método eficiente para determinar la densidad, variación estacional y su distribución espacio temporal, además, permite la detección temprana de patógenos, para actuar de manera oportuna y evitar posibles brotes epidémicos que pongan en riesgo la salud pública (1,2). Uno de los vectores que ha generado más preocupación en los últimos años, dada su rápida dispersión y fácil adaptabilidad es el “Mosquito tigre asiático” *Aedes albopictus* (3,4). Originario del sureste asiático, es considerado actualmente como el mosquito más invasivo del mundo y categorizado como uno de los vectores con más dispersión geográfica en las últimas dos décadas (5). Este insecto es transmisor de arbovirus como el dengue (DENV), chikungunya (CHIKV), Zika (ZIKV) y fiebre amarilla (YFV) (6-8), virus que generan epidemias de enfermedades y pueden afectar gravemente la salud pública.

La introducción de este vector en el continente americano se dio en los años ochenta, debido al auge en el comercio de llantas usadas, que sirven como transporte pasivo para los huevos, los cuales pueden sobrevivir largos periodos en total ausencia de agua. Sus formas inmaduras se detectaron por primera vez en América continental en agosto de 1985, en Houston Texas, en llantas provenientes de Asia, y en Sudamérica se detectó por primera vez en 1986 en Río de Janeiro, Brasil (9,10). Los estudios de modelamientos de nicho ecológico han estimado que el 96,14% del continente representa potenciales áreas habitables para este díptero (11). En Colombia se reportó por primera vez la presencia de *A. albopictus* en 1998 en el municipio de Leticia, Amazonas (12). Hasta la fecha, se ha reportado la presencia de este mosquito en 18 de los 32 departamentos del país; Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y

Valle del Cauca (11,13,14). Recientemente, se reportó la presencia de este vector en la ciudad de Ibagué, donde se recolectaron siete ejemplares en la comuna 9 (15). En la actualidad, los planes de manejo y control vectorial se han focalizado en la fase de huevos y larvas, ya sea eliminándolos mecánicamente con el lavado regular de las albercas u otros depósitos artificiales de agua como floreros y bebederos de animales, o tratando el agua con insecticidas para impedir el desarrollo de las larvas (16). Estas metodologías no son del todo efectivas con *A. albopictus*, ya que dicho mosquito se encuentra más alejado de las viviendas, tiene un amplio rango de hábitats y prefiere poner sus huevos en depósitos naturales de agua como cáscaras de coco (17), bromelias (18), tocones de bambú, hojas de palma (19), huecos en los árboles (20), huecos en las rocas (21), axilas de hojas (22), conchas de caracol (23), brácteas de palma (24) y cáscaras de cacao (23); lugares de difícil acceso en los cuales no se pueden implementar estrategias tradicionales de control entomológico (12). De esta manera, la circulación y mantenimiento de arbovirus en periodos inter epidémicos se facilita en poblaciones de *A. albopictus*, ya que este se cría y desarrolla mayormente en lugares peridomiciliarios con abundante vegetación, lo que hace que su control vectorial y vigilancia entomológica sea más compleja que en las especies domiciliadas como *Aedes aegypti* (25).

Adicionalmente, la variabilidad fisiológica de *A. albopictus* le permite alimentarse de un amplio número de animales silvestres y domésticos (24,26-28), lo que da como resultado una rápida colonización de nuevos territorios. De igual manera, le ha permitido adaptarse a diferentes ambientes, incluyendo a bajas temperaturas, lo que le permite tener un mayor rango de distribución en el mundo en comparación con *A. aegypti* (29). La capacidad de resiliencia frente a los cambios de temperatura hace complicado el diseño de predicciones y modelamiento sobre la distribución en el

futuro de *A. albopictus* (30), por lo que es necesario realizar monitoreos anuales, con el fin de hacer un seguimiento constante y proporcionar datos en tiempo real sobre posibles cambios de comportamiento, dispersión o preferencias de los huéspedes para la alimentación.

La ciudad de Ibagué cuenta con temperaturas anuales que van desde los 19 hasta los 29°C, con una altitud promedio de 1285 m.s.n.m, condiciones favorables para una rápida proliferación de *A. albopictus*. Sin embargo, la zona urbana de Ibagué está representada por 13 comunas con rangos altitudinales que van desde los 826 m.s.n.m (comuna 9) hasta 1650 m.s.n.m (comuna 13), lo que muestra la necesidad de realizar estudios que abarquen toda el área de la ciudad. El problema del dengue en la ciudad de Ibagué, Colombia, se presenta como una preocupación significativa debido a la alta incidencia de casos registrados en los últimos años. De acuerdo con el boletín epidemiológico número 52 del Instituto Nacional de Salud en 2019, Ibagué ocupó el tercer lugar en registros de dengue, con 5127 casos (31). En 2020, según el boletín número 53, también ocupó el tercer lugar con 2764 casos (32). Aunque durante los años 2021-2022 se contó con pocos casos registrados de arbovirosis en el país, se pronostica un aumento para el período 2023-2024 debido a la circulación natural de estos virus.

Dado este contexto, el objetivo principal de la presente investigación fue determinar la distribución de *A. albopictus* en las distintas comunas de la ciudad de Ibagué.

Esta evaluación se llevó a cabo con el propósito de identificar y comprender la presencia de este mosquito como un factor de riesgo que podría contribuir a futuros brotes de arbovirosis en la zona.

Materiales y métodos

Área de estudio

La presente investigación se realizó en Ibagué, capital del departamento del Tolima, la cual tiene una extensión de 1498km², una elevación promedio de 1.285 m.s.n.m. y temperatura media de 21°C. Ibagué está dividida políticamente en 13 comunas y su población aproximada es de 542.724 habitantes (33).

Diseño de muestreo e identificación taxonómica de *A. albopictus*

Los mosquitos *A. albopictus* adultos fueron recolectados entre mayo y noviembre de 2022. Las unidades de muestreo fueron parques y zonas verdes con depósitos naturales y/o artificiales de agua, los cuales representan lugares potenciales para la cría y desarrollo del vector, ya que dadas sus características ecológicas prefieren desarrollarse en zonas con abundante vegetación (34,35). Con el fin de conocer la distribución completa de este vector en Ibagué, se realizaron muestreos en todas las comunas, ya que hasta el año 2021 únicamente se había reportado la presencia de *A. albopictus* en la comuna 9, donde se encontraron 7 ejemplares (15). Se realizaron dos salidas de campo por comuna, cada una constituida por un día, para un total de dos días por comuna, todas con la misma intensidad de muestreo, dos horas de búsqueda, entre 8 y 10 de la mañana o entre las 4 y 6 de la tarde, horas en las cuales los mosquitos tienen mayor actividad debido a su comportamiento alimenticio bimodal (36,37).

Los mosquitos adultos fueron recolectados con el acompañamiento del personal de la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué, empleando aspiradores y redes entomológicas, y se depositaron en recipientes plásticos de 2 L para su correcto transporte. Posteriormente, fueron trasladados al Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical (LIPT) de la Universidad del Tolima, donde se determinaron

taxonómicamente siguiendo la clave morfológica de Rueda (38), los caracteres diagnósticos como la línea media blanca sobre el dorso del tórax, el patrón de escamas blancas en forma de “V” en el mesanepímero, y el clípeo sin coloración, se observaron utilizando un estereoscopio, como se muestra en la figura 1. Se seleccionaron únicamente los ejemplares de *A. albopictus*, luego de esto fueron sexados, contados y almacenados a -80°C para análisis posteriores.

Análisis de la abundancia de *A. albopictus* en Ibagué

Para determinar la abundancia relativa de *A. albopictus* en cada una de las comunas de la ciudad, se implementó la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Abundancia relativa por comuna} = \frac{\text{Mosquitos por comuna}}{\text{Total mosquitos en la ciudad}} \times 100$$

Del mismo modo, se realizó un análisis estadístico para determinar si hubo diferencia entre las medianas de los datos, con el fin de determinar posibles cambios en la abundancia de mosquitos durante los meses evaluados.

Análisis de datos

Se realizaron pruebas estadísticas para determinar la normalidad de los datos, utilizando la prueba de Shapiro-Wilk. Además, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para evaluar las diferencias en la distribución de mosquitos por mes.

Todos los análisis se llevaron a cabo con un nivel de significancia del 5% utilizando el software InfoStat versión estudiantil 2020 (39).

Para la elaboración del mapa de distribución, se empleó la versión educativa de ArcGIS Online. Asimismo, se utilizó el software Google Earth Pro para obtener las coordenadas geográficas y la altitud de cada sitio de muestreo.

Resultados

Abundancia de *A. albopictus* en la ciudad de Ibagué

Se recolectaron 474 hembras y 234 machos, para un total de 708 ejemplares del mosquito tigre asiático. Se encontró que la mayor abundancia relativa estuvo en las comunas 10, 11, 7, 8, 2 y 9 con valores de 27, 21, 11, 8, 7 y 5% respectivamente.

Las comunas 3, 4, 5, 6, 12 y 13 presentaron abundancias cercanas al 3%.

Finalmente, la comuna 1 fue la que presentó la abundancia más baja, con un valor cercano al 2%. Nuestros resultados reflejan que el mosquito tigre asiático está distribuido en toda la ciudad, como se muestra en la figura 2.

Abundancia de mosquitos por mes

El resultado de la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis dio un valor de 0,4807, por lo tanto, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre la abundancia de mosquitos *A. albopictus* entre los meses de mayo y noviembre, como se muestra en la figura 3. Esto podría estar relacionado con el clima variable que se presentó durante el año evaluado, ya que no hubo un patrón claro de temporada seca y lluviosa.

Discusión

Los planes de monitoreo de mosquitos transmisores de arbovirus son estrategias necesarias para el control y prevención de posibles brotes epidémicos que afectan gravemente la salud pública (1,40). La vigilancia entomológica de las poblaciones de *A. albopictus* realizada en 2022 en Ibagué, demostró la amplia distribución de este vector en la ciudad. Se encontraron 708 ejemplares, entre los 908 y 1374 metros sobre el nivel del mar, registrándose en todas las comunas en el rango altitudinal del área urbana estudiada. Aunque el primer reporte para la ciudad se realizó en el año 2021 (15), no se conoce con certeza en qué año llegó este mosquito a la ciudad,

dado que presenta múltiples formas de dispersión. En el caso de la dispersión activa, es decir desplazamiento por vuelo, los mosquitos pueden movilizarse entre 83 y 333 metros por día, dependiendo de las condiciones climáticas de la región (41).

Este vector también puede ser transportado de manera pasiva, mediante la cual los huevos son trasladados largas distancias por el comercio de llantas usadas o de plantas ornamentales como el bambú, etc (42). Adicional al transporte de huevos, se conoce que los adultos de esta especie pueden ser trasladados largas distancias. En Europa se ha reportado la dispersión pasiva de adultos de *A. albopictus* en vehículos terrestres que viajan desde Italia hacia Alemania, cruzando los Alpes suizos (43). Este escenario puede presentarse en Ibagué, donde el sistema de transporte público viaja diariamente de extremo a extremo de la ciudad.

El clima de Ibagué se distingue por su patrón de precipitaciones bimodal, evidenciando dos períodos notables de lluvia, figura 4. Los niveles de precipitación alcanzan sus valores máximos en los meses de abril y mayo, así como nuevamente en el período comprendido entre octubre y noviembre (44). Esto eleva los niveles de humedad y aumenta la cantidad de depósitos naturales de agua, los cuales son de preferencia de *A. albopictus*, el cual establece sus criaderos principalmente en zonas con abundante cobertura vegetal (9,12). La temporada seca entre los meses de julio y agosto, proporciona un aumento en el promedio de la temperatura ambiental, lo que acelera el desarrollo de colonias naturales de estos insectos, debido a que, a mayor temperatura, más rápido completa su ciclo de vida (45-49). Este patrón bimodal de aumento en los niveles de precipitación, seguido de un aumento en la temperatura es un factor que favorece los criaderos de mosquitos y la circulación de virus. Gutiérrez y colaboradores (6), encontraron que, a mayores

temperaturas ambientales, incrementa la tasa de replicación y transmisión del virus del Zika en poblaciones de *A. albopictus*.

Hasta el año 2022, se pensaba que *A. albopictus* establecía sus criaderos estrictamente en lugares peridomiciliarios con alta densidad de cobertura vegetal. Sin embargo, en el año 2023 Marquetti y colaboradores, mostraron en un estudio realizado en la Habana, Cuba, que cada año son más los sitios de cría que se encuentran al interior de las viviendas, esto sugiere el inicio de domiciliación de esta especie, y pone en alerta a los programas de control de vectores (50). De esta manera, *A. albopictus* se convierte en un eficiente vector puente de enfermedades zoonóticas, ya que, debido a su facilidad para moverse entre ambientes urbanos y selváticos, interactúa constantemente con la diversidad viral de la fauna silvestre (24,51).

La temperatura de Ibagué es un factor crucial para el desarrollo de los mosquitos, pues se conoce que su promedio anual es de 21°C, con máximos de 29°C y mínimos de 19°C (52), lo que conlleva a que el ciclo de vida completo de *A. albopictus*, desde la oviposición hasta la emergencia del adulto sea de entre 10 y 17 días, dependiendo de la humedad relativa (45). Adicionalmente, se ha reportado que entre los 20 y 25°C es la temperatura en la cual las hembras adultas de esta especie tienen mayor longevidad, lo que aumenta su probabilidad de picar, transmitir enfermedades y reproducirse (53).

Dada la capacidad de esta especie de madurar huevos sin necesidad de alimentación previa con sangre (54), y de ovipositar entre 32 y 80 huevos por ciclo gonotrófico (45), una hembra de *A. albopictus* en las condiciones climáticas de Ibagué, estaría en capacidad de generar aproximadamente 280 huevos por mes, ya que cada ciclo gonotrófico tiene una duración de aproximadamente 3 días, y en

condiciones peridomiciliarias *A. albopictus* tiene una media de vida de 30 días, tiempo en el cual podría desarrollar 5 ciclos gonotróficos (37,55). La duración del ciclo gonotrófico es un factor importante, pues se conoce que *A. aegypti* toma aproximadamente 4 días en completarlo y *A. albopictus* 3, por lo que, al presentar este último un ciclo más corto, hace que el número de picaduras sobre el huésped aumente, lo que podría generar un aumento en la capacidad vectorial (55-57).

En cuanto a la situación socio-económica el panorama de Ibagué es complejo. Desde agosto del 2021 se han registrado 14 nuevos asentamientos humanos de origen informal o también conocidos como “Invasiones”, como resultado de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, que dejó a miles de personas en condición de vulnerabilidad (58). En el presente estudio se realizaron muestreos en tres de estos asentamientos informales, “Ecoparaiso”, “Nueva Jerusalén” y “Villa Resistencia”, donde se encontraron 88 mosquitos de la especie *A. albopictus*, en lugares con abundante vegetación y que además tenían presencia de basuras dada la deficiencia en los servicios básicos de recolección de residuos sólidos. Estos resultados concuerdan con los hallazgos de Thongsripong y colaboradores, quienes encontraron una asociación entre la alta actividad de oviposición de *A. albopictus* y zonas con asentamientos familiares con ingresos económicos por debajo del promedio en el sur de Estados Unidos (59).

Los asentamientos informales carecen de servicios de acueducto y alcantarillado, lo que resulta en la falta de acceso a agua de calidad para sus habitantes. Como consecuencia, los residentes se ven obligados a obtener agua directamente de ríos o quebradas, almacenándola en contenedores improvisados como baldes o barriles que se ubican alrededor de sus viviendas. Lamentablemente, esta situación crea un entorno propicio para la reproducción de mosquitos, ya que depósitos artificiales

como llantas usadas, macetas, contenedores de almacenamiento, frascos y latas se han identificado previamente como sitios comunes de cría para estos insectos (9,60,61). Estudios previos han resaltado el papel de los tanques descartados y las llantas usadas como los sitios más propensos como criaderos, representando el 37% y el 26% de los sitios donde fueron encontradas insectos en estado larval, respectivamente. Este fenómeno puede atribuirse en parte a la escasa exposición a la luz y a los niveles óptimos de humedad relativa que se encuentran dentro de estos recipientes (62), por lo que conocer los criaderos de mosquitos con mayores índices larvarios permitirá focalizar las estrategias de control entomológico. Los elementos previamente mencionados revelan cómo las condiciones tanto ambientales como sociales en Ibagué crean un entorno propicio para la multiplicación de insectos vectores de arbovirus en estas comunidades.

Estudios realizados en Estados Unidos y Brasil sobre el papel del mosquito tigre asiático en el desplazamiento de otras especies en lugares peridomiciliarios, han mostrado que *A. albopictus* es un competidor larvario superior que *A. aegypti*, el cual solo creció cuando la densidad de larvas fue baja y la cantidad de alimento alta, mientras que *A. albopictus* logró desarrollarse hasta su forma adulta en cantidades bajas de alimento y alta densidad de larvas, probablemente porque aprovecha de mejor manera los recursos de hojarasca propios de los depósitos naturales de agua, lo que da como resultado un desplazamiento de *A. aegypti* en lugares rurales y peridomiciliarios (63,64). En el caso de la ciudad de Ibagué, existen un total de 218 parques, con un área de 342.056 m² correspondientes a zonas verdes y 273.804 m² a separadores (65). Esto brinda las condiciones óptimas para el potencial desarrollo y picadura de *A. albopictus*, ya que se puede encontrar tanto en zonas urbanas, semiurbanas y rurales (66). En el presente estudio se realizaron muestreos en 9

zonas verdes públicas, categorizadas como: cerros, parques, jardines botánicos o plazoletas, y se encontró la presencia de *A. albopictus* en todos estos lugares, lo que refleja el potencial riesgo de transmisión de arbovirus de este vector en la ciudad, ya que se encuentra establecido en zonas altamente transitadas por la población humana.

Los estudios realizados por Klowden & Chambers, demostraron que la capacidad de adaptación de *A. albopictus* se debe a que su período pupal es más extenso que en *A. aegypti*, y que esta prolongación en dicha etapa del ciclo de vida, ayuda a la acumulación de proteínas, lípidos y azúcares, lo que le brinda mejor suministro de nutrientes al adulto. La mayor acumulación de reservas energéticas confiere a *A. albopictus* dos notables ventajas: por un lado, prolonga su supervivencia en comparación con *A. aegypti* en situaciones de inanición; por otro, le permite la producción de huevos sin la obligación de un previo consumo sanguíneo. En condiciones de laboratorio, se ha documentado una tasa de autogenia del 5% en individuos que, exclusivamente alimentados con soluciones azucaradas, lograron desarrollar huevos (54). Esto explica por qué incluso en lugares donde el recurso proteico de sangre no es constante, el mosquito tigre asiático sigue proliferando día tras día.

La diapausa en los mosquitos es un proceso fisiológico genéticamente programado, en el cual los embriones entran en latencia cuando las condiciones ambientales son desfavorables, lo que aumenta la probabilidad de superar con éxito alteraciones fuertes de su entorno, como lo que actualmente está ocurriendo con el cambio climático (67). La diapausa como estrategia de supervivencia se ha reportado en *A. albopictus*, lo que explica la distribución global de este vector (68), frente a esto, las investigaciones han mostrado que, como respuesta a las condiciones hostiles, los

mosquitos aumentan la expresión de genes asociados a la diapausa como: *cathepsin*, *idgf4* y *pepck*, los cuales podrían utilizarse como blancos moleculares para futuras estrategias de control entomológico (69).

Se puede concluir que *A. albopictus* está distribuido en toda la ciudad de Ibagué, en el presente estudio se obtuvo el primer mapa de distribución de este vector en la ciudad. Las comunas con mayor incidencia de este vector son la 10, 11, 7, 8 y 2, respectivamente. Esto refleja un alto potencial de transmisión de arbovirus a la población humana, ya que, sumado a la elevada abundancia de vectores dadas las características ambientales y sociales de esta ciudad, también se ha reportado la circulación de dengue y chikungunya en poblaciones de mosquitos *A. aegypti* (15). Hasta la fecha este es el primer levantamiento entomológico para esta especie en toda la ciudad, y como lo muestra este trabajo, su distribución ha sido favorecida por las características sociales y ambientales, lo que ayuda a la proliferación de vectores y, por ende, el riesgo de una alta incidencia de arbovirosis en la región. Adicionalmente, se recomienda llevar a cabo una vigilancia entomológica anual, para hacer seguimiento a las poblaciones de la especie, ejecutar bioensayos para evaluar resistencia/susceptibilidad a insecticidas y realizar una detección molecular de los posibles arbovirus presentes en este vector.

Los resultados aquí presentados abren la puerta a futuras investigaciones que propongan evaluar la relación entre niveles de precipitación y/o temperatura de las temporadas secas y lluviosas con respecto a la abundancia de *A. albopictus* en la ciudad, pues ya se conoce que este mosquito se puede hallar en todas las comunas, y que la diferencia entre la cantidad de individuos encontrados dependerá de las características particulares de cada localidad en una escala temporal.

Además, conocer la distribución completa de este vector en la ciudad sirve para

focalizar y promover el desarrollo de nuevas estrategias de control entomológico, ya que las metodologías implementadas en la actualidad se han centrado en *A. aegypti*, y debe prestarse igual atención a *A. albopictus*, un vector de arbovirus poco conocido que ya se estableció en la ciudad de Ibagué, Colombia y que es igualmente de alto riesgo para la salud pública. Por último, sugerimos llevar a cabo investigaciones adicionales que analicen los índices de formas inmaduras tanto en criaderos naturales como artificiales. Esta información será fundamental para el desarrollo de estrategias más efectivas de control entomológico, las cuales estarán diseñadas específicamente en función de las preferencias de sitios de cría de los mosquitos.

Agradecimientos

Los autores presentan sus agradecimientos a los integrantes del Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical; Juan David Rojas por la ayuda con las fotografías, a Laura Fernanda Santofimio, Natalia Barrera y Weimar David Briñez por su colaboración en las salidas de campo. Al personal de la Secretaría de Salud de Ibagué.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses con respecto al presente trabajo.

Financiación

Este trabajo fue financiado por la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad del Tolima, proyecto 410121.

Referencias

1. **Acero-Sandoval MA, Palacio-Cortés AM, Navarro-Silva MA.** Surveillance of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) as a Method for

Prevention of Arbovirus Transmission in Urban and Seaport Areas of the Southern Coast of Brazil. *J Med Entomol.* 2023;60:173-84.

<https://doi.org/10.1093/jme/tjac143>

2. **Liu QM, Gong ZY, Wang Z.** A Review of the Surveillance Techniques for *Aedes albopictus*. *Am J Trop Med Hyg.* 2022;108:245-51.
<https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0781>
3. **Beleri S, Balatsos G, Tegos N, Papachristos D, Mouchtouri V, Hadjichristodoulou C, et al.** Winter survival of adults of two geographically distant populations of *Aedes albopictus* in a microclimatic environment of Athens, Greece. *Acta Trop.* 2023;240:106847.
<https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2023.106847>
4. **Ivanescu LM, Bodale I, Grigore-Hristodorescu S, Martinescu G, Andronic B, Matiut S, Azoicai D, Miron L.** The Risk of Emerging of Dengue Fever in Romania, in the Context of Global Warming. *Trop Med Infect Dis.* 2023;8:65 .
<https://doi.org/10.3390/tropicalmed8010065>
5. **Benedict MQ, Levine RS, Hawley WA, Lounibos LP.** Spread of the Tiger: Global Risk of Invasion by the Mosquito *Aedes albopictus*. *Vect Born Zoon.* 2007;7:76-85. <https://doi.10.1089/vbz.2006.0562>.
6. **Gutiérrez-López R, Figuerola J, Martínez-de la Puente J.** Methodological procedures explain observed differences in the competence of European populations of *Aedes albopictus* for the transmission of Zika virus. *Acta Trop.* 2023;237:106724. <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2022.106724>
7. **Kubacki J, Flacio E, Qi W, Guidi V, Tonolla M, Fraefel C.** Viral metagenomic analysis of *Aedes albopictus* mosquitos from Southern Switzerland. *Viruses.* 2020;12:929. <https://doi.org/10.3390/v12090929>

8. **McKenzie BA, Wilson AE, Zohdy S.** *Aedes albopictus* is a competent vector of Zika virus: A meta-analysis. Plos one. 2019;14:e0216794.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216794>
9. **Carvajal JJ, Honorio NA, Díaz SP, Ruiz ER, Asprilla J, Ardila S, et al.** Detection of *Aedes albopictus* (Skuse) (Diptera: Culicidae) in the municipality of Istmina, Chocó, Colombia. Biomédica. 2016;36:438-46.
<https://doi.org/10.7705/biomedica.v36i3.2805>
10. **Rúa-Uribe GL, Suárez-Acosta C, Rojo RA.** Implicaciones epidemiológicas de *Aedes albopictus* (Skuse) en Colombia. Rev Fac Nac Salud Pública. 2012;30:328-37.
11. **Echeverry-Cárdenas E, López-Castañeda C, Carvajal-Castro JD, Aguirre-Obando OA.** Potential geographic distribution of the tiger mosquito *Aedes albopictus* (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) in current and future conditions for Colombia. PLoS Negl Trop Dis. 2021;15:e0008212.
<https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0008212>
12. **Vélez I, Quiñones M, Suárez M, Olano V, Murcia L, Correa E, et al.** Presencia de *Aedes albopictus* en Leticia, Amazonas, Colombia. Biomédica. 1998;18:192-8. <https://doi.org/10.7705/biomedica.v18i3.990>
13. **Instituto Nacional de Salud.** Informe técnico entomológico de arbovirus, Colombia 2021. Bogotá, D.C.: Instituto Nacional de Salud; 2021.
14. **Martínez D, Hernández C, Muñoz M, Armesto Y, Cuervo A, Ramírez JD.** Identification of *Aedes* (Diptera: Culicidae) Species and Arboviruses Circulating in Arauca, Eastern Colombia. Front Ecol Evol. 202;8:602190
<https://doi.org/10.3389/fevo.2020.602190>

15. **Carrasquilla MC, Ortiz MI, León C, Rondón S, Kulkarni MA, Talbot B, et al.** Entomological characterization of *Aedes* mosquitoes and arbovirus detection in Ibagué, a Colombian city with co-circulation of Zika, dengue and chikungunya viruses. *Paras Vect.* 2021;14:446.
<https://doi.org/10.1186/s13071-021-04908-x>
16. **Janich AJ, Saavedra-Rodriguez K, Vera-Maloof FZ, Kading RC, Rodríguez AD, Penilla-Navarro P, et al.** Permethrin resistance status and associated mechanisms in *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) from Chiapas, Mexico. *J Med Entomol.* 2021;58:739-48.
<https://doi.org/10.1093/jme/tjaa197>
17. **Vijayakumar K, Sudheesh TK, Nujum Z, Umarul F, Kuriakose A.** A study on container breeding mosquitoes with special reference to *Aedes* (*Stegomyia*) *aegypti* and *Aedes albopictus* in Thiruvananthapuram district, India. *Vector Borne Dis.* 2014;51:27-32.
18. **Oliveira VC, de Almeida LC.** Ocorrência de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* em bromélias cultivadas no Jardim Botânico Municipal de Bauru, São Paulo, Brasil. *Cad Saud Pub.* 2017;33:e00071016.
<https://doi.org/10.1590/0102-311x00071016>
19. **Delatte H, Dehecq JS, Thiria J, Domerg C, Paupy C, Fontenille D.** Geographic distribution and developmental sites of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) during a Chikungunya epidemic event. *Vector-Borne Zoon Dis.* 2008;8:25-34. <https://doi.org/10.1089/vbz.2007.0649>
20. **Shriram AN, Sivan A, Sugunan AP.** Spatial distribution of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* in relation to geo-ecological features in South

- Andaman, Andaman and Nicobar Islands, India. *Bul Entomol Res.* 2018;108:166–74. <https://doi.org/10.1017/S0007485317000645>
21. **O'meara G, Evans L, Womack M.** Colonization of rock holes by *Aedes albopictus* in the southeastern United States. *J Am Mosq Cont Assoc.* 1997;13:270-4.
22. **Edillo FE, Roble ND, Otero ND.** The key breeding sites by pupal survey for dengue mosquito vectors, *Aedes aegypti* (linnaeus) and *Aedes albopictus* (skuse), in guba, cebu city, philippines. *Southeast Asian J Trop Med Public Health.* 2012;43:1365-74.
23. **Simard F, Nchoutpouen E, Claude J, Fontenille D.** Geographic Distribution and Breeding Site Preference of *Aedes albopictus* and *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) in Cameroon, Central Africa. *J Med Entomol.* 2005;42:726-3.
24. **Pereira-Dos-Santos T, Roiz D, Lourenço-De-Oliveira R, Paupy C.** A systematic review: Is *Aedes albopictus* an efficient bridge vector for zoonotic arboviruses? *Pathogens.* 2020;9:266. <https://doi.org/10.3390/pathogens9040266>
25. **Calle-Tobón A, Pérez-Pérez J, Rojo R, Rojas-Montoya W, Triana-Chavez O, Rúa-Uribe G, et al.** Surveillance of Zika virus in field-caught *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* suggests important role of male mosquitoes in viral populations maintenance in Medellín, Colombia. *Infect Genet Evol.* 2020;85:104434. <https://doi.org/10.1016/j.meegid.2020.104434>
26. **Faraji A, Egizi A, Fonseca DM, Unlu I, Crepeau T, Healy SP, et al.** Comparative Host Feeding Patterns of the Asian Tiger Mosquito, *Aedes albopictus*, in Urban and Suburban Northeastern USA and Implications for

Disease Transmission. Plos Negl Trop Dis. 2014;7:8:e3037

<https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003037>

27. **Kamgang B, Nchoutpouen E, Simard , Paupy C.** Notes on the blood-feeding behavior of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) in Cameroon. Parasit Vectors. 2012;5:57. <https://doi.org/10.1186/1756-3305-5-57>
28. **Kim H, Yu H, Lim HW, Yang S, Roh JY, Chang KS, et al.** Host-feeding pattern and dengue virus detection of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) captured in an urban park in Korea. J Asia-Pacific Entom. 2017;20:809-13. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2017.05.007>
29. **Briegel H, Timmermann SE.** *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae): Physiological aspects of development and reproduction. J Med Entomol. 2001;38:566-71. <https://doi.org/10.1603/0022-2585-38.4.56>
30. **Laporta GZ, Potter AM, Oliveira FA, Bourke BP, Pecor DB, Linton YM.** Global Distribution of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* in a Climate Change Scenario of Regional Rivalry. Insects. 2023;14:49. <https://doi.org/10.3390/insects14010049>
31. **Instituto Nacional de Salud.** Boletín Epidemiológico Semanal: semana epidemiológica número 52 de 2019 (22 al 28 de diciembre de 2019). Bogotá: Instituto Nacional de Salud; 2019.
32. **Instituto Nacional de Salud.** Boletín Epidemiológico Semanal: semana epidemiológica número 53 de 2020 (27 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021). Bogotá: Instituto Nacional de Salud; 2021.
33. **Ibagué cómo vamos.** Informe de calidad de vida de Ibagué, 2021. Fecha de consulta: 11 de febrero de 2022. Disponible en:

https://ibaguecomovamos.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-de-calidad-de-vida-2020_1.pdf

34. **de Oliveira JM, Serpa LM, Souza DA, Fernandes MF, Oshiro ET, de Oliveira EF, et al.** Abiotic factors and population dynamic of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* in an endemic area of dengue in Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2019;61:e18. <https://doi.org/10.1590/s1678-9946201961018>
35. **Valerio L, Marini F, Bongiorno G, Facchinelli L, Pombi M, Caputo B, et al.** Host-Feeding Patterns of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) in Urban and Rural Contexts within Rome Province, Italy. Vector Borne Zoonotic Dis. 2010;10:291-4. <https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/vbz.2009.0007>
36. **Egid BR, Coulibaly M, Dadzie SK, Kamgang B, McCall PJ, Sedda L, et al.** Review of the ecology and behaviour of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* in Western Africa and implications for vector control. Curr Res Parasitol Vector Borne Dis. 2022;2:100074. <https://doi.org/10.1016/j.crvbd.2021.100074>
37. **Novianto D, Hadi UK, Soviana S, Darusman HS.** Comparison of diurnal biting activity, life table, and demographic attributes of *Aedes albopictus* (Asian tiger mosquito) from different urbanized settings in West Java, Indonesia. Acta Trop. 2022;241:106771. <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2022.106771>
38. **Rueda LM.** Pictorial keys for the identification of mosquitos (Diptera: Culicidae) associated with Dengue Virus Transmission. Zootaxa. 2004;589:1.
39. **Di Rienzo JA, Casanoves F, Balzarini MG, Gonzalez L, Tablada M, Robledo CW.** InfoStat versión 2020. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba; 2020.

40. **Romiti F, Ermenegildi A, Magliano A, Rombolà P, Varrenti D, Giammattei R, et al.** *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) monitoring in the lazio region (Central Italy). *J Med Entomol.* 2021;58:847-56.
<https://doi.org/10.1093/jme/tjaa222>
41. **Vavassori L, Saddler A, Müller P.** Active dispersal of *Aedes albopictus*: A mark-release-recapture study using self-marking units. *Parasit Vectors.* 2019;12:583. <https://doi.org/10.1186/s13071-019-3837-5>
42. **Swan T, Russell TL, Staunton KM, Field MA, Ritchie SA, Burkot TR.** A literature review of dispersal pathways of *Aedes albopictus* across different spatial scales: implications for vector surveillance. *Parasit Vectors.* 2022;15:303. <https://doi.org/10.1186/s13071-022-05413-5>
43. **Müller P, Engeler L, Vavassori L, Suter T, Guidi V, Gschwind M, et al.** Surveillance of invasive *Aedes* mosquitoes along swiss traffic axes reveals different dispersal modes for *Aedes albopictus* and *Ae. Japonicus*. *PLoS Negl Trop Dis.* 2020;14:e0008705. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0008705>
44. **CORTOLIMA.** Caracterización climatológica de la subzona hidrográfica del río coello. Fecha de consulta: 11 de febrero de 2023. Disponible en:
https://www.cortolima.gov.co/images/POMCA/Rio_Coello/2fase/CARACTERIZACION_CLIMATOLOGICA.pdf
45. **Alarcón-Elbal P, Delacour S, Pinal R, Ruíz-Arrondo I, Muñoz, Bengoa M, et al.** Establecimiento y mantenimiento de una colonia autóctona española de *Aedes (Stegomyia) albopictus* Skuse, 1894, (Diptera, Culicidae) en laboratorio. *Rev Ibero-Latinoamericana Paras.* 2010;69:140-8.
46. **Caminade C, Medlock JM, Ducheyne E, McIntyre KM, Leach S, Baylis M, et al.** Suitability of European climate for the Asian tiger mosquito *Aedes*

albopictus: Recent trends and future scenarios. J R Soc Interface.

2012;9:1708-2717. <https://doi.org/10.1098/rsif.2012.0138>


47. **Caminade C, Turner J, Metelmann S, Hesson JC, Blagrove M, Solomon T, et al.** Global risk model for vector-borne transmission of Zika virus reveals the role of El Niño 2015. Proc Nat Acad Sci USA. 2017;114:119-24.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1614303114>
48. **Healy KB, Dugas E, Fonseca DM.** Development of a degree-day model to predict egg hatch of *Aedes albopictus*. J Am Mosq Control Assoc. 2019;35:249-57. <https://doi.org/10.2987/19-6841.1>
49. **Pereira SJ, de Camargo A, Honório NA, Câmara DC, Sukow NM, Machado ST, et al.** Spatial and Temporal Distribution of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* Oviposition on the Coast of Paraná, Brazil, a Recent Area of Dengue Virus Transmission. Trop Med Infect Dis. 2022;7:246.
<https://doi.org/10.3390/tropicalmed7090246>
50. **Marquetti M, Castillo M, Peraza I, Milian M, Molina R, Leyva M, et al.** *Aedes albopictus* (Skuse) dispersion in Havana City, Cuba, 1995–2018. Acta Trop. 2023;240:106839. <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2023.106839>
51. **Ayllón T, Câmara DC, Morone FC, da Silva L, de Barros FS, Brasil P, et al.** Dispersion and oviposition of *Aedes albopictus* in a Brazilian slum: Initial evidence of Asian tiger mosquito domiciliation in urban environments. PLoS One. 2018;13:e0195014. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195014>
52. **WeatherSpark.** Datos históricos de temperatura en Ibagué en 2022. Fecha de consulta: 22 de febrero de 2023. Disponible en:
<https://es.weatherspark.com/h/y/22439/2022/Datos-hist%C3%B3ricos->

[meteorol%C3%B3gicos-de-2022-en-Ibagu%C3%A9-Colombia#Figures-Temperature](#)

53. **Schmidt CA, Comeau G, Monaghan AJ, Williamson DJ, Ernst KC.** Effects of desiccation stress on adult female longevity in *Aedes aegypti* and *Ae. albopictus* (Diptera: Culicidae): results of a systematic review and pooled survival analysis. *Parasit Vectors*. 2018;11:267. <https://doi.org/10.1186/s13071-018-2808-6>
54. **Klowden MJ, Chambers GM.** Reproductive and Metabolic Differences Between *Aedes aegypti* and *Ae. albopictus* (Diptera: Culicidae). *J Med Entomol*. 1992;29:467-71. <https://doi.org/10.1093/jmedent/29.3.467>
55. **Casas-Martínez M, Tamayo-Domínguez R, Bond-Compeán JG, Rojas JC, Weber M, Ulloa-García A.** Oogenic development and gonotrophic cycle of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* in laboratory. *Salud Publica Mex*. 2020;62:372-8. <https://doi.org/10.21149/10164>
56. **Brackney DE, LaReau JC, Smith RC.** Frequency matters: How successive feeding episodes by blood-feeding insect vectors influences disease transmission. *PLoS Pathog*. 2021;17:e1009590. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009590>
57. **Scott T, Takken W.** Feeding strategies of anthropophilic mosquitoes result in increased risk of pathogen transmission. *Trends Parasitol*. 2012;28:114-21. <https://doi.org/10.1016/j.pt.2012.01.001>
58. **El Nuevo Día.** El complejo panorama de las invasiones urbanas en Ibagué. Fecha de consulta: 20 de febrero de 2022. Disponible en: <https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/483192-el-complejo-panorama-de-las-invasiones-urbanas-en-ibague>


59. **Thongsripong P, Carter BH, Ward MJ, Jameson SB, Michaels SR, Yukich JO, et al.** *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) Oviposition Activity and the Associated Socio-environmental Factors in the New Orleans Area. *J Med Entomol.* 2023;60:392-400.
<https://doi.org/10.1093/jme/tjad007>
60. **Egid B, Coulibaly M, Dadzie SK, Kamgang B, McCall P, Sedda L, et al.** Review of the ecology and behaviour of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* in Western Africa and implications for vector control. *Curr Res Parasitol Vector Borne Dis.* 2022;2:100074.
<https://doi.org/10.1016/j.crvbd.2021.100074>
61. **Ouattara LP, Sangaré I, Namountougou M, Hien A, Ouari A, Soma D, et al.** Surveys of arbovirus vectors in four cities stretching along a railway transect of Burkina Faso: risk transmission and insecticide susceptibility status of potential vectors. *Front Vet Sci.* 2019;6:140.
<https://doi.org/10.3389/fvets.2019.00140>
62. **Tedjou AN, Kamgang B, Yougang AP, Wilson-Bahun TA, Njiokou F, Wondji CS.** Patterns of ecological adaptation of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* and *Stegomyia* indices highlight the potential risk of arbovirus transmission in Yaoundé, the capital city of Cameroon. *Pathogens.* 2020;9:491. <https://doi.org/10.3390/pathogens9060491>
63. **Braks MA, Honório NA, Lounibos LP, Lourenço-de-Oliveira R, Juliano SA.** Interspecific competition between two invasive species of container mosquitoes, *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae), in Brazil. *Ann Entomol Soc Am.* 2004;97:130-9 [https://doi.org/10.1603/0013-8746\(2004\)097\[0130:ICBTIS\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1603/0013-8746(2004)097[0130:ICBTIS]2.0.CO;2)

64. **Juliano SA.** Species introduction and replacement among mosquitoes: interspecific resource competition or apparent competition? *Ecology*. 1998;79:255-68. [https://doi.org/10.1890/0012-9658\(1998\)079\[0255:SIARAM\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/0012-9658(1998)079[0255:SIARAM]2.0.CO;2)
65. **Plan de desarrollo municipal.** Conservación de espacios verdes en Ibagué, Tolima. Fecha de consulta 20 febrero de 2023. Disponible en: <https://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/mgaweb124.pdf>
66. **Herath J, Abeyasundara HT, de Silva WA, Weeraratne TC, Karunaratne SH.** Weather-based prediction models for the prevalence of dengue vectors *Aedes aegypti* and *Ae. albopictus*. *J Trop Med*. 2022;4494660. <https://doi.org/10.1155/2022/4494660>
67. **Armbruster PA.** Photoperiodic Diapause and the Establishment of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) in North America. *J Med Entomol*. 2016;53:1013-23. <https://doi.org/10.1093/jme/tjw037>
68. **Diniz DF, Ribeiro CM, Oliveira L, Melo-Santos MA, Ayres FJ.** Diapause and quiescence: dormancy mechanisms that contribute to the geographical expansion of mosquitoes and their evolutionary success. *Parasit Vectors*. 2017;10:310. <https://doi.org/10.1186/s13071-017-2235-0>
69. **Diniz DF, Romão TP, Helvécio E, de Carvalho-Leandro D, Xavier M, Peixoto CA, et al.** A comparative analysis of *Aedes albopictus* and *Aedes aegypti* subjected to diapause-inducing conditions reveals conserved and divergent aspects associated with diapause, as well as novel genes associated with its onset. *Curr Res Insect Sci*. 2022;2:100047. <https://doi.org/10.1016/j.cris.2022.100047>



figu

Figura 1: Caracteres diagnósticos de *Aedes albopictus*. (A) Línea media blanca sobre el dorso del tórax. (B) patrón de escamas blancas en forma de "V" en el mesanepímero. (C) Clípeo totalmente negro.



Autor: Cristian Camilo Canizales Silva

Figura 2: Mapa de calor de la abundancia relativa por comuna de *Aedes albopictus* y ubicación de los sitios de muestreo.




Figura 3: Diagrama de cajas de la cantidad de mosquitos encontrados por cada sitio de muestreo entre los meses analizados.




Figura 4: Patrón de lluvias en la ciudad de Ibagué durante los meses analizados del año 2022.