

Miércoles 11 - Lugones C

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) MANIFESTACIONES BUCALES. SÍFILIS, VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) Y VIRUS DEL HERPES (VHS).

Talavera, Angel; Brusa, Martín; Bachmeier, Evelin; Cuffini, Cecilia; Mosmann, Jessica; Panico, René.
Facultad de Odontología y Facultad de Ciencias Médicas

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son unas de las causas principales de enfermedad aguda, infertilidad, discapacidad a largo plazo, y muerte en el mundo y tienen consecuencias médicas y psicológicas graves para millones de hombres, mujeres y niños. Las repercusiones de estas enfermedades son aún peores si se considera su contribución potencial a la transmisión de la infección por VIH. La OMS y el ONU SIDA consideran que "la vigilancia de las ITS es un componente clave de los sistemas de vigilancia de VIH y del Sida, de segunda generación. En el embarazo, la sífilis temprana no tratada puede provocar una tasa de mortalidad del 25% y un 14% de las muertes neonatales, lo que significa aproximadamente un 40% de la mortalidad perinatal global. La prevención y la asistencia de las enfermedades de transmisión sexual constituyen un mecanismo de intervención que mejora la situación sanitaria de la población y previene la transmisión del VIH. En consecuencia, el UNUSIDA y la OMS recomiendan conceder alta prioridad a la elaboración de programas encaminados hacia esa meta. Infecciones de Transmisión Sexual como el VPH, Sífilis y el Herpes pueden tener manifestaciones bucales y su contagio y transmisión puede producirse a través del sexo oral. En el año 2011 se estudiaron 190.589 mujeres, el 1,3% resultó positivo para sífilis con un rango que va del 0,6% en Cuyo, al 2% en el NE. Argentino. Sífilis Congénita: para el año 2012 se reportaron un total de 1.225 casos de sífilis congénita en el país. La tasa de notificación de sífilis precoz primaria registro una tendencia ascendente entre los años 1998 y 2006. Este aumento ocurrió en todas las regiones de la Argentina, pero en mayor grado en el Norte cuyas provincias se encuentran por encima de la tasa de notificación Nacional. Un trabajo de investigación llevado a cabo en la ciudad de Córdoba Argentina concluyó que el HPV fue detectado en la cavidad bucal en el 88,9% de las lesiones benignas, en el 41,4% de las lesiones potencialmente malignas (LPM), y en el 56,25% de las neoplasias. Reiteramos nuestra convicción de que los sectores de salud y educación son sinérgicos para la prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) actuando conjuntamente. Se ha comprobado que la educación es uno de los esfuerzos más importantes para que la población pueda estar alerta y reconozca síntomas de ITS. Veintidós estudios de educación sobre la salud sexual y el VIH/SIDA analizados por ONU/SIDA concluían que la educación retrasaba el comienzo de la actividad sexual, reducía el número de parejas, rebajaba las tasas de embarazo y de ITS.

OBJETIVOS: *El principal objetivo es que intentaremos establecer pautas para la Prevención, consulta y tratamiento, para ayudar a "

Cortar la Cadena de Transmisión". *Promover la movilización y participación de la comunidad universitaria. * Efecto multiplicador. * Prevención entre pares.