

# Estudio de lesiones blancas orales potencialmente malignas

## J Bargas

Cátedra de Anatomía Patológica A, Facultad de Odontología, UNC

## C Massaia

Cátedra de Anatomía Patológica A, Facultad de Odontología UNC

## MV Cisneros

Cátedra de Anatomía Patológica A, Facultad de Odontología UNC

## GM Robledo

Cátedra de Anatomía Patológica A, Facultad de Odontología UNC

## MS Navarro

Cátedra de Anatomía Patológica A, Facultad de Odontología UNC

## V Pereira

Cátedra de Anatomía Patológica A, Facultad de Odontología UNC

## RA Tomasi

Cátedra de Anatomía Patológica A, Facultad de Odontología UNC

**Palabras clave:** liquen plano oral, lesiones liquenoides orales, leucoplasia oral, inmunohistoquímica

## Resumen

Los Trastornos Potencialmente Malignos Orales (TPMO) fueron descritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como aquel tejido de morfología alterada con mayor predisposición a la cancerización (superior al 5%). Actualmente, para Warnakulasuriya, el espectro de TPMO debe incluir además a las reacciones liquenoides orales.

El objetivo del presente estudio fue analizar y comparar las características clínicas, histopatológicas e inmunohistoquímicas en casos de Liquen Plano Oral (LPO), Lesiones Liquenoides Orales (LLO) y Leucoplasia Oral (LO).

El estudio fue de tipo retrospectivo, observacional y descriptivo en biopsias de pacientes, entre los años 2015 a 2017, recibidas en el Laboratorio de Anatomía Patológica, diagnosticadas en la cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Odontología de la UNC y analizadas en el Laboratorio de Patología Molecular de la Facultad de Odontología de la UDELAR. Los casos de LPO y LLO se diagnosticaron con criterios de Van der Waal-Van der Meij (VW-VM), y las LO mediante los criterios de Lanfranchi. Se utilizó estadística descriptiva.

Se estudiaron 27 casos (9 de cada patología), de las cuales fueron 11 mujeres (LPO:0, LLO:7 y LO:4) y 16 varones (LPO: 9 LLO:2 y LO:5) con una edad media de 56 años (LPO:58,LLO:55 y LO:56). El sitio de toma de biopsia fue: mucosa yugal para LPO y LO mientras que para LLO fue la lengua. Dentro de las características histopatológicas diferenciables entre estas patologías se puede destacar que la paraqueratinización fue más frecuente en LPO y LLO mientras que la ortoqueratinización en LO. La acantosis, papilomatosis y displasia epitelial fueron más frecuentes en LLO y LO. En relación con la expresión inmunohistoquímica de p53, todos los casos de LO fueron positivos mientras que en el LPO y LLO fueron negativos; lo que fue estadísticamente significativo  $p < 0,0001$ .

En la patología oral actual, es necesario clasificar al LPO y LLO utilizando los criterios de Van der Waal-Van der Meij y conocer las características diferenciales de cada uno de estos TPMO poniendo énfasis en el correcto diagnóstico de estas patologías así como en el diagnóstico precoz de las mismas.

## Citas

.



Publicado

2021-10-15

Cómo citar

Bargas J, Massaia C, Cisneros M, Robledo G, Navarro M, Pereira V, Tomasi R. Estudio de lesiones blancas orales potencialmente malignas. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba [Internet]. 15 de octubre de 2021 [citado 27 de enero de 2022];78(Suplemento). Disponible en:

<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/med/article/view/35777>

Más formatos de cita

Número

[Vol. 78 Núm. Suplemento \(2021\): Suplemento JIC XXII](#)

Sección

Investigación Básica (Resúmenes JIC)

Licencia



Esta obra está bajo una licencia internacional [Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

La Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba (RFCM) adhiere a la política de Acceso Abierto y no cobra cargos a los autores para publicar, ni tampoco a lectores para acceder a los artículos publicados.

## Información

[Para lectores/as](#)

[Para autores/as](#)

[Para bibliotecarios/as](#)

## Idioma

[English](#)

[Español \(España\)](#)

[Português \(Brasil\)](#)

## Palabras clave



Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba.  
Pabellón Perú - Ciudad Universitaria  
Facultad de Ciencias Médicas.  
**Universidad Nacional de Córdoba.**  
Argentina  
ISSN impreso: 0014-6722 | ISSN en línea: 1853-0605

[revistafcm@fcm.unc.edu.ar](mailto:revistafcm@fcm.unc.edu.ar)

Platform &  
workflow by  
OJS / PKP