

Omjer limfnih čvorova kod karcinoma usne šupljine – naša iskustva

Filip Matovinović¹, Igor Sočan^{1,2}, Filip Bacan¹, Darko Solter¹, Alan Pegan¹

¹KBC Sestre milosrdnice, Hrvatska, ²OB Pula, Pula, Hrvatska

filip.matovinovic@gmail.com

Kao jedan od značajnijih prognostičkih čimbenika u kirurškom liječenju karcinoma glave i vrata, pogotovo karcinoma usne šupljine, u posljednje se vrijeme pojavljuje omjer između patoloških limfnih čvorova na vratu i ukupnog broja limfnih čvorova na vratu (lymph node ratio) odstranjenih tijekom disekcije vrata. Istraživanja govore da, što je omjer manji (tj. što je veći ukupni broj čvorova u odnosu na patološke limfne čvorove), to je preživljenje bolje. U Hrvatskoj, prema našim saznanjima, istraživanja o omjeru čvorova kod bolesnika s karcinomima usne šupljine još nisu provedena. U našem istraživanju analizirali smo bolesnike operirane između 2017. i 2021. godine s karcinomom usne šupljine kod kojih je provedena ili elektivna ili selektivna/funkcionalna disekcija vrata s ili bez rekonstrukcije slobodnim režnjevima s minimalnim dvogodišnjim praćenjem, uz naglasak na poveznicu između preživljenja, omjera čvorova, ukupnog broja čvorova, te postojanja negativnih prognostičkih čimbenika (dubina invazije, limfovaskularna invazija, ektranodalna ekstenzija).

Ključne riječi: omjer limfnih čvorova, disekcija vrata, karcinom usne šupljine