

Для цитирования: Патышева М.Р., Фролова А.А., Брагина О.Д., Федоров А.А., Вострикова М.С., Гарбуков Е.Ю., Ямщикова П.С., Вашишти М., Чердынцева Н.В., Геращенко Т.С. Молекулярный фенотип клеток крови, ассоциированный с прогрессированием трижды негативного рака молочной железы. Сибирский онкологический журнал. 2023; 22(5): 197–204. – doi: 10.21294/1814-4861-2023-22-5-197-204

For citation: Patysheva M.R., Frolova A.A., Bragina O.D., Fedorov A.A., Vostrikova M.A., Garbukov E.Yu., Iamshchikov P.S., Vashisth M., Cherdynseva N.V., Gerashchenko T.S. Blood mononuclear cell molecular landscape associated with tumor progression in triple-negative breast cancer. Siberian Journal of Oncology. 2023; 22(5): 197–204. – doi: 10.21294/1814-4861-2023-22-5-197-204

BLOOD MONONUCLEAR CELL MOLECULAR LANDSCAPE ASSOCIATED WITH TUMOR PROGRESSION IN TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCER

**M.R. Patysheva^{1,2}, A.A. Frolova^{1,2}, O.D. Bragina^{1,3}, A.A. Fedorov¹,
M.A. Vostrikova¹, E.Yu. Garbukov¹, P.S. Iamshchikov^{1,2}, M. Vashisth^{1,2},
N.V. Cherdynseva^{1,2}, T.S. Gerashchenko¹**

Cancer Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences,
5, Kooperativny St., Tomsk, 634009, Russia¹

National Research Tomsk State University, 36, Lenina St., Tomsk, 634050, Russia²

Research Center of the National Research Tomsk Polytechnic University,
2, building 33, Lenin Ave., Tomsk, 634028, Russia³

Abstract

Introduction. Triple negative breast cancer is an aggressive clinical phenotype characterized by poor prognosis. Immune system plays an important role in the development, treatment response, and progression of solid tumor. The search for immune-related markers associated with the prediction of treatment efficacy and disease prognosis, and based on the use of high-resolution molecular techniques, is a promising area of research, the results of which can be translated into clinical practice. **Case description.** The molecular profile of blood mononuclear cells in a 48-year-old female patient with histologically proven triple negative breast cancer (Estrogen Receptor – 0; Progesteron Receptor – 0; Her2/neu – 0; GATA-3 – 0, Androgen Receptor – 0 and Ki67 – 70 %) was described. The patient did not respond to neoadjuvant chemotherapy with 4 cycles of paclitaxel + carboplatin followed by 2 cycles of adriamycin + cyclophosphamide. The patient underwent surgery. Disease progression (pelvic bone metastases) occurred 2 months after surgery. The features of blood lymphocytes and monocytes associated with a lack of response to neoadjuvant chemotherapy and disease progression were described. **Conclusion.** This clinical case demonstrates that sequencing of peripheral blood mononuclear cells can be used as a method for identifying predictive markers of therapy efficacy and developing personalized treatments for patients with triple negative breast cancer.

Keywords: triple-negative breast cancer, immune system, single cell sequencing, chemotherapy, progression.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ФЕНОТИП КЛЕТОК КРОВИ, АССОЦИИРОВАННЫЙ С ПРОГРЕССИРОВАНИЕМ ТРИЖДЫ НЕГАТИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

**М.Р. Патышева^{1,2}, А.А. Фролова^{1,2}, О.Д. Брагина^{1,3}, А.А. Федоров¹,
М.С. Вострикова¹, Е.Ю. Гарбуков¹, П.С. Ямщикова^{1,2}, М. Вашитш^{1,2},
Н.В. Чердынцева^{1,2}, Т.С. Геращенко¹**

Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Россия, 634009, г. Томск, пер. Кооперативный, 5¹
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»,
Россия, 634050, г. Томск, ул. Ленина, 36²

Научно-исследовательский центр «Онкотерапии», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Россия, 634028, г. Томск, пр-т Ленина, 2, стр. 33³

Аннотация

Актуальность. Трижды негативный подтип рака молочной железы характеризуется агрессивным течением и неблагоприятным прогнозом. Компоненты иммунной системы как непосредственные участники патогенеза играют роль в развитии, ответе на терапию и прогрессировании этой нозологии. Поиск маркеров иммунных клеток, ассоциированных с предсказанием эффективности лечения и прогнозом заболевания, основанный на применении молекулярных методов высокого разрешения, является перспективным направлением поискового исследования, результаты которого можно транслировать в клиническую практику. **Описание клинического случая.** Представлен первый опыт описания молекулярного профиля мононуклеарных клеток крови пациентки с трижды негативным раком молочной железы. Опухоль: инвазивная карцинома неспецифического типа с экспрессией: Estrogen Receptor – 0; Progesteron Receptor – 0; Her2/neu – 0; GATA-3 – 0, Androgen Receptor – 0, Ki67 – 70 % опухолевых клеток. Отмечено отсутствие ответа на неоадьюванную химиотерапию по схеме: 4 цикла «паклитаксел + + карбоплатин», с последующими 2 курсами АС (адриамицин + циклофосфам). Пациентке проведено оперативное лечение, через 2 мес после которого выявлены метастазы в кости таза. У пациентки описаны особенности лимфоцитов и моноцитов крови, которые могут быть ассоциированы с отсутствием ответа на неоадьюванную химиотерапию и прогрессированием заболевания. **Заключение.** Представленное клиническое наблюдение показывает, что метод секвенирования мононуклеарных клеток периферической крови можно использовать в качестве поискового для обнаружения предиктивных маркеров эффективности терапии и создания персонифицированной системы лечения пациенток с трижды негативным раком молочной железы.

Ключевые слова: трижды негативный рак молочной железы, иммунная система, секвенирование единичных клеток, химиотерапия, прогрессирование.

Introduction

Triple-negative breast cancer (TNBC) is diagnosed in 15–20 % of patients with newly diagnosed breast cancer. Unlike luminal and HER2-positive subtypes, TNBC is characterized by a lack of access points for currently available systemic treatment, aggressive disease course and unfavorable prognosis. In this regard, the main type of specialized treatment for TNBC is cytostatic therapy, which can be used in both neoadjuvant and adjuvant regimens [1]. The use of neoadjuvant chemotherapy (NACT) allows for the evaluation of tumor sensitivity for the ongoing treatment *in vivo* based on the degree of residual cancer burden along with an increased number of organ-preserving surgeries. To date, achievement of pathological complete response (pCR) is associated with a significant improvement in long-term treatment outcomes [2]. Despite the wide range of drugs used, it is not always possible to predict NACT response and pCR achievement [3].

The level of proliferative activity, the cancer grade, and the presence of mutations in the *BRCA1* gene are expected to be used as predictive criteria [2]. Due to insufficient prognostic significance, it is necessary to search for additional informative parameters to predict the treatment efficacy and disease outcome.

The immune system is a direct participant in tumor growth. Normally, the immune system works to recognize and eliminate transformed cells, but when tumor growth occurs, a pathological cycle that ultimately causes immune suppression is formed. Tumor cells escape immunological surveillance and form their own microenvironment in the process of interaction with the body. Immune cells of the tumor microenvironment and circulating immune cells are known to be linked. Circulating mononuclear cells, which include populations of lymphocytes and monocytes, can be used as markers for predicting treatment efficacy or disease prognosis [4–6]. In this paper, we present our




Fig. 1. Clusters (populations) of mononuclear blood cells in the patient with TNBC before treatment.

Note: created by the authors
Рис. 1. Распределение мононуклеарных клеток крови по кластерам (популяциям) у пациентки с ТНРМЖ до начала лечения.
Примечание: рисунок выполнен авторами

experience describing the mononuclear cell phenotype using single cell resolution in a patient with TNBC which demonstrated poor response to NACT and the evidence of distant metastases within the first year of treatment.

Case presentation

Patient W., 48 years old, referred to the Department of General Oncology of the Cancer Research Institute in June 2022 with complaints of a mass in the left side of the chest wall. According to the results of histological examination, she was diagnosed with invasive breast carcinoma (cT3cN1cM0/pT3pN1cM0) IIIA.

Past medical history. The patient found a mass in December 2021 and consulted a physician. According to the results of an ultrasound scan dated April 13, 2022: 4.0×4.2 cm mass in the lining of the pectoralis major muscle. Results of spiral computer tomography from April 18, 2022 showed a mass of the pectoralis major muscle on the right 4.9×3.6×4.3 cm. She applied to the Cancer Research Institute for further examination and determination of treatment tactics.

Microscopic examination of the tissue revealed tumor cells forming small islands and clusters in the fibrous stroma. There were areas of necrosis. Immunohistochemical study of the tumor was performed using a Leica Bond Max immune-analyzer. The immunohistochemical analysis revealed: expression of Estrogen Receptor (clone 1D5) – 0; Progesteron receptor (clone PgR636, Dako) – 0; c-erB-2 (Her2/neu) (Polyclonal Rabbit, Dako) – 0; GATA-3 (clone L50-823, Cell Marque) – 0, Androgen Receptor (clone AR441, Dako): 0; Ki67 (clone SP6, Cell Marque) – 70 % of tumor cells. Based on the combined morphological data and immunohistochemical profile of the tumor cells, the diagnosis was: invasive breast carcinoma, NOS (8500/3) G2. Clinical blood test: white blood cells – 5.22 ×10⁹/L; red blood cells – 4.44 ×10¹²/L; hemoglobin – 112 g/L; platelets – 366 × 10⁹/L; seg-

mented blood cells – 68 %; lymphocytes – 23 %; monocytes – 7 %; eosinophils – 2 %; hematocrit – 35 %; ESR – 39 mm/h.

Patient gave written informed consent in accordance with the Declaration of Helsinki on 29 June 2022 (the approval number is 25). The study was approved by the review board of the Cancer Research Institute, Tomsk NRMC on 29 August 2022 (the approval number is 16).

After diagnosis and before NACT, peripheral venous blood was taken from the patient, followed by molecular profiling of blood mononuclear cells. Molecular profiling was performed using single-cell RNA sequencing based on BD Rhapsody technology (BD Bioscience, USA). The obtained data were processed using Seurat 4.2.0 software package (<https://satijalab.org/seurat/>). The patient was typed into clusters corresponding to blood cell populations (Fig. 1). A total of 11 clusters were detected, including CD14 and CD16 monocytes, natural killer cells, naive CD4 and CD8 cells, CD4 memory and cytotoxic CD4 cells, cytotoxic CD8, T regulatory cells, B cells and a small admixture of erythroid cells (Fig. 1). A decrease in cytotoxic T cells was observed in the patient under study compared to that of healthy donors as described in the literature (Table 1). In addition, there was a decrease in the CD14+ and CD16+ monocyte populations among all blood mononuclear cells compared to the normal proportion of these cells (Table 1). The classic CD14+ monocyte population was characterized by gene expression of both the standard monocyte marker CD14 and FCN1, and components of the histocompatibility complex HLA-DRA and CD74, monocyte extravasation factors S100A9 and S100A12, proinflammatory factors IL1B and galectin-1 (LGALS1), and transforming growth factor TGFB1 (Log2FC≥1.3, FDR≤0.05) (Fig. 2). The minor nonclassical CD16+ monocyte population was characterized by expression of the major markers of nonclassical monocytes FCGR3A,




Fig. 2. Molecular phenotype characteristics of blood mononuclear populations of the patient with TNBC before treatment.

Note: created by the authors
 Рис. 2. Характеристика молекулярного фенотипа популяций мононуклеаров крови пациентки с ТНРМЖ до начала лечения.
 Примечание: рисунок выполнен авторами

FCER1G and *FCN1*, components of the histocompatibility complex *HLA-DPA1*, *HLA-DRA* and *CD74*, galectins *LGALS1* and *LGALS9*, interferon response factors *IFITM3* and *IFITM2* as well as transcription factor *LYN*, which is involved in monocyte response to major monocyte migration factor (4) ($\text{Log2FC} \geq 1.1$, $\text{FDR} \leq 0.05$) (Fig. 2). Cytotoxic T lymphocytes that contained an increased number of transcripts of granzymes *GNLY*, *NKG7*, *GZMH*, *GZMA* ($\text{Log2FC} \geq 1.1$, $\text{FDR} \leq 0.05$) and also had a hyperexpressed *CCL5* chemokine ligand gene ($\text{Log2FC} \geq 1.3$, $\text{FDR} \leq 0.05$) (Fig. 2). Interestingly, *CCL5* expression was also 8-fold elevated in the CD8 T-killer population ($\text{Log2FC} \geq 1.3$, $\text{FDR} \leq 0.05$). The cluster of regulatory T cells performing immune response suppression was characterized by the expression, as follows, of the *RGS1*, *FOXP3*, and *CTLA4* genes characteristic of this cell population ($\text{Log2FC} \geq 1.0$, $\text{FDR} \leq 0.05$) (Fig. 2).

The patient was treated with 4 cycles of NACT according to the "paclitaxel + carboplatin" scheme, followed by 2 courses according to the "AC" scheme (adriamycin + cyclophosphamide). Due to the absence of the effect of NACT (an increase in the size of the tumor against the background of therapy), a radical mastectomy of the left breast was performed on 12/15/2022. Histological examination of the surgical

material: *Invasive carcinoma of a non-specific type, G3* ($3+3+2=8/9$) with necrosis of tumor tissue in the central parts. *RCB-III* (3.9965). No neural invasion was detected. The minimum distance to the tumor is 2 mm (blue paint). Lymph nodes of cellulose (9 l/y) in 1 of 9 metastatic lesion (4 mm). *ypT3N1Mx*. *ICD-o code 8500/3*. Taking into account the lack of effect from NACT, the patient was recommended to take capecitabine in the standard dosage in the adjuvant regimen. Computed tomography revealed metastases in the pelvic bone. The patient was transferred to palliative care.

Discussion

Analysis of the parameters of the immune system components is difficult due to its high degree of heterogeneity. Molecular markers that characterize the functional status of blood cell populations may be associated with the response to treatment. The emergence of new high-tech methods of analysis allows the study of a large number of parameters with a high level of resolution (up to single cells). In our study, we found a reduced content of cytotoxic CD4 T cells and monocyte classic (CD14+) and non-classic (CD16+) populations in the patient. The latter observation may be related to the migration of monocytes

Table/Таблица

Cell population distribution among blood mononuclear cells
Распределение клеточных популяций среди мононуклеарных клеток крови

Parameteres/Параметры	Study patient/ Пациентка Ж.	Healthy volunteers/ Здоровые лица	Reference/Источник
Naive CD4 T cells/ Наивные CD4	28,9	25,0–40,0	[11]
Memory CD4 T cells/ CD4 памяти	20,22	15,0–20,0	[12]
Regulatory CD4 T cells (Treg)/ Регуляторные CD4	1,6	0,7–3,6	[13]
Cytotoxic CD4 T cells/ Цитотоксические CD4	4,3*	10,0–20,0	[14]
Naive CD8 T cells/ Наивные CD8	5,7	3,0–10,5	[15]
Cytotoxic CD8 T cells/ CD8 киллеры	20,5	1,55–27,0	[16]
B lymphocyte/ В-лимфоциты	4,3	3,5–13,5	[16]
Natural killer cell/ Натуральные киллеры	5,79	3,5–9,0	[16]
CD14 monocytes/ CD14 моноциты	7,72*	10,0–30,0	[17]
CD16 monocytes/ CD16 моноциты	0,2*	0,5–4,5	[17]

Note: *— indicator is lower than that of healthy volunteers; created by the authors.

Примечание: * — показатель ниже, чем у здоровых добровольцев; таблица составлена авторами.

from the blood into the tumor tissue, which is known to produce circulating cell recruitment factors [7]. In transcriptome marker analysis, cytotoxic CD4 T cells were characterized by hyperexpression of the *CCL5* gene, responsible for maintaining tumor cell growth and chemoresistance (Fig. 2) [8]. Monocytes showed expression of *S100A9* and *S100A12* factors (for CD14+ population) and *LYN* (for CD16+ population), which related to the ability of monocytes for tissue migration and their subsequent differentiation into tissue macrophages, supporting tumor growth [9, 10]. Thus, circulating immune cells demonstrate the ability to support tumor growth, which may be associated with the progression of TNBC in the study patient.

Conclusion

In this case, the molecular phenotype of lymphocytes and blood monocytes of a TNBC patient with a poor response to NACT and progression was described for the first time.

The failure of some parts of the immune response was shown. The presented clinical observation demonstrates that the sequencing of peripheral blood mononuclear cells can be used as a method for identifying predictive markers of therapy efficacy and developing personalized treatment for patients with TNBC. The future prospects for this research are to expand the sample with the formation of groups of patients between responders or non-responders to NACT.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Garcia-Teijido P., Cabal M.L., Fernández I.P., Pérez Y.F. Tumor-infiltrating Lymphocytes in Triple Negative Breast Cancer: The Future of Immune Targeting. Clin Med Insights Oncol. 2016; 10(S1): 31–9. doi: 10.4137/CMO.S34540.
2. Zarotti C., Papasotiropoulos B., Elfgen C., Dedes K., Vorburger D., Pestalozzi B., Trojan A., Varga Z. Biomarker dynamics and prognosis in breast cancer after neoadjuvant chemotherapy. Scientific reports. 2022; 12(1): 91. doi: 10.1038/s41598-021-04032-x.
3. Loi S., Sirtaine N., Piette F., Salgado R., Viale G., Van Eenoo F., Rouas G., Francis P., Crown J.P., Hitre E., de Azambuja E., Quinaux E., Di Leo A., Michiels S., Piccart M.J., Sotiriou C. Prognostic and predictive value of tumor-infiltrating lymphocytes in a phase III randomized adjuvant breast cancer trial in node-positive breast cancer comparing the addition of docetaxel to doxorubicin with doxorubicin-based chemotherapy: BIG 02-98. J Clin Oncol. 2013; 31(7): 860–7. doi: 10.1200/JCO.2011.41.0902.
4. Lin G.N., Peng J.W., Liu D.Y., Xiao J.J., Chen Y.Q., Chen X.Q. Increased lymphocyte to monocyte ratio is associated with better prognosis in patients with newly diagnosed metastatic nasopharyngeal carcinoma receiving chemotherapy. Tumour Biol. 2014; 35(11): 10849–54. doi: 10.1007/s13277-014-2362-6.
5. Peng Y., Chen R., Qu F., Ye Y., Fu Y., Tang Z., Wang Y., Zong B., Yu H., Luo F., Liu S. Low pretreatment lymphocyte/monocyte ratio is associated with the better efficacy of neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients. Cancer Biol Ther. 2020; 21(2): 189–96. doi: 10.1080/15384047.2019.1680057.
6. Lu C., Zhou L., Ouyang J., Yang H. Prognostic value of lymphocyte-to-monocyte ratio in ovarian cancer: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019; 98(24). doi: 10.1097/MD.00000000000015876.
7. Geiger R., Duhen T., Lanzavecchia A., Sallusto F. Human naive and memory CD4+ T cell repertoires specific for naturally processed antigens analyzed using libraries of amplified T cells. J Exp Med. 2009; 206(7): 1525–34. doi: 10.1084/jem.20090504.
8. Nausch N., Bourke C.D., Appleby L.J., Rujeni N., Lantz O., Trottein F., Midzi N., Mduluza T., Mutapi F. Proportions of CD4+ memory T cells are altered in individuals chronically infected with Schistosoma haematobium. Sci Rep. 2012; 2: 472. doi: 10.1038/srep00472.
9. Duggleby R., Danby R.D., Madrigal J.A., Saudemont A. Clinical Grade Regulatory CD4+ T Cells (Tregs): Moving Toward Cellular-Based Immunomodulatory Therapies. Front Immunol. 2018; 9: 252. doi: 10.3389/fimmu.2018.00252.

10. Hashimoto K., Kouno T., Ikawa T., Hayatsu N., Miyajima Y., Yabu-kami H., Terooatea T., Sasaki T., Suzuki T., Valentine M., Pascarella G., Okazaki Y., Suzuki H., Shin J.W., Minoda A., Taniuchi I., Okano H., Arai Y., Hirose N., Carninci P. Single-cell transcriptomics reveals expansion of cytotoxic CD4 T cells in supercentenarians. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2019; 116(48): 24242–51. doi: 10.1073/pnas.1907883116.
11. Pulko V., Davies J.S., Martinez C., Lanteri M.C., Busch M.P., Diamond M.S., Knox K., Bush E.C., Sims P.A., Sinari S., Billheimer D., Haddad E.K., Murray K.O., Wertheimer A.M., Nikolich-Žugich J. Human memory T cells with a naïve phenotype accumulate with aging and respond to persistent viruses. *Nat Immunol.* 2016; 17(8): 966–75. doi: 10.1038/ni.3483.
12. Kleiveland C.R. Peripheral Blood Mononuclear Cells. In: Verhoeckx K., Cotter P., López-Expósito I., Kleiveland C., Lea T., Mackie A., Requena T., Swiatecka D., Wicher H., editors. *The Impact of Food Bioactives on Health: in vitro and ex vivo models [Internet].* Cham (CH): Springer; 2015. Chapter 15.
13. Патышева М.Р., Стакхеева М.Н., Ларионова И.В., Тара́банская Н.А., Григорьева Е.С., Слонимская Е.М., Кжышковска Ю.Г., Чердынцева Н.В. Моноциты при злокачественных новообразованиях: перспективы и точки приложения для диагностики и терапии. Бюллетень сибирской медицины. 2019; 18(1): 60–75. [Patysheva M.R., Stakheeva M.N., Larionova I.V., Tarabanovskaya N.A., Grigorieva E.S., Slonimskaya E.M., Kzhyskowska J.G., Cherdynseva N.V. Monocytes and cancer: promising role as a diagnostic marker and application in therapy. Bulletin of Siberian Medicine. 2019; 18(1): 60–75. (in Russian)]. doi: 10.20538/1682-0363-2019-1-76-83.]
14. Kohli K., Pillarisetty V.G., Kim T.S. Key chemokines direct migration of immune cells in solid tumors. *Cancer Gene Ther.* 2022; 29(1): 10–21. doi: 10.1038/s41417-021-00303-x.
15. Aldinucci D., Borghese C., Casagrande N. The CCL5/CCR5 Axis in Cancer Progression. *Cancers (Basel).* 2020; 12(7): 1765. doi: 10.3390/cancers12071765.
16. Das P., Pal S., Oldfield C.M., Thillai K., Bala S., Carnevale K.A., Cathecart M.K., Bhattacharjee A. A PKC β -LYN-PYK2 Signaling Axis Is Critical for MCP-1-Dependent Migration and Adhesion of Monocytes. *J Immunol.* 2021; 206(1): 181–92. doi: 10.4049/jimmunol.1900706.
17. Larionova I., Kazakova E., Gerashchenko T., Kzhyskowska J. New Angiogenic Regulators Produced by TAMs: Perspective for Targeting Tumor Angiogenesis. *Cancers (Basel).* 2021; 13(13): 3253. doi: 10.3390/cancers13133253.

Поступила/Received 05.03.2023

Одобрена после рецензирования/Revised 11.04.2023

Принята к публикации/Accepted 25.04.2023

ABOUT THE AUTHORS

Marina R. Patysheva, Junior Researcher of the Laboratory of Cancer Progression Biology, Cancer Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russia); Junior Researcher of the Laboratory of Translational Cellular and Molecular Biomedicine, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russia). E-mail: Patysheva_mr@onco.tnime.ru. Researcher ID (WOS): Q-9364-2017. Author ID (Scopus): 57200569624. ORCID: 0000-0003-2865-7576.

Anastasia A. Frolova, Junior Researcher of the Laboratory of Immunology and Molecular Oncology, Cancer Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences; Laboratory Assistant of the Laboratory of Translational Cellular and Molecular Biomedicine, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russia). Researcher ID (WOS): AAF-5212-2021. Author ID (Scopus): 57218917496. ORCID: 0000-0003-3297-1680.

Olga D. Bragina, MD, DSc, Leader Researcher of the Nuclear Medicine Department, Cancer Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences; Senior Researcher, Research Center of the National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russia). Researcher ID (WOS): E-9732-2017. Author ID (Scopus): 57190936256. ORCID: 0000-0001-5281-7758

Anton A. Fedorov, Junior Researcher of the Laboratory of Cancer Progression Biology, Cancer Research institute, Tomsk National Research medical center, Russian academy of sciences (Tomsk, Russia). Researcher ID (WOS): AAG-8911-2020. Author ID (Scopus): 57211136209. ORCID: 0000-0002-5121-2535.

Maria A. Vostrikova, Junior Researcher of the Department of General Oncology, Cancer Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russia). ORCID: 0000-0002-0256-5342.

Evgeniy Yu. Garbukov, MD, PhD, Senior Researcher of the Department of General Oncology, Cancer Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russia). Researcher ID (WOS): C-8299-2012. Author ID (Scopus): 6504255124. ORCID: 0000-0002-2917-8158.

Pavel S. Iamshikov, Bioinformatician of the Laboratory of Cancer Progression Biology, Cancer Research institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences; Laboratory Assistant of the Laboratory of Translational Cellular and Molecular Biomedicine, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russia). Researcher ID (WOS): AAE-3883-2022. Author ID (Scopus): 57468957700. ORCID: 0000-0002-0646-6093.

Mrinal Vashisth, Consultant Bioinformatician of the Laboratory of Cancer Progression Biology, Cancer Research institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences; graduate student of the Department of Psychology, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russia). ORCID: 0000-0002-2205-075X

Nadezhda V. Cherdynseva, DSc, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, Head of the Laboratory of Molecular Oncology and Immunology, Cancer Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences; Senior Researcher of the Laboratory of Translational Cellular and Molecular Biomedicine, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russia). Researcher ID (WOS): C-7943-2012. Author ID (Scopus): 6603911744. ORCID: 0000-0003-1526-9013.

Tatiana S. Gerashchenko, Researcher of the Laboratory of Cancer Progression Biology, Cancer Research institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russia). Researcher ID (WOS): A-7011-2014 Author ID (Scopus): 55948412900. ORCID: 0000-0002-2917-8158.

AUTHOR CONTRIBUTIONS

Marina R. Patysheva: experiment undertaking, project design, experiment undertaking, manuscript drafting.

Anastasia A. Frolova: experiment undertaking.

Olga D. Bragina: patient recruitment, selection of clinical material, manuscript drafting.

Anton A. Fedorov: experiment undertaking, data analysis.

Maria S. Vostrikova: patient recruitment.

Evgeniy Yu. Garbukov: project design.

Pavel S. Iamshikov: bioinformatic analyses.

Mrinal Vashisth: bioinformatic analyses, manuscript drafting.

Nadezhda V. Cherdynseva: project design, experiment workflow design.

Tatiana S. Geraschenko: project design, experiment undertaking, manuscript drafting, project supervision and management.

All authors approved the final version of the manuscript prior to publication and agreed to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work were appropriately investigated and resolved.

Funding

The work was supported by the Russian Science Foundation grant «Functional makeup of immune cells as a factor of breast cancer chemotherapy efficacy», No. 22-75-10128.

Conflict of interest

Prof. N.V. Cherdynseva is a deputy chief-editor of Siberian Journal of Oncology. The authors are not aware of any other potential conflict of interests related to this manuscript.

Compliance with Ethical Standards

The study was conducted in accordance with ethical principles outlined in the Declaration of Helsinki approved by Ethics Committee of Cancer Research Institute, Tomsk NRMC (5, Kooperativny St., Tomsk, 634009, Russia), protocol No. 16 dated August 29, 2022

Voluntary informed consent

Written informed voluntary consent was obtained from the patient for the publication of a case report and facial photographs in medical journals (date of signing 29/06/2022).

Acknowledgements

The study was carried out using the equipment of Tomsk regional common use center and The Core Facility of Medical Genomics at Tomsk NRMC.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Патышева Марина Ринатовна, младший научный сотрудник лаборатории биологии опухолевой прогрессии, Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук; младший научный сотрудник лаборатории трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (г. Томск, Россия). E-mail: Patysheva_mr@onco.tnimc.ru. SPIN-код: 5714-4611. Researcher ID (WOS): Q-9364-2017. Author ID (Scopus): 57200569624. ORCID: 0000-0003-2865-7576.

Фролова Анастасия Алексеевна, младший научный сотрудник лаборатории иммунологии и молекулярной онкологии, Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук; лаборант лаборатории трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (г. Томск, Россия). SPIN-код: 8092-0070. Researcher ID (WOS): AAF-5212-2021. Author ID (Scopus): 57218917496. ORCID: 0000-0003-3297-1680.

Брагина Ольга Дмитриевна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения радионуклидной диагностики, Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук; старший научный сотрудник, Научно-исследовательский центр «Онкотерапии», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (г. Томск, Россия). SPIN-код: 7961-5918. Researcher ID (WOS): E-9732-2017. Author ID (Scopus): 57190936256. ORCID: 0000-0001-5281-7758.

Федоров Антон Андреевич, младший научный сотрудник лаборатории биологии опухолевой прогрессии, Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук (г. Томск, Россия). SPIN-код: 1315-8100. Researcher ID (WOS): AAG-8911-2020. Author ID (Scopus): 57211136209. ORCID: 0000-0002-5121-2535.

Вострикова Мария Александровна, младший научный сотрудник отделения общей онкологии, Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук (г. Томск, Россия). ORCID: 0000-0002-0256-5342.

Гарбуков Евгений Юрьевич, старший научный сотрудник отделения общей онкологии, Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук (г. Томск, Россия). SPIN-код: 3630-2324. Researcher ID (WOS): C-8299-2012. Author ID (Scopus): 6504255124. ORCID: 0000-0002-2917-8158.

Ямщикова Павел Сергеевич, биоинформатик, лаборатория биологии опухолевой прогрессии, Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук; лаборант лаборатории трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины, аспирант кафедры химии, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (г. Томск, Россия). SPIN-код: 9624-3257. Researcher ID (WOS): AAE-3883-2022. Author ID (Scopus): 57468957700. ORCID: 0000-0002-0646-6093.

Вашитш Mrinal, биоинформатик, лаборатория биологии опухолевой прогрессии, Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук; аспирант кафедры физиологии, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (г. Томск, Россия). ORCID: 0000-0002-2205-075X.

Чердынцева Надежда Викторовна, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующая лабораторией молекулярной онкологии и иммунологии, Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный

исследовательский медицинский центр Российской академии наук; ведущий научный сотрудник, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (г. Томск, Россия). SPIN-код: 5344-0990. Researcher ID (WOS): C-7943-2012. Author ID (Scopus): 6603911744. ORCID: 0000-0003-1526-9013.

Геращенко Татьяна Сергеевна, научный сотрудник лаборатории биологии опухолевой прогрессии, Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук (г. Томск, Россия). SPIN-код: 7900-9700. Researcher ID (WOS): A-7011-2014. Author ID (Scopus): 55948412900. ORCID: 0000-0002-2917-8158.

ВКЛАД АВТОРОВ

Патышева Марина Ринатовна: планирование и проведение эксперимента, написание статьи.

Фролова Анастасия Алексеевна: проведение эксперимента, анализ данных.

Брагина Ольга Дмитриевна: ведение пациентки, написание статьи.

Федоров Антон Андреевич: проведение эксперимента.

Вострикова Мария Александровна: ведение пациентки.

Гарбуков Евгений Юрьевич: планирование эксперимента.

Ямщиков Павел Сергеевич: биоинформационная обработка, подготовка рисунков.

Вашитши Мринал: биоинформационная обработка, подготовка рукописи.

Чердынцева Надежда Викторовна: разработка концепции научной работы, планирование эксперимента.

Геращенко Татьяна Сергеевна: планирование и проведение эксперимента, написание статьи, куриация проекта.

Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой части работы.

Финансирование

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ «Функциональный портрет иммунных клеток как фактор эффективности химиотерапии рака молочной железы», №22-75-10128.

Конфликт интересов

Автор Чердынцева Н.В. (доктор медицинских наук, профессор) является заместителем главного редактора «Сибирского онкологического журнала». Авторам неизвестно о каком-либо другом потенциальном конфликте интересов, связанном с этой статьей.

Соответствие принципам этики

Проведенное исследование соответствует стандартам Хельсинкской декларации, одобрено независимым этическим комитетом Научно-исследовательского института онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук (пер. Кооперативный, 5, г. Томск, 634009, Россия), протокол № 16 от 29.08.2022.

Информированное согласие

От пациента получено письменное информированное добровольное согласие на публикацию описания клинического случая и публикацию фотоматериалов в медицинском журнале, включая его электронную версию (дата подписания 29.06.2022).

Благодарности

Работы проводились на оборудовании Томского регионального центра коллективного пользования (ТРЦКП) и центра коллективного пользования «Медицинская геномика» Томского НИМЦ.