



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA

**Severidad de la preeclampsia como factor asociado a hemorragia
postparto en gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente de
Trujillo, 2014-2016.**

TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE MEDICO CIRUJANO

AUTORA:

Tantalean Soto, Karen

ASESOR TÉCNICO:

Dr. Juan Carlos Rojas Ruiz

ASESORA METODOLOGICA:

Dra. Evelyn Goicochea Ríos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Salud materno infantil

TRUJILLO – PERÚ

2017

FIRMA DEL JURADO



PRESIDENTE(A)

SECRETARIO(A)

VOCAL

DEDICATORIA

A Dios por enseñarme el verdadero amor que un padre le tiene a un hijo, por darme las fuerzas necesarias para enfrentar las pruebas que me pone la vida y salir vencedora en su nombre.

A mi madre por demostrarme que un cáncer no te detiene la vida, por ser luchadora y perseverante y por ser simplemente la mejor madre que uno pueda pedir.

A mis maestros médicos que me brindaron sus conocimientos durante estos años de formación profesional, y finalmente lograr mi anhelo de ser médico.

KAREN TANTALEÁN SOTO.

AGRADECIMIENTO

Primero agradecer a Dios, por enseñarme a valorar cada día de mi vida en familia, por mostrarme el camino correcto para lograr el éxito moral y profesional y pedirle que continúe guiándome para ser un profesional de calidad humana, y darme la sabiduría necesaria para ayudar a mis futuros pacientes y cumplir con ética y moral mi profesión.

Agradecer a la Dra. Evelyn Goicochea Ríos, por dirigirme para culminar la presente investigación para el logro de finalizar de mi formación universitaria de pregrado.

KAREN TANTALEAN SOTO.

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo KAREN ABSONIA TANTALEAN SOTO, identificado con DNI N° 70910650, a efecto de dar cumplimiento con la normatividad vigente, de acuerdo con los considerandos del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, de la Escuela de Medicina, declaro bajo juramento que el expediente que presento es auténtico y se ajusta a la veracidad.

De la misma manera, expreso que toda la documentación fue elaborada respetando y refiriendo la autoría correspondiente de los artículos y libros. En tal sentido me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Trujillo, 20 de DICIEMBRE del 2017

KAREN TANTALEAN SOTO

PRESENTACIÓN

Médicos jurados, integrantes del comité calificador, Presento ante ustedes, la Tesis Titulada: **Severidad de la preeclampsia como factor asociado a hemorragia postparto en gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo 2014-2016**, con la finalidad de establecer si la severidad de la preeclampsia representan algún grado de factor asociado a la hemorragia postparto, en el Hospital Regional Docente de Trujillo, en el periodo mencionado. Es así que en cumplimiento al Reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, presento ante ustedes, el presente trabajo para la obtención del grado académico de Bachiller en Medicina Humana esperando su conformidad y aprobación.

KAREN TANTALEAN SOTO.

INDICE

PAGINAS PRELIMINARES

Página de jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimientos	iv
Declaración de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
Resumen	viii
Abstract	ix

I.INTRODUCCIÓN

1.1 Realidad problemática	10
1.2 Trabajos previos	11
1.3 Teorías relacionadas al tema	13
1.4 Formulación del problema	16
1.5 Justificación del estudio	17
1.6 Hipótesis	17
1.7 Objetivos	17

II.MÉTODO

2.1 Diseño de investigación	17
2.2 Variables, operacionalización	18
2.3 Población, muestra y muestreo	19
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos	21
2.5 Métodos de análisis de datos	21
2.6 Aspectos éticos	23

III.RESULTADOS

IV. DISCUSIÓN

V. CONCLUSIONES

VI.RECOMENDACIONES

VII.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

VIII. ANEXOS

RESUMEN

- El objetivo de la presente investigación fue: Determinar si la preeclampsia es un factor asociado a hemorragia postparto en gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo.
- Material y métodos: El diseño fue caso control, *Se consideraron 34 casos* (paciente con hemorragia postparto) y *68 controles* (paciente sin hemorragia postparto).
- Resultados: Se obtuvo una frecuencia de preeclampsia con signos de severidad de 12.7% del total, pero el 23.5% se encontró en los casos y en el 7.4% de los controles. La preeclampsia es determinada como factor de riesgo ya que su valor OR fue de 3.88, resultando significativo ($p < 0.05$) pues su intervalo confidencial de OR es superior a la unidad. En casos de hemorragia postparto, **78.5%** de las pacientes fueron cesareadas, una cifra superior que en las que no presentaron hemorragia post parto que fue de **54.4%** encontrándose diferencias estadísticas (**$p = 0.024$**). Referente a la edad materna ésta fue una edad promedio de **24.8** años en los casos y **27.7** años en los controles sin diferencias estadísticas, mientras que la **paridad** en los **casos** fue **1.14** y en los controles **1.62** sin diferencias estadísticas.
- Conclusiones: La severidad de la preeclampsia se asocia a hemorragia post parto.
- **Palabras Clave:** Preeclampsia, hemorragia postparto

ABSTRACT

- The objective of the present investigation was: To determine whether preeclampsia is a factor associated with postpartum hemorrhage in pregnant women attended at the Regional Teaching Hospital of Trujillo.
- Material and methods: Design was case control, 34 cases (patient with postpartum haemorrhage) and 68 controls (patient without postpartum hemorrhage) were considered.
- Results: A frequency of preeclampsia with signs of severity of 12.7% of the total was obtained, but 23.5% was found in the cases and in 7.4% of the controls. Preeclampsia is determined as a risk factor since its OR value was 3.88, being significant ($p < 0.05$) as its confidential OR interval is greater than one unit. In cases of postpartum hemorrhage, 78.5% of the patients were cesarean, a higher number than in those who did not present postpartum hemorrhage that was 54.4 % finding statistical differences ($p = 0.024$). Regarding maternal age, this was an average age of 24.8 years in the cases and 27.7 years in the controls without statistical differences, while the parity in the cases was 1.14 and in the controls 1.62 without statistical differences.
- Conclusions: The severity of preeclampsia is associated with postpartum hemorrhage.
- Key Words: preeclampsia, postpartum hemorrhage.