

**Subtipos de esquizofrenia****Sub-types of schizophrenia**

DOI:10.34119/bjhrv3n5-066

Recebimento dos originais:08/08/2020

Aceitação para publicação: 10/09/2020

**Priscila Luzia Pereira Nunes**

Licenciada em Letras/Inglês.Acadêmica de Medicina do 6º período da Universidade Paranaense-Unipar. Praça Mascarenhas de Moraes, 4282 - Centro, Umuarama - PR, 87502-210-Universidade Paranaense,Unipar.  
e-mail: prilu31@gmail.com

Especialista em Psicologia do Trânsito-Universidade Estadual de Maringá.Acadêmica do 6º período de Medicina da Universidade Paranaense-Unipar.Praça Mascarenhas de Moraes, 4282 - Centro, Umuarama - PR, 87502-210-Universidade Paranaense,Unipar.  
e-mail: taziane-mar@hotmail.com

**Cleidi Boing Voltolini**

Pós graduada em Acreditação em serviço de saúde pela Unopar Londrina, Farmácia de Manipulação pela Univali e MBA gestão empresarial pela FGV. Acadêmica do 2º período de Medicina da Universidade Paranaense-Unipar.Av Rio Grande do Sul, 4235 ap 1303. Ed Torre Sul, Umuarama-PR, 87502-400.  
e-mail: cleidiboing@gmail.com

**Eliézer Ferreira da Silva**

Graduado em Farmácia pela Universidade Paranaense-Unipar.Acadêmico de Medicina do 2º período da Universidade Paranaense-Unipar. Praça Mascarenhas de Moraes, 4282 - Centro, Umuarama - PR, 87502-210-Universidade Paranaense-Unipar.  
e-mail: eliezer.s@edu.unipar.br

**Daniela de Cassia Faglioni Boleta-Ceranto**

Doutora em Odontologia área de Concentração Fisiologia Oral – UNICAMP. Professora Titular dos Cursos de Odontologia e Mestrado em Plantas Medicinais e Fitoterápicos da Universidade Paranaense – UNIPAR. Avenida Brasil, 4374 - Edifício Xavier, apartamento 12. Umuarama - PR - CEP:87501-000.  
e-mail: dcboleta@prof.unipar.br

**RESUMO**

**INTRODUÇÃO:** A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico complexo, caracterizado por distorções do pensamento, da percepção de si e da realidade externa. É uma psicose crônica idiopática de início precoce, associada a uma série de sintomas e sinais como alucinações, apatia, isolamento social e até suicídio, acometendo cerca de 1% da população mundial. **OBJETIVO:** Revisar a literatura sobre os subtipos de esquizofrenia. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura com buscas nas bases de dados Lilacs e Medline. Foram cruzados com o operador booleano *and* os descritores "esquizofrenia" e "tipos de esquizofrenia". Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em português,

entre os anos de 2010 a 2020 e disponíveis na íntegra. Como critério de exclusão considerou-se a não pertinência ao tema. Foram identificadas 20 publicações que contemplavam os critérios e 4 foram utilizadas. **RESULTADOS:** A esquizofrenia é subdividida em tipos, na qual cada uma possui características peculiares. A Esquizofrenia Paranóide caracteriza-se pela presença de ideias delirantes, frequentemente de perseguição, em geral acompanhadas de alucinações e de perturbações das percepções. Seus portadores são indivíduos tensos, desconfiados, hostis e muito agressivos, podendo cometer atos de violência. A Esquizofrenia Hebefrênica configura-se pela presença proeminente de uma perturbação dos afetos. Além disso, o pensamento é desorganizado, o discurso incoerente e há uma tendência ao isolamento social. A Esquizofrenia Catatônica é caracterizada por distúrbios psicomotores proeminentes que podem alternar entre extremos tais como hiperkinesia e estupor, ou entre a obediência automática e o negativismo. A Esquizofrenia Residual é caracterizada pela presença persistente de sintomas “negativos”, como alterações no comportamento, nas emoções e na interação social, embora não forçosamente irreversíveis e não com a mesma frequência dos outros tipos de esquizofrenia. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portanto, conhecer a esquizofrenia é de suma relevância na área da saúde para entendimento da doença em si bem como seus subtipos, o que permite o acompanhamento adequado do paciente e o tratamento que pode ser composto pela terapêutica medicamentosa e psicoterápica com o objetivo de otimizar a qualidade de vida do indivíduo acometido bem como a sociabilidade ao paciente e sua família.

**Palavras-chave:** Esquizofrenia; Subtipos de esquizofrenia; Transtorno psiquiátrico.

#### **ABSTRACT**

**INTRODUCTION:** Schizophrenia is a complex psychiatric disorder, characterized by distortions in thinking, self-perception and external reality. It is an idiopathic chronic psychosis of early onset, associated with a series of symptoms and signs such as hallucinations, apathy, social isolation and even suicide, affecting about 1% of the world population. **OBJECTIVE:** To review the literature on schizophrenia subtypes. **METHODOLOGY:** An integrative literature review was carried out with searches in the Lilacs and Medline databases. They were crossed with the Boolean operator and the descriptors "schizophrenia" and "types of schizophrenia". The inclusion criteria were: articles published in Portuguese, between the years 2010 to 2020 and available in full. As an exclusion criterion, non-relevance to the topic was considered. Twenty publications were identified that met the criteria and 4 were used. **RESULTS:** Schizophrenia is subdivided into types, each of which has its own peculiar characteristics. Paranoid Schizophrenia is characterized by the presence of delusional ideas, often of persecution, usually accompanied by hallucinations and disturbances of perceptions. Its carriers are tense, suspicious, hostile and very aggressive individuals, who may commit acts of violence. Hebephrenic Schizophrenia is characterized by the prominent presence of an affective disorder. In addition, thinking is disorganized, speech is incoherent and there is a tendency to social isolation. Catatonic Schizophrenia is characterized by prominent psychomotor disorders that can alternate between extremes such as hyperkinesia and stupor, or between automatic obedience and negativism. Residual Schizophrenia is characterized by the persistent presence of “negative” symptoms, such as changes in behavior, emotions and social interaction, although not necessarily irreversible and not as often as other types of schizophrenia. **FINAL CONSIDERATIONS:** Therefore, knowing schizophrenia is of paramount importance in the area of health for understanding the disease itself as well as its subtypes, which allows for adequate patient monitoring and the

treatment that can be composed of drug therapy and psychotherapy with the objective to optimize the quality of life of the affected individual as well as the sociability of the patient and his family.

**Keywords:** Schizophrenia; Schizophrenia subtypes; Psychiatric disorder.

## 1 INTRODUÇÃO

A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico complexo, caracterizado por distorções do pensamento, da percepção de si e da realidade externa. É uma psicose crônica idiopática de início precoce, associada a uma série de sintomas e sinais como alucinações, apatia, isolamento social e até suicídio, acometendo cerca de 1% da população mundial.

## 2 OBJETIVO

Revisar a literatura sobre os subtipos de esquizofrenia.

## 3 METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura com buscas nas bases de dados Lilacs e Medline. Foram cruzados com o operador booleano *and* os descritores "esquizofrenia" e "tipos de esquizofrenia". Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em português, entre os anos de 2010 a 2020 e disponíveis na íntegra. Como critério de exclusão considerou-se a não pertinência ao tema. Foram identificadas 20 publicações que contemplavam os critérios e 4 foram utilizadas.

## 4 RESULTADOS

A esquizofrenia é subdividida em tipos, na qual cada uma possui características peculiares. A Esquizofrenia Paranóide caracteriza-se pela presença de ideias delirantes, frequentemente de perseguição, em geral acompanhadas de alucinações e de perturbações das percepções. Seus portadores são indivíduos tensos, desconfiados, hostis e muito agressivos, podendo cometer atos de violência. A Esquizofrenia Hebefrênica configura-se pela presença proeminente de uma perturbação dos afetos. Além disso, o pensamento é desorganizado, o discurso incoerente e há uma tendência ao isolamento social. A Esquizofrenia Catatônica é caracterizada por distúrbios psicomotores proeminentes que podem alternar entre extremos tais como hipercinesia e estupor, ou entre a obediência automática e o negativismo. A Esquizofrenia Residual é caracterizada pela presença persistente de sintomas "negativos", como alterações no comportamento, nas emoções e na interação social, embora

não forçosamente irreversíveis e não com a mesma frequência dos outros tipos de esquizofrenia.

## **5 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Portanto, conhecer a esquizofrenia é de suma relevância na área da saúde para entendimento da doença em si bem como seus subtipos, o que permite o acompanhamento adequado do paciente e o tratamento que pode ser composto pela terapêutica medicamentosa e psicoterápica com o objetivo de otimizar a qualidade de vida do indivíduo acometido bem como a sociabilidade ao paciente e sua família.

## **REFERÊNCIAS**

GIRALDI, Alice; CAMPOLIM, Silvia. Novas abordagens para esquizofrenia. **Cienc. Cult.**, São Paulo, v. 66, n. 2, p. 6-8, 2014.

OLIVEIRA, Renata Marques; FACINA, Priscila Cristina Bim Rodrigues; SIQUEIRA JUNIOR, Antônio Carlos. A realidade do viver com esquizofrenia. **Rev. bras. enferm.**, Brasília, v. 65, n. 2, p. 309-316, 2012.

RANGEL, B.L; SANTOS, A. Aspectos genéticos da esquizofrenia – revisão de literatura. **Revista Uningá**, v.16, n.3, p. 27-31, 2013.

SILVA, Amanda Mentos et al. Esquizofrenia: uma revisão bibliográfica. **Revista UNILUS Ensino e Pesquisa**, v. 13, n. 30, p.18-25, 2016