

RESULTADOS MATERNOS Y PERINATALES EN GESTANTES CON COVID-19. HOSPITAL MARINO MOLINA SCIPPA 2020 - 2021

MATERNAL AND PERINATAL RESULTS IN PREGNANT WOMEN WITH COVID-19. MOLINA SCIPPA MARINO HOSPITAL 2020 - 2021

Ruth Amalia León Jacobo¹ Karina Johana Sánchez Vidal²

¹ Obstetra, Magíster en Obstetricia con mención en Salud Sexual y Reproductiva. Hospital EsSalud Marino Molina Scippa, Lima, Perú

² Licenciada en Obstetricia. Consultorio Córdova E.I.R.L., Lima, Perú



Introducción. La gestante es considerada más susceptible a infecciones virales, por ello, durante la pandemia se consideró como grupo de riesgo para el desarrollo de la enfermedad; así como, para presentar complicaciones obstétricas.

Objetivo. Determinar los resultados maternos y perinatales en gestantes con COVID-19 positivo atendidas en el Hospital Marino Molina Scippa entre el 2020 y 2021.

Materiales y Métodos. Estudio descriptivo y transversal, se incluyeron 298 gestantes con infección por SARS-CoV-2 atendidas en el Servicio de Ginecoobstetricia desde el diagnóstico de la infección hasta el puerperio entre los años 2020 y 2021. Se revisaron historias clínicas, libro de nacimientos y fichas epidemiológicas para recolectar variables sociodemográficas, reproductivas, de patología obstétrica y características del recién nacido. El análisis descriptivo se realizó en SPSS v. 25.

Resultados. El promedio de edad de las gestantes fue 31 años, con $2,3 \pm 1,3$ gestaciones y una media de 32,8 semanas de gestación, no controlada (55,4%) y sin comorbilidad (68,5%). El 91,4% culminó el embarazo en parto, 51,5% parto eutócico y 39,9% cesárea; el 51,1% de recién nacido (RN) fue de sexo masculino, 91,4% con Apgar normal, normopeso (87,9%) y líquido amniótico claro (87,2%). El 58,8% de RN tuvo clampaje tardío de cordón umbilical, contacto piel a piel, lactancia precoz y el 72,4% tuvo alojamiento conjunto. Cuando la infección se presentó en el I trimestre, el 30,2% presentó amenaza de aborto y 9,3% hiperémesis gravídica, en el II trimestre el 24,0% Infección del tracto urinario (ITU) y 16,0% Amenaza de parto pretérmino (APP) y en el III trimestre 12,9% ITU y 11,3% Rotura prematura de las membranas (RPM). El 29,4% de puérperas tuvo anemia, 5,7% hipotonía uterina y 1,8% atonía uterina.

Conclusiones. La mayoría culminó la gestación en parto (91,4%), con RN saludable, se inició lactancia precoz y hubo alojamiento conjunto. Las complicaciones obstétricas más frecuentes fueron la amenaza de aborto (I trimestre) e ITU (II y III trimestre).

Palabras clave: Infección por coronavirus, embarazo, recién nacido.

Correspondencia: Ruth Amalia León Jacobo - Teléfono: (051) 933842719 - Email: ruthleon_01@yahoo.es

