

STELLINGEN

Behorende bij het proefschrift

Acquired Hearing Loss in Children: Prevalence and determinants in the headphone generation

1. Ook kinderen hebben gehoorverlies. *(dit proefschrift)*
2. Recidiverende otitis media acuta is geassocieerd met mogelijk permanent gehoorverlies op de kinderleeftijd. *(dit proefschrift)*
3. Het gebruik van muzikspelers is bij kinderen en jongeren al geassocieerd met slechtere gehoordrempels en hoge tonen gehoorverlies. *(dit proefschrift)*
4. Blootstelling aan luide muziek heeft bij jong volwassenen in ieder geval tijdelijk een direct effect op de gehoordrempel. *(dit proefschrift)*
5. Licht gehoorverlies is geassocieerd met aandachtsproblemen en slechtere schoolprestaties bij kinderen. *(dit proefschrift)*
6. De bij volwassenen geaccepteerde gehoordrempel van 25 dB HL is te hoog voor kinderen.
7. ISO-normen om de gehoordrempel te bepalen zijn gericht op volwassenen; aparte normen voor kinderen zijn wenselijk.
8. De betrokkenheid van de arts vormt de basis voor het doorzettingsvermogen van de patiënt, zowel in behandeling als in preventie.
9. Wees kritisch op de gebaande paden en ontwikkel zo nodig nieuwe wegen.
10. De kunde om wetenschappelijke studies te interpreteren wordt in de moderne samenleving steeds belangrijker, de onkunde steeds zichtbaarder.
11. Ik heb besloten om gelukkig te zijn, dat is goed voor mijn gezondheid. *(onderschrift kassabon supermarché Géant, Frankrijk)*