

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Serviço de Ortopedia
Diretor: Prof. Doutor Fernando Fonseca

Funcionalidade e satisfação dos doentes com hallux valgus submetidos a cirurgia corretiva primária unilateral



*Joana Bento Rodrigues; Pedro Simões, Sandra Alves, João Cura Mariano,
Fernando Fonseca*


Introdução

- HV é a deformidade mais comum do antepé com uma prevalência estimada de 23-35%¹, sobretudo em mulheres²
- Causa sintomas no mediopé, planta do pé e pequenos dedos
- A cirurgia a HV é um procedimento frequente, indicado quando falham as medidas conservadoras

¹ Nix S et al., J Foot Ankle Res. 2010;3

² Nguyen et al., Osteoarthritis Cartilage. 2010 Jan; 18(1):41-6.

Hallux valgus without MTP arthrosis



DSTP= distal soft-tissue procedure; chevron= M1 distal osteotomy; MC = metatarsocuneiform joint

Introdução

o Mesmo na ausência de complicações óbvias, por vezes os doentes ficam insatisfeitos com os resultados cirúrgicos

OBJETIVOS

o Funcionalidade e grau de satisfação doentes submetidos a cirurgia corretiva primária de HV

Material

- o 2011-2012
- o 42 doentes
- o Sintomatologia associada a HV
- o Sem outras alterações do pé



- o osteotomias cirúrgicas
- o abertas primárias
- o unilaterais
- o não complicadas


Métodos

- o Segundo trimestre 2013
- o Entrevistas telefónicas
- o Foot and Ankle Disability Index (FADI)
- o Grau de satisfação
 - Muito satisfeito
 - Satisfeito
 - Insatisfeito
 - Muito insatisfeito

Resultados


- o N = 27 doentes (64%)
- o Idade média: **52 anos** (25-76)
- o 26 : 1

	FADI
Média	92,4
Mediana	99
Máx-Mín	100-49




Resultados

Correlação com a idade (teste Spearman)



Resultados

Correlação com procedimento (teste Spearman)



Discussão

- o A correção dos problemas de calçado, alívio algíco e retoma da marcha normal são os fatores que mais influenciam o grau de staisfação dos doentes

International Orthopaedics (SICOT) (2001) 25:382–385
DOI 10.1007/s002640100289

ORIGINAL PAPER


W. Schneider · K. Knahr

Surgery for hallux valgus. The expectations of patients and surgeons

Discussão


o A osteotomia de Chevron origina bons resultados no seguimento de longo tempo

Schneider, J Bone Joint Surg [Br] 2004;86-B:1016-20.



Discussão

- A osteotomia de Scarf proporciona um resultado satisfatório e previsível




Weil SF, Foot Ankle Clin. 2000 Sep;5(3):559-80.

Discussão

- A osteotomia de Akin é associada quando, mesmo após os outros procedimentos, se mantém valgo de 10º

Kristen KH et al., Foot Ankle Int. 2002;23:221–229



Discussão

- o A idade está associada a patologia degenerativa osteoarticular



Conclusões

- o A cirurgia corretiva aberta unilateral resulta em elevada funcionalidade e grau de satisfação
- o Há uma correlação entre os piores resultados e o avançar da idade e osteotomias isoladas do 1ºMTT



Obrigada!