

Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes

**T. Pignatelli, V. Geraldês, W. Dias, C. Neves,
N. Pinheiro**

Serviço de Cirurgia II

Director: Dr. Eduardo Barroso

**Congresso Sociedade Portuguesa de Cirurgia
9 a 12 Março 2003 - Lisboa**

Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes

✓ O uso do agrafador mecânico circular foi introduzido por A. Longo em 1993, baseado em novas premissas:

- Doença hemorroidária \neq Hemorróidas
- Não é obrigatória a excisão do tecido vascular para a cura.
- O prolapso da mucosa é o factor desencadeante da doença


Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes

- ✓ A operação de Longo está indicada para o prolapso hemorroidário grau III e IV.




Operação de Longo para tratamento de Hemorróidas – Os primeiros 15 doentes

Esta técnica reduz o prolapso hemorroidário e da mucosa mediante a excisão de uma faixa transversal da membrana da mucosa anal prolapsada.



Operação de Longo para tratamento de Hemorróidas – Os primeiros 15 doentes

- ✓ Restabelece a relação topográfica normal entre a membrana da mucosa anal e os esfíncteres anais com laqueação da artéria hemorroidária superior.




Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes

✓ **Experiência do Serviço:**


- **Maio de 2002 a Dezembro de 2002;**
- **15 doentes operados pela técnica de Longo;**
- **2 doentes reoperados**

Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes

DISTRIBUIÇÃO - SEXO (Total Amostra 15 Doentes)



Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes



Idades

Média de 46,6 anos (34 – 60)


Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes



Média 31,3 Min

Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes

TEMPO INTERNAMENTO (Pós-Operatório)



Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes

Analgesia pós operatório

Paracetamol - 12


Nimesulide – 3

2/3 dias de duração

Depois regime SOS

Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes

MORBILIDADE (Total Amostra 15 Doentes)



Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes

- ✓ **Morbilidade:**
 - **Intraoperatória: 0**

Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes

✓ **Morbilidade:**

■ **Pós Operatório Imediato:**

- * Hemorragia anal no 1º dia pós operatório;
 - * Reinternamento ao 14º dia pós op. para laqueação de Pedículo hemorroidário + fissurectomia.
 - * Trombose hemorroidária ao 7º dia pós op.
- Reoperado 1,5 meses depois para excisão de pedículo residual

Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes

Follow-up:

Consulta externa aos: 7 dias, 1 , 3 e 6 meses

Retoma da actividade profissional aos 7 dias, excepto nos doentes com reintervenção

Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes

✓ **Considerações Finais I :**

- **Constatámos:**
 - Diminuição do tempo operatório**
 - Diminuição do tempo de internamento**
 - Diminuição da dor no pós operatório**
 - Complicações pouco frequentes e facilmente solucionáveis.**
 - Necessidade de um maior follow up**

Operação de Longo para tratamento de Hemorroidas – Os primeiros 15 doentes

✓ **Considerações Finais II :**

**Parece-nos ser um método seguro e com
indicação nos graus III e IV**