

CATÁLOGO DE ALGAS MARINHAS BENTÔNICAS DO ESTADO DA BAHIA, BRASIL.

José Marcos de Castro NUNES

RESUMO. *Catálogo de algas marinhas bentônicas do Estado da Bahia, Brasil.* Totalizaram-se 258 táxons infragenéricos distribuídos em 145 Rhodophyta, 46 Phaeophyta e 67 Chlorophyta. Foram acrescidos ainda 35 novas citações para o litoral baiano.

Palavras chave. algas marinhas bentônicas, catálogo, Bahia, Brasil.

ABSTRACT. *Check-list of seaweeds from Bahia State, Brazil.* A checklist of 258 infrageneric taxa were listed of Bahia State, Brazil. This list comprises 145 species of Rhodophyta, 46 Phaeophyta and 67 Chlorophyta. 35 taxa were recorded in the first time for Bahia State.

Key words. seaweeds, check-list, Bahia, Brazil.

INTRODUÇÃO

Os primeiros registros sobre algas marinhas bentônicas no Estado da Bahia datam do século passado, podendo citar como exemplo: Martius et al. (1833), Martens (1870), Dickie (1874), Piccone (1885, 1886a, 1886b e 1889) De Toni (1889), Möbius (1889, 1890), e Weber van Bosse (1898), onde publicam listas de espécies ou descrições incompletas a partir de material proveniente de excursões, cujos dados sobre os locais de coleta eram pouco precisos. No início deste século surgiram outros como Gepp & Gepp (1905), Howe (1928), Taylor (1930, 1931), Howe e Taylor (1931), e Williams & Blomquist (1947) Chou (1954).

A partir da década de sessenta começam a aparecer os trabalhos de Aylton Brandão Joly

e colaboradores sobre adições a flora brasileira, mencionando alguns táxons para o Estado da Bahia (Joly et al. 1965a, 1965b, 1967, 1969a, 1969b, 1976, Joly & Ugadim 1966).

Citação de trabalhos contendo referências de espécies coletadas neste litoral são encontradas em Yamaguishi-Tomita (1970), Oliveira-Filho (1974, 1977), Pinheiro-Joventino (1977), Semir (1977), Oliveira-Filho et al. (1979), Gouvea & Leite (1980), Leite (1982), Kanagawa (1984), Teixeira et al. (1985), Braga (1986), Ugadim (1987), Oliveira (1989), Moura (1994), Guimarães (1996) e Buys & Széchy (1997).

O primeiro levantamento sistemático de algas marinhas bentônicas realizado para o Estado da Bahia foi publicado por Martins et al. (1991), que faz referência a 33 táxons de

clorofíceas marinhas da orla oceânica de Salvador. Em seguida Santos (1992), realizou trabalho sobre a microdistribuição e composição das comunidades de macroalgas em recifes na Ilha de Itaparica, listando 43 táxons. Mais recentemente Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997a, 1997b) publicaram trabalhos referentes a material coletado nos municípios de Salvador e Camaçari.

Oliveira-Filho (1977) catalogou todas as algas marinhas citadas para o Brasil até aquele período, fornecendo sua distribuição para o litoral brasileiro e os autores que as estudaram, incluindo inclusive material coletado ou examinado pelo próprio autor.

Este catálogo pretende servir como ponto de partida para estudos de levantamentos taxonômicos realizados para o Estado da Bahia, reunindo e organizando os dados da literatura, e consequentemente facilitando a sua consulta. Parte destes trabalhos, ao menos os mais significativos a exemplo de Oliveira-Filho (1977) e Santos (1992), acham-se sob forma de Tese ou Dissertação respectivamente, dificultando por conseguinte sua localização e consulta.

Alguns táxons foram acrescidos como primeira referência para o litoral baiano e litoral nordestino.

Exclui-se deste Catálogo as Divisões Cyanophyta e Chrysophyta.

MATERIAL E MÉTODOS

São fornecidos o nome do táxon, citação do autor e ano de publicação, em ordem cronológica. Dentro do parêntese ao lado do ano de publicação aparece o nome do táxon referido originalmente pelo autor.

Este catálogo teve como base Oliveira-Filho (1977), acrescido por publicações posteriores.

Os táxons que constituem novas citações para o litoral baiano e/ou nordestino, vêm acompanhados de informações sobre município

e praia onde foram coletados, número de Herbário, habitat e por vezes, fase reprodutiva e associações com outras algas e estão assinalados por um asterisco. Todo material encontra-se registrado no Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB) do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia.

A grande maioria dos táxons sem asterisco foram reconfirmados em coletas atuais.

Oliveira-Filho (1977) menciona alguns táxons como sendo “espécies duvidosas”, por considerar de validez discutível ou de ocorrência improvável, estas então incluídas ao final do artigo.

Os táxons de categoria igual ou superior a família foram dispostos segundo sistema adotado por Wynne (1998) e Silva *et al.* (1987, 1996). Os táxons de categoria infragenérica são citados de forma mais atualizada possível, seguindo os trabalhos citados anteriormente. Dentro das famílias, os gêneros, e nestes as espécies, estão dispostos em ordem alfabética.

RESULTADOS

Foram listados 258 táxons infragenéricos, sendo 145 Rhodophyta distribuídos em 14 ordens e 25 famílias, 46 Phaeophyta com 08 ordens e 10 famílias, 67 Chlorophyta com 04 ordens e 14 famílias. Estão incluídas 35 novas citações para o litoral baiano, e 15 para o litoral nordestino ampliando assim a distribuição de algumas espécies para o litoral brasileiro.

Em seguida apresentamos a lista dos táxons.

RHODOPHYTA

BANGIOPHYCIDAE

PORPHYRIDIALES

Porphyridiaceae

Stylonema alsidii (Zanardini) Drew Joly, *et al.* (1969a como *Goniotrichum alsidii*).

COMPSOPOGONALES

Erythrotrichiaceae

Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh
Oliveira-Filho *et al.* (1979) e Teixeira *et al.* (1985).

Erythrotrichia porphyroides Gardner*
Bahia: Salvador, Praia de Stella Maris (ALCB 22500); Conde, Barra do Itariri (ALCB 31530); Camaçari Praia de Jauá, (ALCB 31506). Coletada no mesolitoral. Epifitando *Padina pavonica* e *P. gymnospora*.

Primeira referência para o litoral nordestino.

Sahlingia subintegra (Rosevinge) Kornmann
Teixeira *et al.* (1985).

BANGIALES

Bangiaceae

Porphyra acanthophora Oliveira & Coll*
Bahia: Uruçuca, Praia de Serra Grande (ALCB 32305). Coletada no mesolitoral superior.

FLORIDEOPHYCIDAE

ACROCHAETIALES

Acrochaetiaceae

Acrochaetium hallanicum (Kylin) Hamel
Oliveira-Filho *et al.* (1979 como *Acrochaetium sargassi*).

Acrochaetium microscopicum (Nägeli ex Kützing)
Nägeli
Bahia: Conde, Barra do Itariri (ALCB 32258). Coletada no mesolitoral. Epifitando *Padina gymnospora*.

PALMARIALES

Rhodothamniellaceae

Rhodothamniellacodicola (Borgesen) Bidoux & F. Magne
Teixeira *et al.* (1985 como *Acrochaetium codicola*).

CORALLINALES

Corallinaceae

Amphiroa anastomosans Weber-van Bosse
Martins *et al.* (1991), Santos (1992), Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997b).

Amphiroa beauvoisii Lamouroux
Martins *et al.* (1991), Santos (1992) e Nunes (1997b).

Amphiroa brasiliiana Decaisne
Howe (1928), Taylor (1931), Santos (1992) e Nunes (1997b).

Amphiroa fragilissima (Linnaeus) Lamouroux
Martins *et al.* (1991), Oliveira-Filho (1977), Santos (1992) e Nunes (1997b).

Amphiroa rigida Lamouroux
Santos (1992).

Corallina officinalis Linnaeus
Martens (1870) e Taylor (1931).

Corallina panizzoi Schnetter & Richter
Moura (1994) e Buys & Széchy (1996).

Haliptilon subulatum (Ellis & Solander) Johansen
Piccone (1886b como *Corallina subulata*), Martens (1870 como *Corallina subulata*), Howe (1928 como *Corallina subulata*), Taylor (1931 como *Corallina subulata*), Moura (1994) e Nunes (1997a, 1997b).

Jania adhaerens Lamouroux
Martins *et al.* (1991) e Nunes (1997a, 1997b).

Jania capillaceae Harvey
Howe (1928), Taylor (1931) e Oliveira-Filho *et al.* (1979).

Jania pumila Lamouroux
Joly *et al.* (1969a) e Nunes (1997b).

Jania rubens (Linnaeus) Lamouroux
Taylor (1931).

Lithoporella atlantica (Foslie) Foslie
Oliveira-Filho *et al.* (1979 como *Fosliella atlantica*).

Melobesia membranacea (Esper) Lamouroux
Taylor (1931 como *Lithothamnion membranaceum*).

Neogoniolithon mamillare (Harvey) Setchell & Mason
Martens (1870 como *Melobesia mamillaris*) e Taylor (1931 como *Goniolithon mamillare*).

GELIDIALES

Gelidiaceae

Gelidium coarctatum Kützing
Ugadim (1987) e Altamirano & Nunes (1997).

Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis
Ugadim (1987 como *G. crinale*), Santos (1992 como *Gelidium pusillum* var. *pusillum*) e Nunes (1997b).

Gelidium spinulosum (Gmelin) Silva
Taylor (1931 como *Gelidium corneum*).

Pterocladia bartlethii Taylor*
Bahia: Lauro de Freitas, Praia de Villas do Atlântico (ALCB 32276). Crescendo no mesolitoral. Plantas tetraspóricas.

Pterocladiella caerulescens (Kützing) Santelices & Hommersand
Ugadim (1987 como *Pterocladia caerulescens*), Santos (1992 como *G. pusillum* var. *conchicola*), Altamirano & Nunes (1997 como *P. caerulescens*) e Nunes (1997b como *P. caerulescens*).

Gelidiellaceae

Gelidiella acerosa (Forskål) J. Feldmann & Hamel
Joly et al. (1969a), Martins et al. (1991), Santos (1992), Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997a, 1997b).

NEMALIALES

Liagoraceae

Ganonema farinosum (Lamouroux) Fan & Wang*
Bahia: Camaçari, Praia de Arembepe (ALCB

22171). Crescendo no infralitoral.
Primeira referência para o litoral nordestino.

Liagora ceranoides Lamouroux*

Bahia: Salvador, Praia de Itapoã (ALCB 32277). Crescendo no infralitoral.

Galaxauraceae

Galaxaura comans Kjellman
Joly et al. (1967).

Galaxaura marginata (Ellis & Solander)
Lamouroux

Martens (1870 como *G. canaliculata*), Taylor (1931), Chou (1945 como *Galaxaura angustifrons*), Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997b).

Galaxaura obtusata (Ellis & Solander) Lamouroux
Martens (1870), Howe (1928), Taylor (1931), Joly et al. (1969a também como *Galaxaura breviarticulata*), Teixeira et al. (1985) e Nunes (1997b).

Galaxaura rugosa (Ellis & Solander) Lamouroux
Martens (1870), Taylor (1931) e Joly, et al. (1969a como *G. squalida*).

Scinaia furcellata (Turner) J. Agardh*

Bahia: Salvador, Praia da Pituba (ALCB 32278); Camaçari, Arembepe (ALCB 22157); Praia de Jauá (ALCB 17214). Crescendo no infralitoral.

Tricleocarpa cylindrica (Ellis & Solander) Huisman & Borowitzka
Joly et al. (1969a como *Galaxaura cylindrica*).

Tricleocarpa fragilis (Linnaeus) Huisman & Towns
Taylor (1931 como *Galaxaura oblongata*), Santos (1992 como *G. oblongata*) e Altamirano & Nunes (1997 como *G. oblongata*).

BONNEMAISONIALES

Bonnemaisoniaceae

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan
Joly et al. (1969a como *Falkenbergia hillebrandii*) e Teixeira et al. (1985 como *Falkenbergia hillebrandii*).

	GIGARTINALES	Solieriaceae
	Corynomorphaceae	
<i>Corynomorpha clavata</i> (Harvey) J. Agardh Nunes (1997b).		<i>Meristiella gelidium</i> (J. Agardh) Cheney et Gabrielson* Guimarães (1996).
	Gigartinaceae	
<i>Chondracanthus acicularis</i> (Roth) Fredericq Altamirano & Nunes (1997 como <i>Gigartina acicularis</i>)		<i>Solieria filiformis</i> (Kützing) Gabrielson* Bahia: Vera Cruz, Praia da Penha (ALCB 32280). Coletada no mesolitoral. Planta tetraspórica.
	Hypnaceae	HALYMENIALES
<i>Chondracanthus teedii</i> (Roth) Kützing Braga (1986 como <i>Gigartina teedii</i>), Oliveira-Filho (1977 como <i>Gigartina teedii</i>) e Nunes (1997b como <i>Gigartina teedii</i>).		<i>Halymeniacaeae</i>
<i>Hypnea cervicornis</i> J. Agardh Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997a, 1997b).		<i>Cryptonemia crenulata</i> (J. Agardh) J. Agardh Martens (1870 como <i>Phyllophora crenulata</i>), Dickie (1874), Oliveira-Filho (1974), Pinheiro-Joventino (1977) e Altamirano & Nunes (1997).
<i>Hypnea musciformis</i> (Wulfen in Jacquin) Lamouroux Martius et al. (1833 como <i>Sphaerococcus musciformis</i> Wulfen), Howe (1928), Taylor (1931), Martins et al. (1991), Santos (1992), Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997a, 1997b).		<i>Cryptonemia seminervis</i> (C. Agardh) J. Agardh Pinheiro-Joventino (1977 como <i>Cryptonemia luxurians</i>), Teixeira et al. (1985 como <i>C. luxurians</i>), Altamirano & Nunes (1997b como <i>C. luxurians</i>) e Nunes (1997b como <i>C. luxurians</i>).
<i>Hypnea spinella</i> (C. Agardh) Kützing Martens (1870 como <i>H. rissoana</i>), Howe (1928), Taylor (1931), Joly, et al. (1969a), Oliveira (1989), Altamirano & Nunes (1997 também como <i>Hypnea cervicornis</i>) e Nunes (1997a, 1997b também como <i>H. cervicornis</i>).		<i>Gratelouphia filicina</i> (Lamouroux) C. Agardh* Bahia: Uruçuca, Praia de Serra Grande (ALCB 22270). Coletada no mesolitoral.
	Peyssonneliaceae	
<i>Peyssonnelia inamoena</i> Pilger*		<i>Halymenia duchassaingii</i> (J. Agardh) Kylin Joly et al. (1965a).
Bahia: Camaçari, Praia de Arembepe (ALCB 32278). Crescendo no infralitoral. Primeira referência para o litoral nordestino.		<i>Halymenia floresia</i> (Clemente) C. Agardh Dickie (1874), Taylor (1930, 1931) e Oliveira-Filho (1974).
	Rhizophyllidaceae	GRACILARIALES
<i>Ochtodes secundiramea</i> (Montagne) Howe Joly e Ugadim (1966), Joly et al. (1969a) e Nunes (1997b).		<i>Gracilaria caudata</i> J. Agardh Taylor (1930, 1931 como <i>G. confervoides</i>) e Altamirano & Nunes (1997 como <i>Gracilaria verrucosa</i>).
		<i>Gracilaria cervicornis</i> (Turner) J. Agardh Taylor (1931), Altamirano & Nunes (1997 também como <i>G. ferox</i>) e Nunes (1997b).
		<i>Gracilaria dominguensis</i> Sonder ex Kützing

Altamirano & Nunes (1997).	<i>Coelarthrnum cliftonii</i> (Harvey) Kylin Teixeira et al. (1985 como <i>C. albertisii</i>).
<i>Gracilaria lacinulata</i> (West in Vahl) Howe Dickie (1874 como <i>G. multipartita</i>) e Taylor (1931).	<i>Gelidiopsis gracilis</i> (Kützing) Vickers Nunes (1997b).
<i>Gracilaria mammilaris</i> (Montagne) Howe Taylor (1930, 1931) e Nunes (1997b).	CERAMIALES Ceramiaceae
<i>Gracilaria tepocensis</i> (Dawson) Dawson Altamirano & Nunes (1997).	
<i>Hydropuntia cornea</i> (J. Agardh) Wynne* Bahia: Uruçuca, Praia de Serra Grande (ALCB 32252); Vera Cruz, Barra Grande (ALCB 22079). Coletada no mesolitoral.	<i>Aglaothamnion filiponei</i> (Howe) Aponte* Bahia: Uruçuca, Praia de Serra Grande (ALCB 32283). Coletada no mesolitoral. Plantas tetraspóricas. Primeira referência para o litoral nordestino.
RHODYMENIALES	
Champiaceae	
<i>Champia feldmannii</i> Diaz-Piferrer Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997b).	<i>Aglaothamnion uruguayanense</i> (Taylor) Aponte & Norris Teixeira et al. (1985 <i>Callithamnion uruguayanense</i>).
<i>Champia parvula</i> (C. Agardh) Harvey* Bahia: Vera Cruz, Barra do Pote (ALCB 32281). Coletada no infralitoral. Plantas tetraspóricas.	<i>Antithamnion antillarum</i> Børgesen Joly et al. (1969a).
<i>Champia salicornioides</i> Harvey* Bahia: Mata de São João, Praia do Forte (ALCB 32282). Coletada no infralitoral. Primeira citação para o litoral nordestino.	<i>Callithamnion corymbosum</i> (J. E. Smith) Lyngbye Martius et al. (1833 como <i>Ceramium versicolor</i>) e Taylor (1931).
Rhodymeniaceae	
<i>Botryocladia occidentalis</i> (Børgesen) Kylin Martius et al. (1833 como <i>Chondria ovalis</i> var. <i>uvaria</i>), Martens (1870 como <i>Gastroclonium uvaria</i>), Taylor (1931 como <i>Chrysymenia uvaria</i>), Teixeira et al. (1985), Santos (1992), Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997a, 1997b).	<i>Centroceras clavulatum</i> (C. Agardh in Kunth Montagne in Durieu de Maisonneuve Joly et al. (1969a), Nunes (1997b).
<i>Botryocladia pyriformis</i> (Børgesen) Kylin Santos (1992) e Nunes (1997a, 1997b).	<i>Centrocerocolax ubatubensis</i> Joly* Bahia: Conde, Barra do Itariri (ALCB 32284). Coletada no mesolitoral. Plantas tetraspóricas. Epítando <i>Centroceras clavulatum</i> . Primeira referência para o litoral nordestino.
<i>Chrysymenia enteromorpha</i> Harvey Taylor (1931).	<i>Ceramium brasiliense</i> Joly Teixeira et al. (1985) e Altamirano & Nunes (1997).
<i>Chrysymenia dickieana</i> J. Agardh Taylor (1931).	<i>Ceramium comptum</i> Børgesen Teixeira et al. (1985).
	<i>Ceramium dawsonii</i> Joly Oliveira-Filho et al. (1979), Teixeira et al. (1985) e Altamirano & Nunes (1997).
	<i>Ceramium luetzelburgii</i> Schmidt Oliveira-Filho et al. (1979).

- Ceramium tenerimum** (Martens) Okamura
Joly et al. (1969a).
- Crouania attenuata** (C. Agardh) J. Agardh
Joly et al. (1965a), Oliveira-Filho et al. (1979)
e Teixeira et al. (1985).
- Diplothamnion tetrastichum** Joly & Yamaguishi
Oliveira-Filho et al. (1979).
- Dohrnella antillarum** (Taylor) Feldmann-Mazoyer
var. *brasiliensis* Joly & Ugadim in Joly et al.
Joly et al. (1969a) e Oliveira-Filho et al. (1979).
- Griffithsia schousboei** Montagne
Oliveira-Filho et al. (1979).
- Griffithsia tenuis** C. Agardh
Joly et al. (1969a).
- Haloplegma duperreyi** Montagne
Oliveira-Filho (1977).
- Spermothamnion nonatoi** Joly*
Bahia: Camaçari, Arembepe (ALCB 32285).
Coletada no infralitoral. Epizoica em hidrozoários.
Primeira referência para o litoral nordestino.
- Spyridia clavata** Kützing
Joly et al. (1969a).
- Spyridia filamentosa** (Wulfen) Harvey in Hooker
Taylor (1930).
- Spyridia hypnoides** (Bory in Belanger) Papenfuss
Nunes (1997b).
- Tiffaniella gorgonea** (Montagne) Doty & Meñez
Joly et al. (1969a) como *Spermothamnion*
gorgoneum.
- Wrangelia argus** (Montagne) Montagne
Joly et al. (1969a) e Nunes (1997a, 1997b).
- Dasyaceae
- Dasya baillouviana** (S. G. Gmelin) Montagne
Teixeira et al. (1985).
- Dictyurus occidentalis** J. Agardh*
- Bahia: Camaçari, Arembepe (ALCB 22163),
Jauá (ALCB 17107). Coletadas no infralitoral.
- Heterosiphonia crispella** (C. Agardh) Wynne
Joly et al. (1969a) como *H. wurdemanni* var.
wurdemanii, Oliveira-Filho, Ugadim e Paula (1979
como *H. wurdemanni* var., *laxa*) e Teixeira et al.
(1985 como *H. wurdemanni*).
- Delesseriaceae
- Caloglossa leprieurii** (Montagne) J. Agardh
Leite (1982) e Oliveira-Filho (1977).
- Claudea elegans** Lamouroux*
Bahia: Camaçari, Arembepe (ALCB 32286).
Coletada no infralitoral. Oliveira-Filho (1977) faz
referência deste táxon para a Bahia, mas na verdade,
este foi dragado nos estados de Pernambuco e Rio
de Janeiro (Joly et al. 1978).
- Cottoniella filamentosa** (Howe) Børgesen
Joly et al. (1969a).
- Cryptopleura crispa** Kylin
Teixeira et al. (1985).
- Hypoglossum tenuifolium** (Harvey) J. Agardh
Oliveira-Filho et al. (1979).
- Nitophyllum wilkinsoniae** Collins & Hervey
Joly et al. (1965a).
- Rhodomelaceae
- Acanthophora muscoides** (Linnaeus) Bory
Martens (1870 como *Chondria muscoides*
Agardh), Taylor (1931), Altamirano & Nunes (1997)
e Nunes (1997b).
- Acanthophora spicifera** (Vahl) Børgesen
Martius et al. (1833 como *Chondria*
acanthophora), Martens (1870 como *A. thierii*),
Taylor (1931), Oliveira (1989), Altamirano & Nunes
(1997) e Nunes (1997a, 1997b).
- Amansia multifida** Lamouroux
Piccone (1885, 1866a), Howe (1928), Taylor
(1931) e Nunes (1997a, 1997b).

Bostrychia calliptera (Montagne) Montagne
Oliveira-Filho (1977).

Bostrychia montagnei Harvey
Joly et al. (1969a), Oliveira-Filho (1977 como
B. scorpioides var. *montagnei*) e Leite (1982).

Bostrychia radicans (Montagne) Montagne
Joly et al. (1969a).

Bostrychia tenella (Vahl) J. Agardh
Joly et al. (1969a como *Bostrychia binderi*),
Leite (1982 como *B. binderi*) e Nunes (1997a, 1997b
como *B. binderi*).

Bryocladia cuspidata (J. Agardh) De Toni*
Bahia: Conde, Sítio do Conde (ALCB 32287);
Barra do Itariri (ALCB 32297). Coletada no
mesolitoral. Plantas tetraspóricas.

Bryothamnion seaforthii (Turner) Kützing
Dickie (1874), Howe (1928), Taylor (1930,
1931), Oliveira-Filho (1974), Martins et al. (1991)
e Nunes (1997a, 1997b).

Bryothamnion triquetrum (S. G. Gmelin) Howe
Howe (1928), Taylor (1931), Martins et al.
(1991) e Nunes (1997a, 1997b).

Chondria atropurpurea Harvey
Dickie (1874, como *Chondriopsis atropurpurea*).

Chondria platymea Joly & Ugadim in Joly et al.
Oliveira-Filho et al. (1979).

Chondria polyrhiza Collins & Hervey
Oliveira-Filho et al. (1979).

Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh
Howe (1928), Taylor (1931), Martins et al.
(1991), Santos (1992) e Nunes (1997a, 1997b).

Dipterosiphonia dendritica (C. Agardh) Schmitz in
Engler & Prantl
Taylor (1931) e Nunes (1997a, 1997b).

Enantiocladia duperreyi (C. Agardh) Falkenberg
Nunes (1997a, 1997b).

Herposiphonia secunda (C. Agardh) Falkenberg

Joly et al. (1969a também como *H. tenella*) e
Nunes (1997a, 1997b).

Laurencia arbuscula Sonder*
Bahia: Cairu, Ilha de Tinharé (ALCB 32288).
Coletada no mesolitoral. Plantas tetraspóricas.
Primeira referência para o litoral nordestino.

Laurencia caraibica Silva
Oliveira-Filho et al. (1979 como *Laurencia
nana*).

Laurencia corallopsis (Montane) Howe*
Bahia: Camaçari, Guarajuba (ALCB 32289);
Salvador, Praia de Stella Maris (ALCB 32290).
Coletada no mesolitoral. Plantas tetraspóricas e
masculinas. Associada a *Anadyomene stellata* e
Dictyopteris delicatula.
Primeira referência para o litoral nordestino.

Laurencia flagellifera J. Agardh
Altamirano & Nunes (1997).

Laurencia furcata Cordeiro-Marino & Fujii*
Bahia: Salvador, Praia de Stella Maris (ALCB
32291); Lauro de Freitas, Praia de Villas do
Atlântico (ALCB 32292). Coletada no mesolitoral.
Plantas tetraspóricas e masculinas. Epifitadas por
Hypnea musciformis e *Herposiphonia secunda*.
Primeira referência para o litoral nordestino.

Laurencia intricata Lamouroux*
Bahia: Cairú, Ilha de Tinharé (ALCB 32293).
Coletada no mesolitoral. Associada a *Amphiroa
fragilissima* e *Anadyomene stellata*.
Primeira referência para o litoral nordestino.

Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux
Martius et al. (1833 como *Chondria obtusa*
Agardh), Taylor (1931) e Joly et al. (1969a).

Laurencia oliveirana Yoneshigue*
Bahia: Conde, Barra do Itariri (ALCB 32297).
Coletada no mesolitoral. Associada a *Bryocladia
cuspidata* e *Amphiroa fragilissima*.
Primeira referência para o litoral nordestino.

Laurencia papillosa (C. Agardh) Greville
Martius et al. (1833 como *Chondria
thyrsoides*), Martins et al. (1991), Santos (1992),

Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997b).

Laurencia perforata (Bory) Montagne Santos (1992).

Laurencia translucida Fujii & Cordeiro-Marino*

Bahia: Camaçari, Praia de Arembepe (ALCB 32296); Salvador, Praia de Stella Maris (ALCB 32295); Uruçuca, Praia de Serra Grande (ALCB 32294). Coletada no mesolitoral. Plantas tetraspóricas, cistocárpicas e masculinas. Epifitadas por *Dictyopteris delicatula* e *Ceramium dawsonii*. Associada a *Anadyomene stellata* e *Amphiroa anastomosans*.

Primeira referência para o litoral nordestino.

Lophocladia trichocladus (C. Agardh) Schmitz Joly et al. (1967) e Oliveira (1989).

Micropeuce mucronata (Harvey) Kylin Taylor (1930, 1931 como *Dasya sertularioides*), Howe e Taylor (1931 como *D. sertularioides*).

Murrayella periclados (C. Agardh) Schmitz Oliveira-Filho (1977).

Osmundaria obtusiloba (C. Agardh) Norris Howe (1928 como *Vidalia obtusiloba*), Taylor (1931 como *V. obtusiloba*), Teixeira et al. (1985 como *V. obtusiloba*), Altamirano & Nunes, (1997 como *V. obtusiloba*) e Nunes (1997a como *V. obtusiloba*).

Polysiphonia ferulacea Suhr ex J. Agardh Oliveira (1989).

Polysiphonia havanensis Montagne Joly et al. (1969a).

Polysiphonia subtilissima Montagne Oliveira-Filho et al. (1979).

Protokuetzingia schottii W. Taylor*

Bahia: Camaçari, Arembepe (ALCB 22165), Jauá (ALCB 17108). Coletada no infralitoral. Plantas tetraspóricas.

Pterosiphonia parasitica (Hudson) Falkenberg var. *australis* Joly & Cordeiro-Marino Joly et al. (1967b).

Wrightiella tumanowiczii (Gatty ex Harvey) Schmitz Dickie (1847e como *Dasya tumanowiczii*), Taylor (1931) e Oliveira-Filho (1974).

PHAEOPHYTA

ECTOCARPALES

Ectocarpaceae

Asteronema rhodochortonoides (Børgesen) D. Müller & Parodi Oliveira-Filho et al. (1979 como *Ectocarpus rhodochortonoides*).

Bachelotia antillarum (Grunow) Gerloff*

Bahia: Camaçari, Praia de Arembepe (ALCB 17065), Praia de Guarajuba (ALCB 32249), Praia de Itacimirim (ALCB 32248), Praia de Jauá (ALCB 32246); Salvador, Praia de Placafor (ALCB 17340), Praia de Itapoã (ALCB 31520), Praia de Stella Maris (ALCB 32241); Vera Cruz, Barra Grande (ALCB 32242); Conde, Barra do Itariri (ALCB 32247), Sítio do Conde (ALCB 31542); Uruçuca, Praia de Serra Grande (ALCB 22244). Coletada no mesolitoral. Associada a *Hincksia breviarticulatus*, *Hincksia mitchelliae*, *Feldmania irregularis*, *Sphaelaria tribuloides*, *Blindgia marginata*, *Cladophora vagabunda* e *Asteronema rhodochortonoides*.

Feldmannia irregularis (Kützing) Hamel Joly et al. (1969a como *Ectocarpus irregularis*).

Ectocarpus rallsiae (Vickers) W. Taylor Oliveira-Filho et al. (1979 *Giffordia rallsiae*).

Hincksia breviarticulata (J. Agardh) P. Silva

Joly et al. (1969a como *Ectocarpus breviarticulatus*).

Hincksia mitchelliae (Harvey) P. C. Silva*

Bahia: Camaçari, Praia de Arembepe (ALCB 32274); Salvador, Praia de Placafor (ALCB 17333), Praia de Itapoã (ALCB 17351, 31522). Coletada no mesolitoral. Associada a *Bachelotia antillarum*. Epifitando *Sargassum vulgare*, *Corallina panizzoi* e *Padina pavonica*.

	CHORDARIALES	Taylor (1931) e Joly <i>et al.</i> (1969a).
	Elachistaceae	<i>Rosenvingea sanctae-crucis</i> Børgesen*
<i>Elachista minutissima</i> W. Taylor Oliveira-Filho <i>et al.</i> (1979).		Bahia: Camaçari, Praia de Arembepe (ALCB 32301). Coletada no infralitoral.
	Ralfsiaceae	SPHACELARIALES
<i>Ralfsia expansa</i> (J. Agardh) J. Agardh*		Sphacelariaceae
Bahia: Camaçari, Praia de Jauá (ALCB 322300); Salvador, Praia de Itapoã (ALCB 32298), Praia do Farol da Barra (ALCB 32299). Coletada no mesolitoral.		<i>Sphacelaria rigidula</i> Kützing Joly <i>et al.</i> (1969a) como <i>S. furcigera</i>) e Oliveira-Filho <i>et al.</i> (1979 como <i>S. furcigera</i>).
	SPOROCHNALES	<i>Sphacelaria tribuloides</i> Meneghini Joly <i>et al.</i> (1969a).
	Sporochnaceae	DICTYOTALES
<i>Sporochnus bolleanus</i> Montagne Taylor (1930, 1931).		Dictyotaceae
	DICTYOSIPHONALES	<i>Dictyopteris delicatula</i> Lamouroux Martius <i>et al.</i> (1833 como <i>Haliseris delicatula</i>), Howe (1928 como <i>Neurocarpus hauckianus</i>), Taylor (1930 como <i>Neurocarpus delicatulus</i> , 1931 como <i>N. delicatulus</i>), Joly <i>et al.</i> (1969a), Teixeira <i>et al.</i> (1985), Oliveira (1989), Martins <i>et al.</i> (1991), Santos (1992), Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997a).
	Punctariaceae	<i>Dictyopteris justii</i> Lamouroux Martens (1870 como <i>Haliseris justii</i>), Taylor (1930, 1931 como <i>Neurocarpus</i>), Joly <i>et al.</i> (1969a) e Oliveira (1989).
<i>Hecatonema floridanum</i> (W. Taylor) W. Taylor Joly <i>et al.</i> (1969a).		<i>Dictyopteris plagiogramma</i> (Montagne) Vickers Taylor (1931 como <i>Neurocarpus plagiogrammus</i> (Montagne) Kützing), Joly <i>et al.</i> (1969a), Teixeira <i>et al.</i> (1985).
	SCYTOSIPHONALES	<i>Dictyopteris polypodioides</i> (De Candolle) Lamouroux Martius <i>et al.</i> (1833 como <i>Haliseris polypodioides</i>) e Altamirano & Nunes (1997 como <i>Dictyopteris membranaceae</i>).
<i>Chnoospora minima</i> (Hering) Papenfuss*		<i>Dictyota bartayresiana</i> Lamouroux Oliveira (1989).
Bahia, Camaçari, Praia de Arembepe (ALCB 22343), Praia de Jauá (ALCB 22342); Conde, Sítio do Conde (ALCB 22408); Uruçua, Serra Grande (ALCB 22276). Coletada no mesolitoral.		<i>Dictyota cervicornis</i> Kützing
	Scytoniphonaceae	
<i>Colpomenia sinuosa</i> (Roth) Derbès & Solier Joly <i>et al.</i> (1969a), Oliveira-Filho <i>et al.</i> (1979), Martins <i>et al.</i> (1991) e Nunes (1997a).		
<i>Hydroclathrus clathratus</i> (C. Agardh) Howe Joly <i>et al.</i> (1969a).		
<i>Rosenvingea intricata</i> (C. Agardh) Børgesen Martius (1833 como <i>Ulva endiviaefolia</i>),		

Joly et al. (1969a), Oliveira (1989) e Santos (1992).

Dictyota ciliolata Kützing

Joly et al. (1969a) e Oliveira (1989).

Dictyota jamaicensis W. Taylor

Joly et al. (1965a, 1969a) e Altamirano & Nunes (1997).

Dictyota menstrualis (Hoyt) Schnnetter, Hörnig & Weber-Peukert

Gepp & Gepp (1905 como *D. dichotoma*), Taylor (1931 como *D. dichotoma*), Oliveira (1989 como *D. dichotoma*) e Altamirano & Nunes (1997 como *D. dichotoma*).

Dictyota mertensii (Martius) Kützing

Martius *et al.* (1833 como *Ulva mertensii*), Martens (1870 como *D. brongniartii*), Howe (1928 como *D. dentata* e *Dilophus guineensis*), Taylor (1931 como *D. dentata* e *Dilophus guineensis*), Joly *et al.* (1969a como *D. dentata*), Oliveira-Filho *et al.* (1979) e Oliveira (1989).

Dictyota pulchella Hörnig & Schnetter

Taylor (1930 como *D. divaricata*), Joly *et al.* (1969a como *Dictyota linearis*) e Oliveira (1989 como *D. divaricata* cf.).

Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley ex Oliveira

Martens (1870 como *Gymnogongrus collaris*, *Padina fraseri* e *Zonaria collaris*), Howe (1928 como *Zonaria variegata*), Taylor (1930 como *Zonaria variegata*, 1931 como *Padina fraseri* e *Zonaria variegata*), Joly *et al.* (1969a como *Pocockiella variegata*), Teixeira *et al.* (1985), Santos (1992) e Altamirano & Nunes (1997).

Padina gymnospora (Kützing) Sonder

Joly *et al.* (1969a) e Altamirano & Nunes (1997).

Padina pavonica (Linnaeus) Thivy in W. Taylor
Taylor (1931).

Padina sanctae-crucis Børgesen

Howe (1928) e Taylor (1930, 1931).

Padina tetrastromatica Hauck*

Bahia: Lauro de Freitas, Praia de Villas do Atlântico (ALCB 31552); Camaçari, Praia de Itacimirim (ALCB 22495), Praia de Jauá, (ALCB 224797). Coletadas no mesolitoral. Plantas esporofíticas.

Primeira referência para o litoral nordestino.

Spatoglossum schroederi (C. Agardh) Kützing

Oliveira-Filho (1977) e Altamirano & Nunes (1997).

Styopodium zonale (Lamouroux) Papenfuss

Gepp & Gepp (1905 como *S. lobatum*), Joly *et al.* (1969a) e Teixeira *et al.* (1985).

Zonaria tournefortii (Lamouroux) Montagne

Joly *et al.* (1969a) e Oliveira-Filho (1977).

FUCALES

Sargassaceae

Sargassum acinarium (Linnaeus) Setchell

Joly *et al.* (1969a).

Sargassum cymosum C. Agardh

Martens (1870) e Taylor (1931).

Sargassum filipendula C. Agardh

Oliveira-Filho (1977).

Sargassum furcatum Kützing*

Bahia: Itaparica, Ponta de Areia (ALCB 32236). Coletada atirada à praia e em redes de pesca.

Primeira referência para o litoral nordestino.

Sargassum hystrix J. Agardh

Joly *et al.* (1969a), Oliveira-Filho *et al.* (1979) e Teixeira *et al.* (1985).

Sargassum platycarpum Montagne

Piccone (1886 como *S. liebmanii*), Taylor (1931 como *S. liebmanii*), Joly *et al.* (1969a) e Oliveira-Filho *et al.* (1979).

Sargassum polyceratum Montagne

Martens (1870 como *S. bahiense* Kg.), Piccone (1889 como *S. spinulosum* var. *ciliata* Grunow), Howe (1928) e Taylor (1931).

Sargassum stenophyllum (Martens) Martius*

Bahia: Camaçari, Praia de Aremebepe (ALCB 22462). Coletada no mesolitoral. Plantas masculinas.

Ulvellaceae

Sargassum vulgare C. Agardh
Gepp & Gepp (1905), Taylor (1931), Joly *et al.* (1969a) e Altamirano & Nunes (1997).

CLADOPHORALES

Anadyomenaceae

CHLOROPHYTA

ULVALES

Gayraliaceae

Gayralia oxysperma Vinogradova ex Scagel et al.
Oliveira-Filho (1977 como *Ulvaria oxysperma*).

Monostromataceae

Blidingia marginata (J. Agardh) P. Dangeard
Altamirano & Nunes (1997).

Ulvaceae

Enteromorpha chaetomorphoides Børgesen
Oliveira-Filho *et al.* (1979).

Enteromorpha flexuosa (Wulfen ex Roth) J. Agardh
Taylor (1930), Martins *et al.* (1991) e Altamirano & Nunes (1997).

Enteromorpha lingulata J. Agardh
Joly *et al.* (1969a).

Enteromorpha prolifera (Müller) J. Agardh
Howe (1928) e Taylor (1931).

Ulva fasciata Delile
Oliveira-Filho (1977), Kanagawa (1984),
Martins *et al.* (1991), Altamirano & Nunes (1997) e
Nunes (1997a, 1997b).

Ulva lactuca Linnaeus
Martius *et al.* (1833), Howe (1928 também
como *U. rigida*), Taylor (1931 também como *U. lactuca f. rigida*), Kanagawa (1984), Oliveira
(1989), Martins *et al.* (1991), Altamirano & Nunes
(1997) e Nunes (1997a, 1997b).

Bolbocoleon jolyi Yamaguishi-Tomita
Yamaguishi-Tomita (1970).

CLADOPHORALES

Anadyomenaceae

Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh
Howe (1928), Taylor (1930, 1931), Joly *et al.*
(1969a), Teixeira *et al.* (1985), Martins *et al.* (1991),
Santos (1992), Altamirano & Nunes (1997) e Nunes
(1997b).

Microdictyon boergesenii Setchell
Taylor (1931).

Microdictyon vanbosseae Setchell
Teixeira *et al.* (1985).

Cladophoraceae

Chaetomorpha antennina (Bory) Kützing
Howe (1928 como *C. media*), Taylor (1931
como *C. media*) e Martins *et al.* (1991).

Cladophora coelothrix Kützing
Martins *et al.* (1991).

Cladophora prolifera (Roth) Kützing
Martins *et al.* (1991) e Altamirano & Nunes (1997).

Cladophora vagabunda (Linnaeus) van den Hoek*
Bahia: Salvador, Praia da Pituba (ALCB 17434), Praia de Itapoã (ALCB 22122). Coletada no
mesolitoral.

Rhizoclonium riparum (Roth) Kützing ex Harvey
Joly *et al.* (1969a).

Siphonocladaceae

Chamaedoris peniculum (Solander) Kuntze
Taylor (1930, 1931), Teixeira *et al.* (1985),
Martins *et al.* (1991) e Nunes (1997a).

Cladophoropsis membranaceae (C. Agardh)
Børgesen
Oliveira-Filho (1977) e Martins *et al.* (1991).

- Phyllodictyon anastomosans*** Kraft & Wynne
Joly et al. (1965b como *Struvea anastomosans*) e Martins et al. (1991 como *S. anastomosans*).
- Ventricaria ventricosa*** (J. Agardh) Olsen & J. West
Taylor (1930, 1931 como *Valonia ventricosa*), Martins et al. (1991 como *Valonia ventricosa*).
- Valoniaceae
- Dictyosphaeria cavernosa*** (Forsskål) Børgesen
Joly et al. (1969a).
- Dictyosphaeria versluyssii*** Weber-van Bosse
Joly et al. (1969a, 1969b), Martins et al. (1991), Santos (1992), Altamirano & Nunes (1997).
- Valonia aegagropila*** C. Agardh
Joly et al. (1969a), Martins et al. (1991), Santos (1992) e Altamirano & Nunes (1997).
- Valonia macrophysa*** Kützing
Joly et al. (1969a), Martins et al. (1991).
- BRYOPSIDALES
- Chaetosiphonaceae***
- Blastophysa rhizopus*** Reinke
Teixeira et al. (1985).
- Bryopsidaceae
- Bryopsis pennata*** Lamouroux
Howe (1928 como *B. harveyana*), Taylor (1931 como *B. pennata* var. *secunda*), Martins et al. (1991), Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997b).
- Bryopsis plumosa*** (Hudson) C. Agardh
Joly et al. (1969a).
- Derbesia marina*** (Lyngbye) Solier
Oliveira-Filho et al. (1979).
- Codiaceae
- Codium decorticatum*** (Woodward) Howe
Taylor (1931 como *C. tomentosum*) e Teixeira et al. (1985).
- Codium intertextum*** Collins & Harvey
Howe (1928), Taylor (1931), Martins et al. (1991) e Santos (1992).
- Codium isthmocladum*** Vickers
Teixeira et al. (1985), Oliveira (1989) e Martins et al. (1991).
- Codium repens*** P. & H. Crouan ex Vickers
Gepp & Gepp (1905 como *C. tomentosum*).
- Codium taylorii*** Silva
Martins et al. (1991).
- Caulerpaceae
- Caulerpa cupressoides*** (West in Vahl) C. Agardh
De Toni (1889 como *Caulerpa lycopodium*), Joly et al. (1969a), Martins et al. (1991 como *C. cupressoides* var. *cupressoides* e *C. cupressoides* var. *lycopodium*) e Altamirano & Nunes (1997).
- Caulerpa fastigiata*** Montagne
Howe (1928) e Martins et al. (1991).
- Caulerpa floridana*** W. Taylor
Joly et al. (1976).
- Caulerpa kempfii*** Joly & Pereira*
- Bahia: Camaçari, Praia de Arembépe (ALCB 32302). Coletada no infralitoral.
- Caulerpa lanuginosa*** J. Agardh
Joly et al. (1969a).
- Caulerpa mexicana*** Sonder ex Kützing
Taylor (1930 como *C. crassifolia* f. *mexicana*), Taylor (1931 como *C. crassifolia* f. *mexicana*), Oliveira (1989) e Altamirano & Nunes (1997).
- Caulerpa prolifera*** (Forsskål) Lamouroux
Taylor (1931) e Joly et al. (1969a).
- Caulerpa pusilla*** (Kützing) J. Agardh
Teixeira et al. (1985).
- Caulerpa racemosa*** (Forsskål) J. Agardh var. *peltata* (Lamouroux) Eubank
Martens (1870 como *Chauvinia chemnitzia*), Taylor (1931 como *C. peltata*), Joly et al. (1969a)

como *C. peltata*), Martins et al. (1991) e Santos (1992).

Caulerpa racemosa* (Forsskål) J. Agardh var. *racemosa

Martius et al. (1833 como *C. sedoides*), Martens (1870 como *C. sedoides*), Taylor (1931 também como *C. racemosa* var. *uvifera*), Joly et al. (1969a), Martins et al. (1991), Santos (1992) e Altamirano & Nunes (1997).

***Caulerpa scalpelliformis* (R. Brown ex Turner) C. Agardh**

De Toni (1889 como *C. denticulada*), Joly et al. (1965a como *C. scalpelliformis* f. *denticulata*).

***Caulerpa serrulata* (Forsskål) J. Agardh**

Martins et al. (1991).

***Caulerpa sertularioides* (S. G. Gmelin) Howe**

Martins et al. (1991) e Altamirano & Nunes (1997).

***Caulerpa verticilata* J. Agardh**

Joly et al. (1969a), Teixeira et al. (1985) e Martins et al. (1991).

***Caulerpa webbiana* Montagne**

Joly et al. (1969a).

***Caulerpella ambigua* (Okamura) Prud'homme & Lokhorst**

Joly et al. (1969a como *Caulerpa vickersiae*)

Udoteaceae

***Avrainvillea nigricans* Decaisne**

Martins et al. (1991).

Boodleopsis pusilla* (Collins) W. Taylor, Joly & Bernatowicz

Bahia: Conde. Barra do Itariri (ALCB 32303). Coletada no mesolitoral. Associada a *Asteronema rhodochortonoides*, *Caulerpa fastigiata* e *Sphacelaria tribuloides*.

***Halimeda discoidea* Decaisne**

Joly et al. (1969a), Martins et al. (1991) e Altamirano & Nunes (1997).

***Halimeda incrassata* (Ellis) Lamouroux**
Teixeira et al. (1985).

***Halimeda opuntia* (Linnaeus) Lamouroux**

Martens (1870), Möbius (1889), Piccone (1889), Howe (1928), Taylor (1931), Gouvea & Leite (1980), Martins et al. (1991), Santos (1992), Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997a, 1997b).

***Halimeda tuna* (Ellis & Solander) Lamouroux**

Taylor (1930, 1931) e Joly et al. (1969a).

***Penicillus capitatus* Lamarck**

Joly et al. (1969a) e Santos (1992).

***Rhipilia fungiformis* Joly & Ugadim in Joly et al.**

Joly et al. (1965b).

***Udotea cyathiformis* Decaisne**

Taylor (1930, 1931), Joly et al. (1969a) e Martins et al. (1991).

***Udotea flabellum* (Ellis & Solander) Lamouroux**

Dickie (1874 como *Udotea halimeda*), Joly et al. (1969a), Oliveira-Filho (1974) e Martins et al. (1991).

***Udotea occidentalis* Gepp & Gepp**

Martens (1870 como *U. halimeda* Kützing) e Taylor (1931).

DASYCLADALES

Dasycladaceae

***Neomeris annulata* Dickie**

Martins et al. (1991) e Santos (1992).

Dasycladus vermicularis* (Scopoli) Krasser

Bahia: Camaçari, Praia de Arembape (ALCB 32304). Coletada no infralitoral.

Polyphysaceae

***Acetabularia crenulata* Lamouroux**

Joly et al. (1965a).

***Acetabularia myriospora* Joly & Cordeiro-Marino**

Joly et al. (1965b), Martins et al. (1991 como *Polyphysa myriospora*) e Santos (1992 como *Polyphysa myriospora*).

Acetabularia pusilla (Howe) Collins
Santos (1992).

ESPÉCIES DUVIDOSAS

Lithothamnion fasciculatum (Lamarck) Areschoug
Möbius (1889), Taylor (1931) e Oliveira-Filho
(1977).

Lithothamnion scabiosum (Harvey) Foslie
Taylor (1931) e Oliveira-Filho (1977).

Sphaerococcus dumosus Martius
Martius et al. (1833) e Oliveira-Filho (1977).

Gastroclonium ovatum (Hudson) Papenfuss
Martens (1870 como *G. ovale*), Taylor (1931
como *G. ovale*) e Oliveira-Filho (1977).

Callithamnion dasytrichum VER AUTOR
Taylor (1931), Oliveira-Filho (1977).

Sargassum maximiliani (Shrader) Martius
Taylor (1931) e Oliveira-Filho (1977).

Caulerpa murrayi Weber van Bosse
Gepp & Gepp (1905), Taylor (1931) e Oliveira-
Filho (1977).

AGRADECIMENTOS: A Dra. Mutue Toyota Fujii
da Seção de Ficologia do Instituto de Botânica de São
Paulo, pela confirmação dos táxons do gênero
Laurencia Lamouroux, e valiosas sugestões, ao Prof.
Cid José Passos Bastos do Depto. de Botânica, I.B. –
UFBA, pela rigorosa revisão do manuscrito, ao Dr.
Francisco Conde Poyales do Depto. de Biologia Vegetal
da Universidade de Málaga e Dr. Michael J. Wynne do
Dept. de Biologia da Universidade de Michigan pela
revisão criteriosa e sugestões indispensáveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALTAMIRANO, M. & J.M. de CASTRO NUNES, -
1997- Contribuciones al macrofitobentos del
municipio de Camaçari (Bahia, Brasil). *Acta
Bot. Malacitana* 22: 211-215.
BRAGA, M.R. de A. -1986. Estudos taxonômicos
em *Gigartina teedii* (Roth) Lamouroux e *G.*

- elegans* Greville in Saint-Hilaire (Rhodophyta,
Gigartinales). *Revta brasil. Bot.* 9: 191-199.
BUYSS, S. C. & M.T.M. SZÉCHY, de. -1997-
Corallina panizzoi Schnetter et Richter
(Corallinales, Rhodophyta) en el litoral
brasileño. *Revta. brasil. Biol.*, 57 (1): 71-77.
CHOU, R. C-Y. -1945. Pacific species of *Galaxaura*.
1. Asexual types. *Pap. Mich. Acad. Sci.* 30: 35-
55.
DE TONI, G.B. -1889- *Sylloge algarum omnium
hucusque cognitarum.* I (*Sylloge
Chlorophycearum*): 1-12 + I-CXXXIX + 1-1315.
DICKIE, G. -1874- Enumeratio of algae collected
from Bahia by H. N. Moseley, M. A., naturalist
to H. M. S. "Challenger". *J. Linn. Soc. (Bot.)*
14: 377.
GEPP, A. & E. S. GEPP -1905- Atlantic algae of the
"Scotia". *J. Bot., London*, 43:109-110.
GOUVEA, E. P. & Y.M.R. LEITE -1980- A
carcinofauna do fital de *Halimeda opuntia*
(Linnaeus) Lamouroux e a variação sazonal de
sua densidade. *Ciência e Cultura* 32 (5): 596-
600.
GUIMARÃES, S. M. P. B. -1996- Taxonomy of the
flattened Solieriaceae (Rhodophyta) in Brazil:
Agardhiella and *Meristiella*. *J. Phycol.* 32: 656-
668.
HOWE, M. A. -1928- Notes on some marine algae
from Brazil and Barbados. *J. Wash. Acad. Sci.,
Washington* 18 (7): 186-194.
HOWE, M. A. & W.R. TAYLOR -1931- Notes on
some new or little-known marine algal from
Brazil. *Brittonia* 1: 7-33.
JOLY, A. B. & UGADIM, Y. -1966- The
reproduction of *Ochtodes secundiramea*
(Montagne) Howe, (Gigartinales-
Rhizophyllidaceae). *Bolm. Inst. Oceanogr., São
Paulo* 15 (1): 55-64.
JOLY, A. B., M. SAZIMA & J. SEMIR -1976-
Brazilian deep water marine algae additions to
the Brazilian flora IV. *Bol. Botânica, Univ. S.
Paulo* 4: 121-128.
JOLY, A. B., J. SEMIR & Y. WAKABARA -1978-
Brazilian deep-water marine algae: additions to
the Brazilian flora-V. *Revta. Brasil. Bot.* 1:
125-129.
JOLY, A. B., E.C. de OLIVEIRA FILHO & W. NARCHI
-1969a- Projeto de criação de um Parque Nacional
Marinho na Região de Abrolhos, Bahia. *An. Acad.
brasil. Ciênc. (supl.)* 41: 247-251.

- JOLY, A. B., M. CORDEIRO-MARINO, N. YAMAGUISHI-TOMITA, Y. UGADIM, E. C. de OLIVEIRA-FILHO & M.M. FERREIRA - 1965a- Additions to the marine flora of Brazil V. *Arq. Est. Biol. Mar. Univ. Ceará* 5 (1): 65-78.
- JOLY, A.B., M. CORDEIRO-MARINO, Y. UGADIM, N. YAMAGUISHI-TOMITA & F.C. PINHEIRO -1965b- New marine algae from Brazil. *Arq. Est. Biol. Mar. Univ. Ceará* 5 (2): 79-92.
- JOLY, A. B., Y. UGADIM, J.J.G. DIAZ, N. YAMAGUISHI-TOMITA, M. CORDEIRO-MARINO & Y. YONESHIGUE-BRAGA - 1969b- Additions to the marine flora of Brazil X. *Rickia* 4: 61-74.
- JOLY, A.B., Y. UGADIM, E.C. de OLIVEIRA-FILHO & M. CORDEIRO-MARINO -1967- Additions to the marine flora of Brazil VI. *Bolm. Fac. Filos. Ciênc. Univ. S. Paulo.* 305 (bot.) (2): 171-194.
- KANAGAWA, A.I. -1984- *Clorofíceas marinhas bentônicas do Estado da Paraíba, Brasil*. Tese Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 470p.
- LEITE, Y.M.R. -1982- Estudo das algas bentônicas e dos mangues da Baía de Aratu e do estuário de Maragojipe. In: Bahia. Secretaria da Indústria e Comércio (ed). *Diagnose ecológica da Baía de Aratu. (Salvador, BA)* 3: 165-184.
- MARTENS, G. von. -1870- Conspectus algarum Brasiliæ hactenus detectarum. *Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren* 2: 297-314.
- MARTINS, D.V., M. CORDEIRO-MARINO, N.B. BOCCANERA & J.M. de CASTRO NUNES, - 1991- Clorofíceas marinhas bentônicas do município de Salvador, Bahia, Brasil. *Hoehnia* 18 (2): 115-133 + 33 il.
- MARTIUS, K.F.P. von, F.G. ESCHWEILLER & C.G.N. von. ESENBECK -1833- *Flora Brasiliensis seu enumeratio plantarum in Brasília ...* 1, 1: IV + 390pp. (Algae 1-50). 8 vo. Stuttgart et Tübingen.
- MÖBIUS, M. -1889- Bearbeitung der von H. Shenk in Brasilien gesammelten Algen. *Hedwigia* 28: 309-347 + pls. 10-11.
- MÖBIUS, M. -1890- *Algae brasiliensis a cl. Dr. Glaziou colectae. Notarisia* 5: 1065-1090 + 1 pl.
- MONTAGNE, J.F.C. -1839- *Cryptogamae brasiliensis seu plantae cellulares quas in itinere per brasiliam...(algae). Annls. Sci. nat. Bot.* 12: 42-44.
- MOURA, C. W. do N. -1994- *Coralináceas com genículo (Corallinales, Rhodophyta) do litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. 254p.
- NUNES, J.M. de C. -1997a- Hypnaceae, Rhodymeniaceae, Ceramiaceae e Rhodomelaceae (Rhodophyta) das praias de Placafor e Itapoã, Município de Salvador, Bahia, Brasil. *Biotemas* 10 (2): 61-75.
- NUNES, J.M. de C. -1997b- Rodofíceas marinhas bentônicas da orla oceânica de Salvador, Estado da Bahia, Brasil. *Ínsula*. (in press).
- OLIVEIRA, E.C. -1989. Uma antiga coleção de algas marinhas do litoral brasileiro. *Ciência e Cultura* 41 (4): 402-403.
- OLIVEIRA-FILHO, E.C. de. -1974- An annotated list of the Brazilian seaweeds in Dickie's herbarium. *J. Linn. Soc. (bot.)* 69 (3): 229-238.
- OLIVEIRA FILHO, E.C. de. -1977- *Algás Marinhas Bentônicas do Brasil*. São Paulo, 407p. Tese (Livre-Docência) - Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo.
- OLIVEIRA FILHO, E.C. de & Y. UGADIM -1974- New references of benthic marine algae to the Brazilian Flora. *Bolm. Botânica, Univ. S. Paulo* 2: 71-91.
- OLIVEIRA FILHO, E.C. de, Y. UGADIM & E.J. de. PAULA -1979- Comunidades associadas a plantas de *Sargassum* flutuantes em águas da corrente do Brasil – considerações biogeográficas. *Bol. Botânica, Univ. S. Paulo* 7: 5-9.
- PICCONE, A. -1885- Notizie preliminari intorno alle alghe della "Vettor Pisani" ... *Nuovo G. Bot. Ital.* 17: 185-188.
- PICCONE, A. -1886a- Alghe del viaggio di circumnavigazione della "Vettor Pisani". *Contr. Phycol. Extra-Ital.*: 283-287.
- PICCONE, A. -1886b- Alghe del viaggio di circumnavigazione della "Vettor Pisani". *Contr. Phycol. Extra-Ital.*: 87p. + 2 pls.
- PICCONE, A. -1889- Nuove alghe del viaggio di circumnavigazione della "Vettor Pisani". *Atti Acad. Lincei. Mem. Cl. Sci. Fisiche, Mat. e Nat.* 6: 10-63.
- PINHEIRO-JOVENTINO, F. -1977- Morfologia, taxonomia e distribuição de *Cryptonemia* J.

- Agardh, no Brasil (Rhodophyta, Cryptonemiaceae). *Arq. Ciênc. Mar* 17 (1): 1-19.
- SANTOS, G.V. dos. -1992- *Composição e Microdistribuição de comunidades de algas bentônicas no recife de coral da praia de Coroa (Ilha de Itaparica-Bahia-Brasil)*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal Rural de Pernambuco. 170p.
- SEMIR, J. -19977- Aspectos da morfologia e biologia de *Colpomenia sinuosa* (Scitosiphonaceae, Phaeophyta), na região de Ubatuba. São Paulo, 102p., Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de Biociências da Universidade do Estado de São Paulo.
- SILVA, P.C., E.G. MENEZ & R.L. MOE -1987- *Catalog of the marine algae of the Philippines*. Smithsonian Contributions to the Marine Sciences 27. 179p.
- SILVA, P.C., P.W. BASSON & R.L. MOE -1996- *Catalogue of the benthic marine algae of the Indian Ocean*. University of California Press, Berkeley, USA. 1259p.
- TAYLOR, W.R. -1930- Algae collected on the Hassler, Albatross and Schmidth Expeditions: I. Marine algae from Brazil. *Am. J. Bot.* 16: 621-630.
- TAYLOR, W.R. -1931- A synopsis of the marine algae from Brazil. *Rev. Algol.* 5: 279-313.
- TEIXEIRA, V.L., R.C. PEREIRA, J.A. MUNIZ & L.F.F. da SILVA -1985- Contribuição ao estudo de algas de profundidade da costa sudeste do Brasil. *Ciência e Cultura* 37 (5): 809-815.
- UGADIM, Y. -1987- Distribuição das espécies de *Gelidium* e *Pterocladia* (Gelidiaceae - Rhodophyta) no litoral brasileiro. *Nerítica* 2 (supl.): 65-74.
- WEBER van BOSSE, A. -1898. Monographie des Caulerpes. *Ann. Jard. Bot. Buitenz* 15: 243-401.
- WILLIAMS, L.G. & H.L. BLOMQUIST -1947- A collection of marine algae from Brazil. *Bull. of the Torrey Botanical Club*. 74 (5): 383-397.
- WYNNE, J.M. -1998- A checklist of marine algae of tropical and subtropical western Atlantic: first revision. *Nova Hedwigia* 116:1-155.
- YAMAGUISHI-TOMITA, N. -1970- *Bolbocoleon jolyi*, a new species of Chaetophoraceae (Chlorophyceae) from Redonda Island, Abrolhos, eastern Brazil. *Phycologia* 9 (2): 125-132.

Aceptado para su publicación en Junio de 1998

Endereço do autor. Departamento de Botânica, Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, Campus de Ondina. CEP40.170-210, Salvador, Bahia, Brasil. Departamento de Ciências da Universidade do Estado da Bahia, Rodovia Alagoinhas/Salvador, km 03, CEP48.100-000, Alagoinhas, Bahia, Brasil.
E-mail: jmcnunes@ufba.br