

29ª Jornadas de la Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental – AEN

En Granada, del 14 al 16 de noviembre de 2013

Presentadora del poster

AUTORES

DNI: 25050534-S

Nombre: Berta

Apellidos: Moreno Küstner

Filiación: Profesora Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga

Email: bertamk@uma.es

1º co-autor

DNI: 74878067A

Nombre: José

Apellidos: Guzmán Parra

Filiación: Especialista en psicología clínica. UGC Salud Mental Carlos Haya. Málaga

Email: jgp00004@hotmail.com

2º co-autor

DNI: 25941215K

Nombre: Ana María

Apellidos: Martínez García

Filiación: Médico de Familia, Directora UGC. Dispositivo De Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU). Distrito Sanitario

Email: anai.martinez.sspa@juntadeandalucia.es

3º co-autor

DNI: 24825159V

Nombre: Cristobalina

Apellidos: Guillén Benítez

Filiación: MEDICA FAMILIA DEL DISPOSITIVO CUIDADOS CRITICOS Y

URGENCIAS (DCCU). Distrito Sanitario Málaga

Email: cguillen@ma.epes.es

RESUMEN DEL POSTER

Título

Frecuentación de las emergencias extra-hospitalarias: adicciones y salud mental.

Introducción

La hiperfrecuentación de los servicios de urgencias ha sido asociada a los trastornos mentales, el abuso de sustancias, problemas psicosociales y dificultades socioeconómicas. En el ámbito extrahospitalario, en concreto, el mayor aumento se ha producido en las demandas de tipo psiquiátrico.

El objetivo de este estudio es analizar las demandas psiquiátricas a los servicios de emergencias extra-hospitalarias y calcular el tiempo que transcurre entre la repetición de la demanda.

Material y métodos

Estudio observacional, transversal. Se utilizó la base de datos del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de Málaga (DCCU) del año 2008. Se analizó a los pacientes con un diagnóstico (CIE-9) realizado por el médico que atendió la demanda (n=24619). Para la comparación de las demandas se utilizó la prueba de *Kruskal-Wallis* y la *Ji Cuadrado*. Se calculó el número de días hasta la siguiente demanda mediante un análisis de supervivencia (Kaplan-Meier).

Resultados y conclusiones

Un 14.3 % de los pacientes presentaba un diagnóstico psiquiátrico o de abuso y/o dependencia de sustancias. Los diagnósticos más frecuentes fueron “trastornos afectivos” (55.9%) seguido de “abuso y/o dependencia de sustancias” (21.7%). Los pacientes que más frecuentemente volvieron a hacer una demanda fueron los clasificados con “otros diagnósticos psiquiátricos” (40.4%), “esquizofrenia y psicosis” (39.6%) y los que menos los que presentan diagnóstico de “abuso y dependencia de sustancias” (27.5%) ($p < 0.01$). Los que más tardaron en realizar una nueva demanda fueron los “trastornos afectivos” con un tiempo de 61.05 días de media ($p < 0.01$). En conclusión, un importante número de demandas a los servicios de urgencias extrahospitalarias están relacionadas con problemáticas mentales y consumo de sustancias.

Referencias bibliográficas

1 Locker, T. E., Bastón, S., Masón, S.M. y Nicholl, J. (2007). Defining frequent use of an urban emergency department. *Emergency Medical Journal*, 24(6):398-401.