

PENGGUNAAN ANALGESIK UNTUK PERAWATAN PALIATIF PASIEN KANKER DI PUSKESMAS DI SURABAYA

Vina Fitriana Pratiwi, 2015

Pembimbing : (I) Fauna Herawati

ABSTRAK

Gejala paling umum dan menyediakan pada pasien kanker adalah nyeri. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui profil penggunaan analgesik dan mengetahui tingkat kualitas hidup pasien kanker setelah mendapatkan perawatan paliatif dengan alat ukur nyeri berupa kuesioner *Brief Pain Inventory* (BPI) dan kuesioner *Indonesian Barrier Questionnaire* (IBQ). Penelitian ini adalah *non eksperimental* dengan rancangan penelitian *cross sectional*. Pasien kanker diberikan alat ukur nyeri dan kuesioner pada saat datang ke Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil penggunaan analgesik pada pasien kanker sudah sesuai dengan pedoman bebas nyeri WHO yaitu *step 2* pengobatan untuk nyeri ringan hingga sedang dengan obat yang digunakan kombinasi antara kodein dan parasetamol. Kualitas hidup pasien kanker yang telah menerima perawatan paliatif sudah cukup baik, diukur menggunakan alat ukur untuk penilaian nyeri BPI (*Brief Pain Inventory*) terlihat bahwa nyeri yang dirasakan nyeri ringan dengan hasil penilaian 0,8322 serta diukur menggunakan kuesioner IBQ (*Indonesian Barrier Questionnaire*) dapat terlihat hambatan yang terjadi adalah kecil dengan hasil penilaian 0,432.

Kata Kunci : Perawatan paliatif, analgesik, *Brief Pain Inventory* (BPI), *Indonesian Barrier Questionnaire* (IBQ)

THE USE OF ANALGESICS FOR PALLIATIVE CARE OF CANCER PATIENTS IN PRIMARY HEALTH CENTER IN SURABAYA

Vina Fitriana Pratiwi, 2015

Supervisors: (I) Fauna Herawati

ABSTRACT

The most common and distressing symptom in cancer patients is pain. Therefore it will be carried out research aimed determine the profile of analgesic usage and determine the level of quality of life of cancer patients after receiving palliative care with a measuring instrument like questionnaire Brief Pain Inventory (BPI) and Indonesian Barrier Questionnaire (IBQ) questionnaire. This is a non-experimental study with cross sectional study design. Cancer patients are given the tools and questionnaire measuring pain when it comes to primary health center. The results showed that the profile of the use of analgesics in cancer patients has been pain relief accordance to WHO that the step 2 for the treatment of mild to moderate pain, with drugs combination between codein and paracetamol. Quality of life of cancer patients who receive palliative care is quite good, is measured using a measuring instrument for pain assessment Brief Pain Inventory (BPI) shows that the pain felt mild pain with result 0,8322 and measured using a Indonesian Barrier Questionnaire (IBQ) questionnaire can be seen obstacles that occur are small with assessment result 0,432.

Keyword : Palliative care, analgesic, Brief Pain Inventory (BPI), Indonesian Barrier Questionnaire (IBQ)