

Estabilidad de la comorbilidad entre el TND y los TA en preescolares

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

brought to you by CORE

provided by Diposit Digital de Documents de la UAB



CORE
SALUT
MENTAL

V. Martín¹, R. Granero², G.M. Domenech³ y E. Ezpeleta¹

¹Unitat d' Epidemiologia i de Diagnòstic en Psicopatologia del Desenvolupament (2014 SGR 312)

²Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

³Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències i del Comportament



Objetivo

Explorar la estabilidad de la comorbilidad entre el trastorno negativista desafiante (TND) y los trastornos de ansiedad (TA) en niños/as preescolares

Método

Diseño

Muestra comunitaria

622 preescolares (3 años)
574 preescolares (5 años)

Grupo TND	Grupo TA	Grupo TND+TA	
<i>n</i> = 44	<i>n</i> = 42	<i>n</i> = 17	Edad 3
<i>n</i> = 31	<i>n</i> = 60	<i>n</i> = 15	Edad 5

Medidas

Diagnostic Interview for Children and Adolescents for Parents of Preschool and Young Children
DICA-PPYC
(Reich y Ezpeleta, 2009)



Resultados

Edad: 5 años	Edad: 3 años	
	Ausente	Presente
Presente	11 1,50%	4 0,35%
Ausente	548 96,7%	11 1,50%

Incidencia de desarrollar comorbilidad TND+TA de los 3 a los 5 años

1.60%
(IC 95%: 0,84 a 3,02)

Riesgo de remisión de comorbilidad TND+TA durante los 3-5 años

80%
(IC 95%: 49,0 a 94,3)



Conclusiones

- La comorbilidad entre TND+TA tiene una estabilidad débil desde los 3 a los 5 años. Otros estudios, como Lavigne et al. (2001), han hallado valores moderados-altos.
- La existencia de estabilidad de comorbilidad entre TND+TA pone de manifiesto la necesidad de estrategias de intervención debido al deterioro funcional que provoca esta psicopatología conjunta en los niños y que puede persistir a lo largo del desarrollo.