



Castroviejo Bolibar, Santiago & al. (eds.)

Flora iberica. [...] Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae... (2012)

Índice

1. 3

2. 4

3. 5

CXXX. GENTIANACEAE [nom. cons.]*

Hierbas anuales o perennes, rizomatosas o estoloníferas, inermes, glabras –salvo por la presencia de papilas o coléteres–. Tallos de sección circular o tetrágonos, a veces con 4(6) alas estrechas, foliosos en general. Hojas simples, generalmente opuestas y decusadas, con menor frecuencia alternas o triverticiladas, sésiles o pecioluladas, sin estípulas, las basales a veces rosuladas; lámina entera, con 1-5 nervios que nacen de la base. Inflorescencia terminal, cimosa, en monocasio, dicasio, panícula tirsoidea, racimo de verticilastros, o reducida a una sola flor, generalmente con brácteas foliáceas. Flores hermafroditas, en general actinomorfas, tetrámeras o pentámeras, con menor frecuencia hexámeras o polímeras, hipóginas, diclamídeas, a veces con nectarios en la base del gineceo o de la corola, con o sin bractéolas, subsésiles o pediceladas. Cáliz gamosépalo, a veces con el tubo muy corto, generalmente anular o cilíndrico, con lóbulos diferenciados, rara vez espatáceo, en ocasiones con una membrana intracalicina formada por un repliegue epidérmico. Corola gamopétala, de preflorescencia plegada o contorta, hipocrateriforme, infundibuliforme, campanulada, urceolado-campanulada o rotácea, o con pliegues y apéndices entre los lóbulos, con apéndices adaxiales en la base de los lóbulos (lígulas corolinas). Androceo haplostémono, con 4-6(9) estambres adnatos al tubo de la corola, alternipétalos, exertos o inclusos; filamentos subcilíndricos o alados; anteras ditecas y tetrasporangiadas, basifijas o dorsifijas, introrsas, libres o connatas alrededor del estilo, con dehiscencia longitudinal o poricida. Gineceo súpero, bicarpelar, sincárpico, con o sin nectarios en la base; ovario sésil o estipitado, unilocular o pseudobilocular por intrusión de las suturas carpelares, con placentación parietal, submarginal o pseudoaxial a lo largo de las suturas; rudimentos seminales numerosos, generalmente anátropos; estilo diferenciado o no, con frecuencia bifurcado, cada rama ensanchada en un lóbulo estigmático; lóbulos estigmáticos libres o connatos –estigma subcapitado–, con papilas situadas principalmente en la cara abaxial. Fruto en cápsula septicida, sésil o estipitada, dehiscente por 2 valvas. Semillas numerosas, ápteras o aladas; cubierta seminal reducida a la exotesta, con frecuencia reticulada; endosperma lipídico-proteico; embrión pequeño, recto.

Observaciones.–La familia incluye 87 géneros y más de 1600 especies repartidas por todo el mundo. Sus límites y el número de géneros admitidos han sufrido cambios importantes durante los últimos 50 años, pero se acepta actual-

* C. Romero Zarco & A. Quintanar (eds.)

mente como una familia natural de acuerdo con los estudios recogidos en el trabajo de L. Struwe & V.A. Albert (eds.), *Gentianaceae Syst. Nat. Hist.* (2002). En dicha obra se propone una clasificación de la familia en seis tribus de las que dos, *Gentianeae* y *Chironieae*, incluyen a los géneros representados en nuestro territorio.

La presencia de papilas cortas, escuámulas o coléteres en la base de las hojas y en el cáliz—rara vez también en la corola— es un carácter frecuente en la familia y cuyas variaciones se han omitido por su escaso valor diagnóstico.

Bibliografía.—A.P. DE CANDOLLE, *Prodr.* 9: 38-141 (1845); E.F. GILG in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, *Nat. Pflanzenfam.* 4(2): 50-108 (1895); A.H.R. GRISEBACH, *Gen. Sp. Gent.* (1838); K. RÖNNIGER in *Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark* 52: 312-321 (1916); L. STRUWE & V.A. ALBERT (eds.), *Gentianaceae Syst. Nat. Hist.* (2002).

1. Corola con lóbulos de margen fimbriado en la mitad inferior, lígulas corolinas fimbriadas o nectarios fimbriados en la base 2
- Corola con lóbulos enteros y sin lígulas corolinas ni nectarios fimbriados, a veces con pliegues y apéndices enteros, bifidos o dentados entre los lóbulos 5
2. Flores pentámeras, ocasionalmente alguna tetrámera; corola con (8)10 nectarios fimbriados –2 por pétalo— situados en la base de los lóbulos; lóbulos de margen dentado en el ápice **5. Swertia**
- Flores tetrámeras o, con menor frecuencia, pentámeras; corola con 4-8 nectarios desnudos –1-2 por pétalo— situados en la base del tubo, con lóbulos de margen fimbriado en la mitad inferior, o bien con 1 ó 2 lígulas corolinas fimbriadas en la base 3
3. Corola 30-50(60) mm, sin lígulas, con lóbulos de margen fimbriado en la mitad inferior; cápsula con estípite de 6,5-13 mm **4. Gentianopsis**
- Corola 7-35 mm, con 1 ó 2 lígulas fimbriadas en la base de cada lóbulo; lóbulos enteros; cápsula sésil o con estípite de 0,5-5 mm 4
4. Inflorescencia frecuentemente en panícula o en racimo, con brácteas foliáceas, a veces reducida a una sola flor; corola con una lígula, fimbriada y vascularizada, en la base de cada lóbulo; cápsula ± estipitada **2. Gentianella**
- Inflorescencia reducida a una sola flor apical, separada de las hojas; corola con 2 lígulas, fimbriadas y no vascularizadas, en la base de cada lóbulo; cápsula sésil **3. Comastoma**
5. Corola generalmente con pliegues y apéndices entre los lóbulos, excepcionalmente sin ellos en plantas con inflorescencia en racimo de verticilastros –*G. lutea*—; ovario estrechado gradualmente en un estilo escasamente definido, persistente, o bien sin estilo definido; cápsula 15-75 mm **1. Gentiana**
- Corola sin pliegues ni apéndices entre los lóbulos; ovario con estilo filiforme, caduco; cápsula 2,8-19 mm 6
6. Flores hexámeras o polímeras, con 6-9(12) piezas en cada verticilo; lóbulos estigmáticos libres, profundamente hendidos **10. Blackstonia**
- Flores tetrámeras o pentámeras; lóbulos estigmáticos libres o soldados, enteros 7
7. Flores tetrámeras o pentámeras, sésiles o con pedicelo generalmente más corto que la flor; anteras claramente retorcidas helicoidalmente tras la dehiscencia 8
- Flores tetrámeras, con pedicelo frecuentemente de mayor longitud que la flor; anteras no o ligeramente retorcidas tras la dehiscencia 9
8. Inflorescencia corimbiforme, umbeliforme o paniculiforme, formada por cimas, rara

1. *Gentiana*

- vez reducida a una flor; cimas dicasiales, a menudo evolucionando a monocasiales; lóbulos estigmáticos libres, separados o algo convergentes en anthesis **6. *Centaurium***
- Inflorescencia espiciforme o racemiforme, con ramificación predominantemente monocasial; lóbulos estigmáticos redondeados, convergentes en anthesis, con la apariencia de un estigma subcapitado **7. *Schenkia***
9. Cáliz con lóbulos de mayor longitud que el tubo, oblongo-lanceolados, con margen membranáceo estrecho en la mitad inferior; corola con lóbulos rosados o blanco-amarillentos, rara vez blancos; tallo muy ramificado desde la base, con 1 ó 2 ramas por nudo, generalmente erecto-patentes **8. *Exaculum***
- Cáliz con lóbulos más cortos que el tubo, subtriangulares, con margen membranáceo ancho hasta cerca del ápice; corola con lóbulos amarillos; tallo simple o escasamente ramificado, con ramas generalmente alternas y suberectas **9. *Cicendia***

GENTIANEAEE Dumort.

Flores con o sin nectarios. Cáliz con o sin membrana intracalicina. Corola de prefloración plegada o contorta, comúnmente con lígulas, o bien con pliegues y apéndices interlobulares. Estambres con filamento subcilíndrico o alado; anteras basifijas o dorsifijas, libres o connatas alrededor del estilo, rectas tras la anthesis. Ovario y fruto sésiles o estipitados. Semillas ápteras o aladas, lisas o reticuladas.

1. *Gentiana* L.*

[Gentiána, -ae f. – gr. *gentianḗ*, -ḗs f.; lat. *gentiana*, -ae f. = en Dioscórides y Plinio, principalmente, una planta que debe su nombre a su descubridor Genti, rey de los ilirios –gr. *Gént(h)ios*, -ou m.; lat. *Gentius*, -ii m.–; la que, según los autores, podría ser alguna genciana, como la *Gentiana lutea* L. y la *G. purpurea* L. El género *Gentiana* L. (*Gentianaceae*) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas anuales o perennes, con desarrollo simpodial o monopodial, glabras. Órgano subterráneo perdurante formado por rizomas horizontales o verticales de los que brotan los tallos aéreos, o bien por cepas que originan tallos hipogeos en forma de estolones perdurantes de los que parten los tallos aéreos. Tallos fértiles de sección ± circular, a veces con 4(6) ángulos ± alados. Hojas opuestas, las basales dispuestas o no en roseta, muy raramente verticiladas, las de los nudos inferiores frecuentemente fusionadas por la base formando una vaina. Inflorescencia cimosa (monotélica) en panícula (pleotirsoide) ± condensada (glomérulo o verticilastro), racimo determinado (botrioide), con brácteas foliáceas, o bien reducida a una sola flor. Flores tetrámeras o pentámeras, a veces hasta con 9 piezas en los verticilos, actinomorfas, rara vez algo zigomorfas, normalmente pediceladas, con bractéolas. Cáliz gamosépalo, generalmente tubular, con menor frecuencia espatáceo y abierto lateralmente, con una membrana intracalicina –a veces muy poco desarrollada– formada por un repliegue epidérmico –muy notable en la base de los lóbulos del cáliz–; lóbulos normalmente más cortos que el tubo. Corola sin lígulas, de prefloración plegada, normalmente grande y vistosa, hip-

* G. Renobales