

# Especies del género *Triplax* Payk.

(Col. Erotyl.)

DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y MARRUECOS

POR

MANUEL M. DE LA ESCALERA

En el tomo V de l'*Abeille*, 1868-69, apareció la *Mémoire des Erotyliens* (Engidos y Triplácidos) de Europa, Norte de Africa y Asia occidental, de M. Louis Bedel, primer trabajo de este autor, y que, como todos los suyos posteriores, es un modelo de estudio concienzudo y acabado, en el cual poco o nada hay que rectificar, y sólo añadir las especies descubiertas con posterioridad por unos y otros.

De las especies que en forma de cuadro aparecen ahora, y que todas pertenecen a la Sección A. de M. Bedel de «Cuerpo oblongo, subparalelo», son unas, *T. castanea* Peyerh. y *T. Peyerimhoffi* Esc., de Marruecos, y se incluye *T. breviscutata* Fairm. que no lo fué por Reitter en sus *Best. Tab.*, trabajo muy inferior al de M. Bedel, a cuyas características del género y descripción lata de las especies he de remitirme por no repetir las aquí.

Las figuras de algunas especies (lám. VI) de las citadas en mi cuadro han sido hechas con su maestría acostumbrada por D. Serapio Martínez.

## Especies de cuerpo oblongo-alargado, subparalelo.

1 (18). Cuerpo bicolor. Protórax rojo y élitros azules o negros.

2 (11). Cabeza roja.

3 (4). Élitros azules. Pecho y vientre por completo rojos. Cabeza, protórax y escudete rojos, así como las patas; sólo con las antenas y desde la base pardo-oscurecidas, casi negras. Protórax muy transversal, nada globoso, mirado perpendicularmente aparecen visibles sus aristas laterales, trapezoidal y de ángulos anteriores y posteriores nada caídos..... **T. aenea** Schall.

Long. 2,8 a 4 mm. Loc. Espinama (Picos de Europa) (Escalera).

- 4 (3). Élitros negros.
- 5 (6). Mesospecto y postpecto negros, abdomen rojo. Cabeza, protórax y patas rojas. Antenas por completo y desde la base negras, así como el escudete. Protórax poco globoso, transverso, mirado perpendicularmente aparecen visibles sus aristas laterales; de lados más curvilíneos y de ángulos anteriores más caídos. Élitros más anchos, más cortamente ovales..... **T. russica** L.  
Long. 4,5 a 6 mm. Loc. Espinama (Picos de Europa) (Escalera).
- 6 (5). Mesosterno rojizo y metasterno negro, abdomen pardo-rojizo. Cabeza, protórax y patas rojas.
- 7 (10). Antenas rojizas en la base y obscurecidas después. Angulos posteriores protorácicos poco agudos y no avanzados sobre los élitros.
- 8 (9). Protórax algo aplanado y muy transverso, con las aristas laterales de sus bordes visibles mirado perpendicularmente; su borde anterior poco avanzado sobre la cabeza; puntuación del mismo menuda, contigua y poco impresa. Élitros alargados, paralelos de lados y de húmeros redondeados, casi dos veces más largos que anchos, de contorno general parecido a los de *T. aenea*. Escudete pequeño, triangular, negro ( lám. VI, fig. 1).. **T. Lacordairei** Crotch. (*T. ruficollis* Lac.).  
Long. 3 a 4 mm. Loc. Tánger, Beni Msuar (Escalera).
- 9 (8). Protórax globoso, bastante convexo, poco transverso; mirado perpendicularmente no son visibles las aristas de sus lados; su borde anterior más avanzado sobre la cabeza; puntuación del mismo más aislada, fuerte, impresa. Élitros proporcionalmente más anchos y menos paralelos, redondeándose antes, y de húmeros algo angulosos, solamente vez y media más largos que anchos, de contorno general recordando a los de *T. russica*. Escudete grande, transversal, negro (lámina VI, fig. 2)..... **T. Peyerimhoffi** nov. sp.  
Long. 4 mm. Loc. Tachdirt en el Alto Atlas (1).
- 10 (7). Antenas completamente rojas desde la base; ángulos posteriores protorácicos agudos y avanzados sobre los élitros. Protórax muy convexo, globoso, con su mayor anchura en la base; con puntuación menuda, aislada y poco impresa. Élitros paralelos hasta la mitad, luego muy lentamente estrechados y redondeados en su final, de húmeros angulosos, vez y media más largos que anchos. Escudete pequeño, rojo, transverso ( lám. VI, fig. 4) ..... **T. breviscutata** Fairm.  
Long. 3 a 3,5 mm. Loc. Tánger (Escalera).
- 11 (2). Cabeza negra.
- 12 (17). Antenas rojas.

---

(1) El tipo, único visto de esa localidad, de la col. Peyerimhoff, tiene en el disco del protórax dos impresiones a modo de fosetas, pero esto ha de ser carácter accidental.

- 13 (16). Protórax de ángulos posteriores poco agudos, ni prolongados hacia atrás, poco transverso y bastante globoso, con su borde anterior bastante avanzado sobre la cabeza.
- 14 (15). Angulos anteriores del protórax poco caídos, visibles mirando el órgano perpendicularmente; puntuación del disco menuda y poca impresa. Élitros de ángulos humerales rectos, ligeramente estrechados aquéllos en ese punto, resultando su contorno algo estrangulado ahí; en óvalo muy alargado, de lados poco paralelos; casi dos veces más largos que anchos, con las estrías de puntos muy poco marcadas. Escudete negro, pero alguna vez rufescente, pequeño, triangular y algo transverso (lám. VI, fig. 3)..... **T. Bedeli** Reitt.  
Long. 2,8 a 4 mm. Loc. Tánger, Beni Msuar (Escalera).
- 15 (14). Angulos anteriores del protórax muy caídos, invisibles mirado el órgano perpendicularmente; puntuación del disco muy fuerte e impresa. Élitros de ángulos humerales rectos, aún más entrantes que en la especie anterior, resultando el cuerpo aún más estrangulado en esa zona y aquéllos en óvalo corto, sólo vez y media más largos que anchos, con estrías de puntos muy marcadas en los ejemplares portugueses, pero menos en uno argelino de Kabylia, cuya puntuación protorácica también es menos marcada. Escudete negro o rufescente, pequeño, corto y transverso... .. **T. cyanescens** Bed.  
Long. 2,5 a 3,5 mm. Loc. S. Martinho d'Anta (Correa de Barros).
- 16 (13). Protórax muy transverso, no muy globoso, de ángulos posteriores abrazando la base de los élitros y fuertemente prolongados hacia atrás, y éstos como los anteriores, poco caídos, visibles mirado el órgano perpendicularmente; puntuación del disco fuerte e impresa; élitros de húmeros rectos no entrantes, de lados paralelos en sus dos primeros tercios y no estrangulados en la zona de la base; vez y media más largos que anchos, con estrías fuertemente punteadas y el escudete corto, rojo y muy transverso (lám. VI, fig. 5).. **T. rudis** Reitt.  
Long. 3 a 3,5 mm. Loc. Tánger (Escalera), Andalucía (Tarnier), dos ejemplares, ex col. P. Arcas, hoy en Museo de Madrid (1).
- 17 (12). Antenas oscuras, recias en el funículo, a veces rojizo, de artejos globulares y apretados. Protórax moderadamente globoso, transverso, de ángulos posteriores nada prolongados hacia atrás, los anteriores caídos; puntuación del disco fuerte e impresa. Élitros de húmeros rectos, a veces redondeados y algo entrantes, paralelos en su primera mitad, luego redondeados, vez y media más largos que anchos, muy fuertemente estriados, con los puntos muy hundidos. Escudete

---

(1) Las localidades dadas por Tarnier, que cazó en Tánger y en Andalucía, son suspectas como dije en mis «Coleópteros de Marruecos.»

negro, grande, triangular, transverso.....

..... **T. melanocephala** Latr. (*T. ruficollis* Steph.)


Long. 2,8 a 5 mm. Loc. Puebla de Don Fadrique, La Granja (Escalera), Madrid (Arias), S. Martinho d'Anta (Correa de Barros), en col. Museo de Madrid.

- 18 (1). Cuerpo unicolor. Cabeza, protórax y élitros, así como las antenas y patas de color chocolate o ladrillo recocho; tercer artejo de las antenas notablemente más largo que aquéllos entre quienes está. Protórax moderadamente globoso y poco transverso, con su mayor anchura en la base y de ángulos posteriores agudos y prolongados hacia atrás sobre los élitros, con puntuación menuda y poco impresa. Élitros tan anchos en su base como la del protórax, de ángulos humerales rectos, paralelos sus lados hasta los dos tercios y luego redondeados, vez y media más largos que anchos; con las estrías de puntos no perceptibles en el disco y apenas indicadas en los lados, los puntos pequeñísimos y poco impresos, y pudiera decirse inestriados los élitros, carácter este sin similar entre las especies paleárticas que conozco. Escudete pequeño, transverso (lám. VI, fig. 6)..... **T. castanea** Peyer.
- Long. 3 a 3,8 mm. Loc. Larache (Escalera), Azrou en el Mediano Atlas.

#### Distribución geográfica de las especies del cuadro anterior.

	Europa.	España.	Marruecos	Argelia.
<i>Triplax aenea</i> Schall. ....	*	*	.....	.....
— <i>russica</i> L. ....	*	*	.....	.....
— <i>Lacordairei</i> Crotch. ....	*	.....	*	*
— <i>Peyerimhoffi</i> Esc. ....	.....	.....	*	.....
— <i>breviscutata</i> Fairm. ....	.....	.....	*	.....
— <i>Bedeli</i> Reitt. ....	.....	.....	*	.....
— <i>cyanescens</i> Bed. ....	.....	*	.....	*
— <i>rudis</i> Reitt. ....	.....	*	*	.....
— <i>melanocephala</i> Latr. ....	*	*	.....	*
— <i>castanea</i> Peyer. ....	.....	.....	*	.....

De las seis especies encontradas en Marruecos hasta hoy, cuatro son exclusivas de este país, que por tanto es más rico en formas que España, como resulta en el cuadro.



S. Martínez, del.

*Triplax* de la Península Ibérica y Marruecos. 1, *T. Lacordairei* Crotch; 2, *T. Peyerimhoffi* Esc.; 3, *T. Bedeli* Reitt.; 4, *T. breviscutata* Fairm.; 5, *T. rudis* Reitt.; 6, *T. castanea* Peyer.