

Deux Pselaphides nouveaux de la Palestine (Col.)

PAR

JAN ROUBAL

Banská Bystrica (Tchécoslovaquie)

Centrophthalmus tenenbaumi n. sp.

Testacé, seulement les yeux noirs, brillant, tête transversale, triangulaire, moins brillant au-devant que chez *C. villosulus* Fairm., leurs fossettes comme chez cette dernière espèce. Les antennes très courtes, leur article 1 deux fois plus long que large, 2 à peine plus long que large, un peu rétréci à la base, tous deux bien forts, 3 aussi long que large, rétréci à la base, 4-7 transversaux, moniliformes, 3-7 plus étroits que tous les autres, les 4 derniers à la massue fortement marquée, 8 aussi large que long, moniliforme, 9 transversal, aussi long que le précédent, 10 fortement transversal, plus long que 9, le dernier très long, presque 2 fois plus long que large, obtus, asymétrique. Le corselet plus court, au-devant sur les côtés un peu moins arrondi que chez *villosulus* Fairm., le dos a la ponctuation presque invisible, la fossette médiane assez grande et profonde. Les élytres beaucoup moins convexes et un peu plus courts que chez *villosulus* Fairm., la strie suturale peu profonde, la strie dorsale bien profonde, dépassant le milieu des élytres, les épaules fortes, la ponctuation comme chez l'espèce comparée. L'abdomen un peu plus long que chez la dernière espèce, avec le 1^{er} tergite plus long. Les pattes comme chez *villosulus* Fairm.

La longueur comme chez cette dernière espèce.

Palestine: Ben Schemen, VI, 1926, reçu par Mr. Sz. Tenenbaum¹, Varsovie.—Coll. mea.

¹ Collègue qui trouva, aussi en Palestine, 1926, les espèces suivantes, décrites par moi-même: *Euplectus Tenenbaumi*, Bull. Soc. Ent. Fr., 1926, 181; *Carpophilus Tenenbaumi*, Entom. Anzeig., VI, 1926, 171; *Xenostromylylus sanctissimus*, Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., XXVII, 1927, 134.

Ctenisomorphus elaniticus ♂.

Ctenisomorphus [Raffray in Rev. d'Ent. ix, 1890, 140, 142; Ann. Soc. Ent. Fr., 1892, 497; 1904, 336; Wytzman: Genera Ins., Psel., 1908, 339.—Junk-Schenkling, Col. Cat., pars 27, 1911, 147.—Winkler, Cat. Col. reg. pal., pars 4, 1925, 469.—=*Ctenistomorphus* Raffr. Raffray, Bull. Soc. Ent. Fr., 1903, 185] *elaniticus* ♀ a été décrit par Raffray, Bull. Soc. Ent. Fr., 1903, 185, d'après un seul ex. femelle et l'auteur y a ajouté: «Malheureusement le mâle est inconnu; il doit avoir les antennes assez fortement sinueuses et probablement un des articles de la massue un peu irrégulier».

C'est du même pays, de la Palestine, que j'ai reçu, grâce à l'amabilité de Mr. Sz. Tenenbaum-Varsovie, un *Ctenisomorphus* pour en faire l'étude; je le considère comme ♂ de *C. elaniticus* Raffr. Cet exemplaire a les antennes grêles, aux articles 1 et 2 aussi longs que larges, tous deux carrés, 3 d'un tiers plus long que large, 4, 5, 6, 8, 9 cylindriques, un peu plus longs que larges, 7 encore plus long, 10 un peu plus long que 7-9, ayant à la base une forte sinuosité d'une longueur égale à un tiers de cet article, 11 un peu plus long que le précédent, tous deux formant une massue bien marquée.

La femelle provient, l. c., de Qala'at et Aqabah, et mon mâle de Ben Schemen.