

Assessing frequency of trauma among elderly attending to Taleghani Hospital in Kermanshah during the first six months of 2008

Jalalvandi F¹, Esmaeilivand M², Safari Faramani R³

Abstract

Introduction and purpose: Trauma is the fifth leading cause of death in patients aged more than 65 years old. In addition, 12% of individuals who suffer from trauma are elderly while rate of elderly mortality among trauma cases has been reported up to 28%. Therefore, this study aimed at assessing frequency of trauma among elderly attending to Taleghani Hospital in Kermanshah.

Materials and Methods: This retrospective study used secondary data from medical record of elderly (more than 60 years) attending to the emergency ward of Taleghani hospital during the first six months of 2008.

Findings: The findings showed that 56.4% of trauma cases were male and 43.6% were female with mean age of 70.6 ± 9.1 years. The main cause of trauma was fall (58.7%), majority of traumas (60.9%) occurred at home and the upper extremity injuries (25.1%) was the most affected area. More than half (59.8%) of trauma cases require hospitalization and further treatment in which 41.9% of them were admitted to the orthopedic ward.

Conclusion: Although, the outcomes of trauma are deteriorated in elderly patients but, its mortality and morbidity can be reduced by continuous monitoring, special treatment and on top of that maintaining a safe environment for elderly patients.

Keyword: Elderly, Trauma, Frequency

Received: 2014/11/10

Accepted: 2015/05/15

1- Faculty member of paramedical school. Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

2- Faculty member of nursing school, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

(Corresponding Author):E-mail: m.esmaeilivand@gmail.com

3- PhD candidate of Epidemiology, Department of Biostatistics & Epidemiology, School of Public Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

بررسی فراوانی انواع ترومما در سالمدان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر

کرمانشاه، شش ماه اول سال ۱۳۸۷

فرشته جلالوندی^۱، مصطفویه اسمعیلی وند^{۲*}، رویا صفری فرامانی^۳

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۲/۲۵

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۳/۸/۱۹

چکیده

مقدمه و هدف: پنجمین علت مرگ در بیماران بالای ۶۵ سال ترومما می باشد و ۲۸٪ افرادی که در اثر ترومما فوت می کنند سالمند هستند در حالیکه تنها ۱۲٪ افراد ترمومایی را سالمدان تشکیل می دهند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی انواع ترومما در سالمدان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه بوده است.

مواد و روش ها: در این مطالعه گذشته نگر، پرونده ۱۷۹ سالمند ۶۰ سال و بالاتر دچار ترومما طی مدت شش ماه اول سال ۱۳۸۷ با مراجعه به دفتر بایگانی اورژانس بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین سن بیماران سالمند دچار ترومما $1 \pm 9/0.6$ سال بوده و ۵۶٪ آنها مرد و سایرین را زنان تشکیل می دادند. سقوط و زمین خوردن با ۵۸٪ بیشترین علت ترومما و همچنین صدمات اندام فوقانی با ۲۵٪ بیشترین ناحیه آسیب دیده بود. ۵۹٪ این افراد نیازمند به بستری چهت اقدامات درمانی بیشتر بودند که ۴۱٪ از آنها در بخش ارتوپدی بستری شده بودند. ۹٪ حوادث در منزل اتفاق افتاده بود.

نتیجه گیری: با وصف اینکه سالمندی سرانجام ترومما را بدتر می کند ولی با پایش مداوم، درمانهای ویژه، و در راس آنها برقراری محیطی امن برای سالمدان می توان از عوارض و مرگ و میر کاست.

کلید واژه ها: سالمدان، ترومما، فراوانی

۱- عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

۲- عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
نویسنده مسؤول). پست الکترونیکی: m_esmaeilivand@yahoo.com

۳- دانشجوی دکترا اپیدمیولوژی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

مقدمه

مطالعات نشان داده است به ازای هر یک سال افزایش سن در افراد بالای ۶۵ سال احتمال مرگ پس از ضربه ۶٪ افزایش خواهد داشت^(۶). علل منجر به ترومما در سالمندان با افراد جوان متفاوت است، چنانچه در سالمندان سقوط از بلندی و افتادن بیشترین عوامل ایجاد کننده صدمه است و در افراد جوان خودت رانندگی بیشتر از سالمندان اتفاق می‌افتد^(۸). زمین خوردن، شایع‌ترین علت مرگ ناشی از ترومما در افراد بالای ۷۵ سال می‌باشد^(۹).

با توجه به افزایش جمعیت سالمندی و خطرات و عوارض ناشی از ترومما و همچنین توجه به هزینه‌های بهداشتی و درمانی متعاقب ترومما و با توجه به اینکه چنین مطالعه‌ای در شهر کرمانشاه که مرکز ترومای غرب کشور محسوب می‌شود، انجام نشده لذا هدف ما در این مطالعه بررسی فراوانی و مکانیسم حوادث ایجاد شده در سالمندان مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه در شش ماه اول سال ۱۳۸۷ به منظور برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از این حوادث، انجام شده است.

مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر به روش توصیفی و مقطعي بر روی ۱۷۹ سالمند ترومایی ۶۰ سال و بالاتر مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه طی مدت شش ماه اول سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. با توجه به تعداد زیاد مراجعه کننده به این مرکز از هر ماه به طور تصادفی ساده سه روز انتخاب و جمع آوری اطلاعات بر اساس داده‌های موجود در بخش بایگانی مرکز مورد مطالعه شامل مشخصات جمعیت شناختی و اطلاعاتی در

در حال حاضر جهان شاهد افزایش سریع جمعیت سالمند می‌باشد، و به سرعت به سمت پیر شدن می‌رود^{(۱)،(۲)،(۳)}. کشور ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ با کاهش جمعیت کمتر از ۱۵ سال به ۲۵/۲٪ از حالت جوانی خارج شده و از طرفی با افزایش جمعیت بالای ۶۵ سال از این پس شاهد روند جمعیتی به نام سالمندی خواهد بود^(۱). پیش‌بینی می‌شود جمعیت سالمند ایرانی در سال ۲۰۵۰، به بیش از ۲۶ میلیون نفر^(۴) (درصد ۲۱/۷) برسد.

ترووما پنجمین علت مرگ در افراد بالای ۶۵ سال می‌باشد. در ترمومای افراد سالمند میزان عوارض و مرگ و میر نسبت به افراد جوان بیشتر است در واقع ۲۸٪ افرادی که در اثر ترومما فوت می‌کنند سالمند هستند در حالیکه تنها ۱۲٪ افراد ترومایی را سالمندان تشکیل می‌دهند^{(۵)،(۶)}. افراد سالمند در سالهای اخیر دارای زندگی فعال و مستقل هستند، بنابراین بیماران سالمند که نیازمند به درمانهای مرتبط با ترومما و صدمات می‌باشند افزایش پیدا خواهد کرد^(۲).

بیماران سالمند نسبت به افراد جوان بیشتر دچار عوارض و مرگ ناشی از ترومما می‌شوند. در واقع ترومما در سالمندان از چالش‌های مهم و خاص است چرا که تغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با سن، بیماریهای زمینه‌ای قبلی، کاهش قدرت بدنی، ناتوانی در ترمیم بافتی، مصرف داروها، تنش های روحی و همچنین مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌تواند عملیات احیا و بهبود را تحت تأثیر قرار دهد^{(۱)،(۷)،(۸)}.


یافته ها زمینه مکانیسم تروما، محل وقوع حادثه، نواحی آسیب دیده، نوع درمان و نوع تروما با استفاده از چک لیست تهیه شده توسط پژوهشگر، صورت گرفت. تجزیه و تحلیل دادها توسط نرم افزار SPSS شماره ۱۶ انجام شد.

در این مطالعه میانگین سن بیماران سالمند دچار تروما 70.6 ± 9.1 سال بود. از میان مصدومین سالمند 56.4% مرد و 43.6% را زنان تشکیل دادند و نسبت جنسی مرد به زن $1/2.9$ بود. بیشترین فراوانی محل ایجاد تروما در شهر و در منزل بیماران اتفاق افتاده بود(جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱: فراوانی ناحیه، محل ایجاد تروما و نحوه انتقال بیماران سالمند دچار تروما

ناحیه	محل ایجاد تروما	نحوه انتقال	فراوانی	درصد	جمع
شهر	شهرستان	توسط خانواده	۱۴۰	۷۸/۲	۱۷۹
شهرستان	روستا	اورژانس	۲۷	۱۵/۱	۱۵/۱
روستا	منزل		۱۲	۶/۷	۶/۷
منزل	خیابان		۱۰۹	۶۰/۹	۱۷۹
خیابان	جاده بین شهری		۶۴	۳۵/۸	
جاده بین شهری	محل کار		۲	۱/۱	
محل کار			۴	۲/۲	
			۱۷۰	۹۵	۹۵
			۹	۵	۱۷۹

از نظر زمان وقوع تروما بیشترین فراوانی بین ساعت ۹ تا ۱۱ بررسی مکانیسم حادثه در سالمندان (نمودار ۱) نشان میدهد که سقوط و زمین خوردن با 58.7% بیشترین علت تروما را به خود اختصاص می دهند و حوادث ترافیکی دومین علت شایع تروما در سالمندان می باشند.




نمودار شماره ۱: فراوانی مکانیسم ترومما

بررسی بیشترین ناحیه آسیب دیده (نمودار ۲) نشان می دهد

صدمات اندام فوقانی با ۲۵/۱٪ به میزان بیشتری در سالمندان

اتفاق افتاده است.



نمودار شماره ۲: فراوانی نواحی آسیب دیده

روانی، بیماریهای مزمن و عوامل محیطی باشد، لذا توجه خاص در این موارد می‌تواند آمار سقوط در بین سالمدان را کاهش دهد(۱۲).

در این مطالعه، اندامهای فوقانی بیشترین محل تروما را به خود اختصاص داد. در مطالعات دیگر سر، لگن و اندامهای تحتانی را بعنوان شایعترین محلهای آسیب ذکر کرده اند(۶) سیستم عصبی، دندنهای مشکلات ناشی از شکستگی، شکستگی مهره‌ها و ترومای شکمی با الگوهای مختلف دچار آسیب گشته اند (۶) ولی آنچه مهم به نظر می‌رسد شکستگی اندامها بدلیل مشکلات استئوپروتیک در سالمدان می‌باشد که منجر به بستره شدن بیماران ترومایی در بخش‌های ارتوپدی می‌گردد بجز مشکلات ارتوپدی، عوارض عصبی که نیازمند مداخله جراحی اعصاب باشند نیز در سالمدان شایع می‌باشد.

در این مطالعه شایعترین محل رویداد تروما در منزل بود که با مطالعه نادر و راکعی (۱۳۸۳) همخوانی دارد (۸). اگرچه در این مطالعه بیش از ۶۰٪ در مطالعه نادر و راکعی تقریباً ۴۰٪ بود. به نظر می‌رسد که شیوع بالای تروما در منزل بیانگر آن است که محیط زندگی سالمدان کاملاً این نیست و مواردی مانند فرشها، نور ناکافی، پله، حمام، دمپایی، سطح ناهموار و وسائل کمکی می‌توانند زمینه ساز بروز تروما در سالمدان گردد. نتایج مطالعه گیانودیس در انگلیس نیز نشان داد ۱۳/۸٪ بیماران دچار صدمات شدید و ۲٪ کل پذیرش‌های تروما را بیماران سالمدان به خود اختصاص می‌دادند(۱۳).

در بررسی نوع درمان صورت گرفته مشخص شد ۵۹/۸٪ این افراد نیازمند به بستره جهت اقدامات درمانی بیشتر بودند. بررسی بخش‌های بستره شده نشان می‌دهد بیشترین بخش پذیرش دهنده به سالمدان ترومایی بخش ارتوپدی با ۴۱/۹٪ می‌باشد. بررسی محل وقوع حادثه نشان می‌دهد که رویداد حادثه در منزل با ۶۰/۹٪ بیشترین درصد را به خود اختصاص می‌دهد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج نشان داد که بیشترین عامل تروما در سالمدان سقوط، بیشترین محل صدمه، اندام فوقانی با مشکلات ارتوپدی و آسیب دیدن در منزل بود. مطالعات بر روی سالمدان نیز نتایج مشابهی را نشان داد، در مطالعه نادر و راکعی (۱۳۸۶)، نیز ۸۵/۴۶٪ نمونه‌ها بدلیل سقوط دچار تروما شده بودند(۸). همچنین مطالعه داس و جوزف سال ۲۰۰۵ نیز شایعترین علت تروما در سالمدان را سقوط عنوان کرده است (۱۰).

مطالعات دیگر نیز شایعترین دلیل تروما را ناشی از سقوط می‌دانند، بطوریکه ۳۰ تا ۴۰ درصد سالمدان در جامعه یکبار تجربه ترومایی ناشی از سقوط و حتی ۵۰٪ در میان سرای سالمدان و ۶۰٪ در میان افرادی که قبلاً سقوط کرده اند، را داشته اند. (۶). صفوی بیات و ذوالریاستین نیز به گونه دیگر با بررسی وضعیت تعادلی سالمدان میزان خطر آنها را بررسی و مشخص نمودند که ۳۲٪ سالمدان در گروه پر خطر برای سقوط می‌باشند (۷) و بین ۲۰ تا ۶۰ درصد سالمدان در سال، حداقل یک بار سقوط می‌کنند(۱۱). اگرچه آمار سقوط افراد سالمند در مطالعات متفاوت می‌باشد ولی در همه مطالعات عدد بالایی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد را نشان می‌دهد که این درصد زیاد می‌تواند ناشی از مصرف داروهای خاص، وضعیت ذهنی و

کاست. همچنین فهم فیزیولوژی سالمندی، وجود بیماری‌های حاد و مزمن همراه با ترومما، و فهم الگوی یگانه ترومما در سالمندان کمک کننده است.

تعداد افراد سالمند نیازمند درمان ترومما رو به افزایش دارد، و افزایش سن افراد ترومایی را در معرض خطر بیشتر قرار می‌دهد. با وصف اینکه سالمندی سرانجام ترومما را بدتر می‌کند ولی با پایش مداوم، درمانهای ویژه و در راس آنها برقراری محیطی امن برای سالمندان می‌توان از عوارض و مرگ و میر

■ References

1. Ahmadi V, Beheshti S. Examine the demographic characteristics and welfare of the elderly in Iran. Quarterly population No: 61-62.2007:19-38. [Persian]
2. Gregory P. Victorino, MD; Terry J. Chong, MD; Jay D. Pal, MD, PhD. Trauma in the Elderly Patient, (REPRINTED) ARCH SURG.VOL 138, 2003:1093-1098.
3. Safizadeh H, Habibi H, Zahmatkesh R, Samari. Epidemiological events in elderly Kerman province during the years 1385-88. (Journal of age), the eighth year, No. 28, spring 1392. [Persian]
4. Yavari HR, Akbari Kamrani AA, Bakhshi EA, Saboor M, Sahaf R. Relationship between poly-pharmacy and social demographic factors in the elderly group in Charitable home Kahrizak in 1389. J elderly, 2011; 8(31):7-10.[Persian]
5. Behdad A, Abedi B, Hoseinpour M. As a predictor (Base deficit) value of base deficit Mortality in elderly trauma. University of medical sciences, Vol. 7, No. 4, winter 1384. [Persian]
6. Miriam T. Aschkenasy, MD, MPH, Todd C. Rothenhaus, MD, FACEP. Trauma and fall in the Elderly. Emerg Med Clin N Am. Vol 24, 2006: 413–432.
7. Safavi Z, Zolryasatain F. Determine the risk factors of falls in the elderly living in nursing homes Tehran. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. No 44, 2007:66-70. [Persian]
8. Nader F, Rakei M. Accidents and incidents in the elderly admitted to hospitals in Shiraz University_winter1383. Pars Journal of Medical Sciences, Vol 4, No 4, 2007: 41-44.[Persian]
9. Tavakoli H, Ahmadi Amoli H, Yaghobi A, Yazdankhah A, Ghalkhani F, Patrishia HK. Morbidity and mortality of trauma in the elderly. Journal of Aging, 2010; 4(11):31.[Persian]

10. Das CP, Joseph S. Falls in elderly. *J Indian Med Assoc.* 2005; 103(3):136,136-140.
11. Iranfar M, Aini E, Soori H. Epidemiology of falls in elderly care centers. *Journal of Aging*, 2013; 8(29): 30-37.[Persian]
12. Nordell E, Jarnlo GB, Jetsen C, et al. Accidental falls and related fractures in 65–74 year olds: a retrospective study of 332 patients. *Acta Orthop Scand* 2000; 71:175–9.
13. Giannoudis PV, Harwood PJ, Court-Brown C, Pape HC. Severe and multiple trauma in older patients; incidence and mortality. *Injury*. 2009 Apr; 40(4):362-7.