

## 2.

**Zur Flora des Fürstenthums Osnabrück.**

A. Die im Fürstenthume Osnabrück vorkommenden **Orchideen** Juss.,  
 verzeichnet vom  
 Reallehrer **Buschbaum.**

1. *Orchis Morio*. L. Auf dem Schölerberge, dem Brökerberge und Schinkel; an dem Wege links von der Wissinger Haltestelle nach Achelriede; hinter Blumenhalle.
2. *Orchis mascula*. L. Auf dem Schölerberge massenhaft; auf dem Harderberge und der Züchtlingsburg.
3. *Orchis militaris*. L. Vor Lengerich an beiden Seiten der Chaussee.
4. *Orchis latifolia*. L. Auf allen Wiesen; auf der Wüste.
5. *Orchis incarnata*. L. Auf dem Ruwenbroke; auf der Wüste; auf einer Wiese zwischen Blumenhalle und dem Sutthauser Holze sehr viel; auf Wiesen zwischen Hasbergen und Lengerich.
6. *Orchis maculata*. Auf feuchten Wiesen, in Gebüsch; auf der Wüste, auf dem Ruwenbroke.
7. *Gymnadenia conopsea*. R. Br. Schleddehausen; am Osterberge bei Oesede; an der Wittekindsburg; in der Wiese links vor dem Fusswege nach dem Schützenhofe; am Wege von Wissingen nach Achelriede; auf einer Wiese zwischen Blumenhalle und dem Sutthauser Holze bei *Orchis incarnata*; auf dem Ruwenbroke sehr häufig; auf einer Wiese südlich am Berge von Lengerich.
8. *Platanthera bifolia*. Rich. Auf dem Schölerberge, Brökerberge, Harderberge und Schinkel; an der Wittekindsburg; im Ruwenbroke sehr viel.

9. *Platanthera chlorantha*. Custer. Auf dem Schölerberge, Brökerberge und in der Dodesheide.
  10. *Ophrys muscifera*. Huds. Achelrieder Berg an der Schlucht von Bissendorf nach der Kirche; Schleddehausen; am Hüggel und bei Lengerich.
  11. *Ophrys apifera*. Huds. Lengerich bei der Irrenanstalt; Schleddehausen bei *Gymnadenia conopsea*; Bissendorf.
  12. *Cephalanthera ensifolia*. Rich. Ohrbeck am Hüggel; Hasbergen; Lengerich.
  13. *Cephalanthera pallens*. Rich. Auf dem Harderberge, Brökerberge und Schölerberge.
  14. *Cephalanthera rubra*. Rich. Soll bei Lengerich vorkommen.
  15. *Spiranthes autumnalis*. Rich. Auf einer Moorwiese zwischen Eistrup und Achelriede.
  16. *Epipactis palustris*. Crntz. Auf dem Ruwenbroke sehr viel; Wiese am Wege von Wissingen nach Achelriede.
  17. *Listera ovata*. R. Br. Häufig auf dem Schölerberge; auf der Züchtlingsburg, Honenburg; auf dem Harderberge u. s. w.
  18. *Neottia nidus avis*. Rich. In dem Holze der Honenburg; auf dem Brökerberge, dem Schölerberge; im Mordsiek; Holte.
  19. *Malaxis Loeselii*. Sw. Auf dem Ruwenbroke.
  20. *Cypripedium Calceolus*. L. Am Nordabhang des Eistruper Berges; auf dem Schölerberge in wenigen Exemplaren, wenn nicht ganz eingegangen.
  21. *Aristolochia clematitis*. L. Früher auf dem Gertrutenberge, vielleicht angepflanzt, jetzt nur in einzelnen Gärten cultivirt.
-