

## اثرات بیهوشی با شوک الکتریکی و دی اکسید کربن بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی در تاسماهی شیپ (*Acipenser nudiventris*)

جواد باآبرو<sup>۱\*</sup>، حسین خارا<sup>۱\*</sup>، ایوب یوسفی جورده‌ی<sup>۲</sup>

۱. گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
۲. بخش فیزیولوژی و بیوشیمی، مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (Areeo)، رشت، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۶/۳

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱/۸

### چکیده

در این مطالعه زمان‌های القایی، بازگشت از بیهوشی (ریکاوری) و پاسخ‌های فیزیولوژی در تاسماهی شیپ بررسی شد. تاسماهی شیپ با استفاده از گاز دی‌اکسیدکربن (mmhg)، پودر گل میخک (mg/L) و ولتاژ مناسب شوک الکتریکی بیهوش شد. کوتاهترین و طولانی‌ترین زمان القاء با میزان ۰/۱۵ دقیقه و ۰/۲۵ دقیقه به ترتیب مربوط به شوک الکتریکی و پودر گل میخک بود؛ در مقابل، کوتاهترین و طولانی‌ترین زمان بازگشت از بیهوشی (ریکاوری) با میزان ۳/۲۳ دقیقه و ۰/۲۰ دقیقه به ترتیب مربوط به شوک الکتریکی و گاز CO<sub>2</sub> بود. سطح کورتیزول و گلوکز در ۱ و ۶ ساعت بعد از بیهوشی افزایش یافته‌است (P<0.05). تغییرات کمی در اسمولالیته پلاسمای میان تیمارهای بیهوشی مشاهده شد. نتایج نشان داد که شوک الکتریکی روش مؤثرتری برای مدت زمان القاء سریع است؛ اگرچه تمام روش‌های بیهوشی بی خطر در نظر گرفته شده‌اند.

**واژه‌ای کلیدی:** بیهوشی، *Acipenser nudiventris*، استرس، بیوشیمیابی

شیمیابی می‌تواند دارای مزایای بسیاری باشد از جمله این مزایا می‌توان به عدم تولید مواد آلیننده حاصل از مواد شیمیایی بیهوش کننده، کاربرد آسان، کاهش هزینه‌ها و دوره القا و بازگشت بسیار کوتاه اشاره-کرد (Bowzer *et al.*, 2012 Hudsone *et al.*, 2011). ماهیان خاویاری به دلیل کیفیت بالای گوشت و ارزش خاویار، جزو گرانترین و با ارزش‌ترین ماهیان محسوب می‌شوند (Hurvitz *et al.*, 2007). با توجه به اهمیت و ارزش ذکر شده این ماهیان، باید طی بررسی های مختلفی که روی آنها انجام می‌شود، برای حفظ آنها و کاهش آسیب‌های ناشی از انواع عملیات، نهایت دقیقت را داشت؛ از این‌رو، استفاده مناسب از داروهای بیهوش، ضروری و مهم است. با این وجود، نوع ماده پارامترهای خونی به خصوص شاخص‌های استرس و فیزیولوژی ماهی اثرگذار باشد (Velisek *et al.*, 2011). به‌طوری که قرار گرفتن در معرض طولانی مدت و یا غلظت نامناسب ماده بیهوشی نیز ممکن است سبب افزایش استرس شود. بنابراین، به‌دست آوردن غلظت مناسب مواد بیهوش کننده برای به حداقل رساندن استرس بسیار ضروری است (Feng *et al.*, 2011).

اگرچه مطالعات مختلفی بر بیهوشی تاسماهیان انجام شده‌است، اما تاکنون در ایران هیچ بررسی در مورد اثرات بیهوش کننده‌ی به وسیله شوک الکتریکی در تاسماهیان انجام نشده است. هدف از این مطالعه، تعیین بهترین روش برای بیهوشی بوده است که برای به دست آوردن بهترین روش، زمان القا و بازگشت به شرایط عادی و همچنین تعیین سطوح شاخص‌های هورمونی و بیوشیمیایی از قبیل کورتیزول، گلوکز و تعیین اسمولاریته بوده است.

## ۲. مواد و روش‌ها

این مطالعه در سال ۱۳۹۳ در مرکز بین‌المللی ماهیان خاویاری گیلان انجام شد. تاسماهیان شیپ

**۱. مقدمه**

شرایط اسارت و روند دستکاری ماهی، اغلب سبب افزایش پاسخ‌های استرسی فیزیولوژیک می‌شود (and Ross, 2008). از اثرات منفی استرس می‌توان به کاهش ایمنی بدن، استعداد ابتلا به بیماری و کاهش کیفیت تخمک و اسپرم اشاره کرد (Wagner *et al.*, 2002). از این‌رو، جهت کاهش استرس و آسیب‌های فیزیولوژیک ناشی از تراکم، اسارت، دستکاری و رها سازی، امروزه بیهوشی به عنوان ابزاری ارزشمند در آبزی پروری، صید ماهی و مدیریت شیلاتی به کار می‌رود (Palic *et al.*, 2006). مواد فاکتورهای مختلفی برای ارزیابی یک ماده بیهوشی مطلوب در آبزی پروری و تحقیقات مربوطه بیان شده است که از آن جمله می‌توان به شل شدن مناسب عضلانی، عدم تحریک کنندگی، کاربرد و دسترسی آسان، حاشیه ایمنی وسیع و قیمت مناسب اشاره کرد (Pirhonen *et al.*, 2003).

پودر گل میخک (*Caryophyllium aromaticus*) ماده‌ای است که از طبیعت بدست می‌آید و مزایای استفاده از آن علاوه بر قیمت ارزان، این است که اثرات زیان‌باری بر کارکنان نخواهد داشت. گاز  $\text{CO}_2$  یک گاز بی‌رنگ، بی‌بو و غیرقابل احتراق است؛ در این روش، زمان بیهوشی و بازگشت، نسبتاً طولانی است (Ross, 2008 and Ross, 2008). ویژگی بیهوش کننده‌ی این گاز، خوبی به ثبت رسیده است و سال‌هاست این روش به عنوان یک بیهوش کننده برای تمام شاخه‌های جانوری استفاده می‌شود. بیهوشی به وسیله گاز  $\text{CO}_2$ ، روشی مؤثر برای بیهوش کردن ماهیان است (Mcfarl and Klontz, 1969؛ ولی تا به امروز تنها کاربرد آن، برای حمل و نقل و جابجایی است (Leitritz and Lemis, 1980). استفاده از الکتریسیته یکی از راههای مورد استفاده برای بیهوش کردن ماهیان است (Trushenski *et al.*, 2012). استفاده از روش شوک الکتریکی برای بیهوش کردن، در مقایسه با مواد

در ۳ نوبت و در زمان‌های ۱، ۶ و ۲۴ ساعت پس از بیهودشی صورت پذیرفت. ۴۰ قطعه بچه‌ماهی شیپ از مخازن فایبرگلاس گرفته شدند و به صورت تصادفی به ۴ گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. گروه‌های آزمایشی شامل سه گروه بیهودش شده با روش‌های پودر گل میخک، شوک الکتریکی و گاز  $\text{CO}_2$  قرار گرفته در معرض استرس دستکاری و یک گروه شاهد (بدون قرار گرفتن در معرض ماده بیهودشی و استرس دستکاری) بودند. خون‌گیری با استفاده از سرنگ ۲ میلی‌لیتری هپارینه از سیاهرگ دمی ماهیان انجام شد؛ سپس ماهیان خونگیری شده، به تانک‌های فایبرگلاس بازگردانده شدند. تمام ماهیان هر تکرار به مخازن محتوی ۲۰ لیتر آب که با استفاده از سنگ هوا هواده می‌شدند، منتقل شدند. بعد از ۱، ۶ و ۲۴ ساعت، خون‌گیری از ماهیان انجام شد. نمونه‌های خونی در نظر گرفته شده برای بررسی‌های بیوشیمیابی با سرعت ۳۰۰۰ rpm برای ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ شدند. پلاسمای پس از جداسازی، در دمای  $20^{\circ}\text{C}$ - نگهداری شد. پس از آن عوامل بیوشیمیابی از جمله اسمولاریته توسط دستگاه Vapro 5520 osmometer کورتیزول پلاسما بوسیله روش رادیوایمونوآسی بر اساس واکنش رقابتی با استفاده از یک کیت‌های تجاری (شرکت ایمنوتک، مارسی، فرانسه) اندازه‌گیری شد و غلظت  $\text{Redding et al., 1984}$ ، سطح گلوکز پلاسما به روش Bayunova *et al.*, (GOD-PAP) تعیین شد ( ۲۰۰۲ ) با استفاده از یک کیت‌های تجاری (پارس Azmoun کیت تشخیص، تهران، ایران).

برای بررسی آماری داده‌ها، ارزیابی نرمال بودن آن‌ها با استفاده از آزمون Shapiro-Wilks و بررسی همگنی واریانس‌ها با استفاده از آزمون Levene انجام شد. سپس جهت تعیین اثر غلظت‌های مختلف بر فاکتورهای خونی از آنالیز واریانس یک‌طرفه (One-WayANOVA) استفاده شد. از آنالیز واریانس دو طرفه (Two-Way) استفاده شد. از آنالیز واریانس دو طرفه

مورد مطالعه در این مرکز تکثیر و رشد یافته بودند. این ماهیان دارای طیف وزنی ۶۰-۱۰۰ گرم بودند.

در ابتدا ماهیان مورد مطالعه به مخازن فایبرگلاس که دارای عمق ۵/۰ متر و قطر ۲ متر بودند، انتقال داده شدند، آب این مخازن به وسیله پمپ هوا، هواده می‌شد. ماهیان برای سازگاری با محیط همچنین کاهش استرس به مدت ۲ هفته در این مخازن نگهداری و تغذیه شدند؛ میانگین درجه حرارت آب در حدود  $25/5 \pm 0/1$  درجه سانتی‌گراد بوده است. همچنین ۲۴ ساعت قبل از شروع آزمایش و خون‌گیری، تغذیه ماهیان قطع گردید. برای تعیین زمان القاء و ابقاء، ابتدا ۴۰ عدد تاسماهی شیپ در ۴ گروه ۱۰ تایی مورد مطالعه قرار- پرفتند. در ابتدا و چند دقیقه قبل از شروع آزمایش ۰/۵ گرم پودر گل میخک (تهیه شده از فروشگاه داروهای گیاهی) را در ۱ لیتر آب حل شد. برای آزمایش تاسماهیان با ۰/۵ mg/L (bar) پودرگل میخک،  $0/3$   $\text{CO}_2$  و ۱۳۰ ولت شوک الکتریکی بیهودش شدند.

ماهیان به در مخزنی که دارای ۲۰ لیتر آب شیرین که دارای هواده بود، منتقل شدند با روش‌های مورد نظر بیهودش شدند. زمان القای بیهودشی برای ماهیان مرحله ۴ در نظر گرفته شده که این مرحله با از دستدادن کامل تعادل بدن و حرکت نامنظم سرپوش آبششی همراه پس از بیهودشی کامل که به وسیله هر روش صورت گرفت، ماهیان بلاfacسله، به طور جداگانه برای تعیین زمان بازگشت در مخازن فایبرگلاس که به ۲۰ لیتر آب چاه پر شده و هواده شده بود، منتقل شدند و تحت نظر قرار گرفتند. برای زمان بازگشت مرحله ۴ که توسط (Summerfelt and Smith , 1990) تعریف شده بود، در نظر گرفته شد که در این حالت ماهی به حالت تعادل طبیعی رسیده به محرك‌های خارجی و لمسی پاسخ می‌دهد.

به منظور تعیین غلظت کورتیزول، گلوکز و اسمولاریته در پاسخ به بیهودشی، نمونه‌برداری از ماهیان

بالاترین میزان غلظت کورتیزول در ۶ ساعت بعد از بیهودشی و در تیمار شوک الکتریکی مشاهده شد ( $P<0.05$ ). در تمام تیمارها تغییر قابل توجهی در سطح گلوکز مشاهده شد ( $P<0.05$ ). بالاترین سطح گلوکز در ۱ ساعت اول بعد از بیهودشی بوده است و پس از آن این روند کاهش یافت. غلظت گلوکز پلاسمما تفاوت معنا داری را در بین تمامی تیمارها و زمان‌ها نشان داد ( $P<0.05$ ).

ماهیان بیهودش شده به وسیله پودر گل میخک و گاز  $\text{CO}_2$  بالاترین میزان اسمولاریته را داشته؛ بعد از آن این روند کاهش یافت ( $P<0.05$ ). همچنین غلظت اسمولاریته تفاوت معنی‌داری بین کلیه تیمارها تنها در زمان ۱ نشان داد ( $P<0.05$ ).

جدول ۱: زمان القاء و بازگشت تاسماهیان شبیه بیهودش شده با

روش‌های مختلف	
روش	بازگشت (دقیقه)
شوک الکتریکی	$0.2 \pm 0.1$
پودر گل میخک	$4/3 \pm 0.4$
$\text{CO}_2$	$1/5 \pm 0.1$
القاء (دقیقه)	$3/8 \pm 0.3$
	$2/5 \pm 0.1$
	$2/3 \pm 0.1$

#### ۴. بحث و نتیجه‌گیری

نتایج نشان داد که شوک الکتریکی، گاز  $\text{CO}_2$  و پودر گل میخک همگی در بیهودشی تاسماهیان شبیه مؤثرند و می‌توان آنها را به عنوان مواد بیهودش کننده خوب معرفی کرد. بیهودشی ایده‌آل باید القاء ۳ دقیقه‌ای و بازگشت کمتر از ۵ دقیقه داشته باشد. در این مطالعه شوک الکتریکی با القاء سریع و بازگشت طولانی از دیگر روش‌ها مؤثرتر بوده است.


ANOVA جهت تعیین تفاوت‌های متغیرهای خونی بین روش‌های مختلف بیهودشی در طول زمان استفاده شد. اختلاف بین میانگین‌ها به وسیله آزمون چند دامنه‌ای Duncan بررسی شد. در این بررسی، اختلاف در سطح معنی‌دار ( $P<0.05$ ) در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم افزار SPSS (version 18) و Excel 2010 انجام گرفته است.

#### ۳. نتایج


تمام روش‌های مورد استفاده در این آزمایش برای القای بیهودشی در بچه‌ماهی شبیه مؤثر و بی خطر بودند، میانگین زمان القاء و بازگشت در روش‌های مختلف در جدول ۱ نشان داده شده است. در این جدول اختلاف معنی‌داری بین هر ۲ حالت القاء و بازگشت در ۳ روش مشاهده می‌شود ( $P<0.05$ ).

کوتاه‌ترین زمان القاء و همچنین طولانی‌ترین زمان بازگشت، متعلق به تیمار شوک الکتریکی است، در مقابل ماهیان بیهودش شده با پودر گل میخک، طولانی‌ترین زمان بازگشت و کوتاه‌ترین زمان بازگشت را داشتند.

غلظت کورتیزول پلاسمما، تفاوت معنی‌داری بین کلیه تیمارها در زمان‌های ۱، ۶ و ۲۴ ساعت بعد از شوک‌دهی را نشان داد ( $P<0.05$ )، که بالاترین سطح کورتیزول مربوط به تیمار گاز  $\text{CO}_2$  بوده است و سپس روند کاهشی معنی‌داری مشاهده شده است. تغییر قابل توجهی در سطح کورتیزول در شروع مطالعه مشاهده نشد ( $P>0.05$ ). ماهی قرار گرفته در معرض پودر گل میخک، تفاوت معنی‌داری در غلظت کورتیزول پلاسمما نشان نداد ( $P>0.05$ ).



شکل ۲: روند تغییرات گلوکزدر روش‌های مختلف بیهوشی طی زمان‌های متفاوت نمونه برداری را نشان می‌دهد. حروف بزرگ بیانگر اختلاف معنی دار در یک روش بیهوشی بین زمان‌های مختلف و حروف کوچک بیانگر اختلاف معنی دار بین میانگین‌کورتیزول در روش‌های مختلف بیهوشی در هر یک از زمان‌های بررسی است ( $P < 0.05$ ).



شکل ۳: روند تغییرات اسمولاریته در روش‌های مختلف بیهوشی طی زمان‌های متفاوت نمونه برداری را نشان می‌دهد. حروف بزرگ بیانگر اختلاف معنی دار در یک روش بیهوشی بین زمان‌های مختلف و حروف کوچک بیانگر اختلاف معنی دار بین میانگین اسمولاریته در روش‌های مختلف بیهوشی در هر یک از زمان‌های بررسی می‌باشد ( $P < 0.05$ ).

حرارت آب نیز در مدت زمان القاء ماهی تأثیرگذار است (Trushenski *et al.*, 2012). مکانیسم عمل هر یک از روش‌های بیهوشی به مقایسه القاء و بازگشت در طول آزمایش بستگی دارد. به طور کلی برای کاهش شدت عوامل استرس‌زا بیهوشی مورد استفاده قرار می‌گیرد (Wagner *et al.*, 2003; Small 2004; Palic *et al.*, 2006).

بیهوشی در ماهی به وسیله شوک الکتریکی هرچه ولتاژ بالاتر رود و زمان ولتاژ بیشتر شود، زمان بازگشت نیز طولانی‌تر می‌شود. نتایج مشابه نشان داد که در بیهوشی ماهی با شوک الکتریکی ماهی را به مدت ۰/۱۰-۰/۲ دقیقه در معرض شوک قرار دادند و ماهی را بیهوش کردند (Trushenski *et al.*, 2012; Bowzer *et al.*, 2012). همچنانی عوامل سایز ماهی و درجه

بیاندازد. بنابراین، بایستی در استفاده از نوع ماده بیهودگی، غلظت مورد استفاده و مدت زمان قرارگیری نهایت دقیقت را داشت. در بررسی حاضر، شوک الکتریکی کارایی بهتری در بیهودگی کامل و برگشت از آن نسبت به سایر روش‌ها داشت. از طرفی تغییر کمی در میزان ترشح کورتیزول و گلوکز در ماهیان بیهودگی شده با شوک الکتریکی مشاهده شد. بنابراین، با توجه به دسترسی آسان، اقتصادی بودن، کارایی بالا و نداشتن اثرات مخرب بر ماهی استفاده از آن در ماهی شیپ پیشنهاد می‌شود.

#### منابع

Bayanova L., Barannikova I. and Semenkova T. 2002. Sturgeon stress reaction in aquaculture. Journal of Applied Ichthyology, 18:397-404.

Bowzer J. C., Trushenski J. T., Gause B. R., Bowker J. D. 2012. Efficacy and physiological responses of Grass Carp to different sedation techniques: II. Effect of pulsed DC electricity voltage and exposure time on sedation and blood chemistry. NAJA, 74: 567- 574.

Feng G., Zhuang P., Zhang L., Kynard B., Shi X., Liu J. and Huang X. 2011. Effect of anesthetics MS-222 and clove oil on blood biochemical parameters of juvenile Siberian sturgeon (*Acipenser baerii*). JAI, 27:595-599.

Hudson, J. M., Johnson, J. R., Kynard, B. 2011. A portable electronarcosis system for anesthetizing salmonids and other Fish. North American JFM, 31:335- 339.

Hurvitz A., Jackson K., Degani G. and Levavi-Sivan B. 2007. Use of endoscopy for gender and ovarian stage determinations in Russian sturgeon (*Acipenser gueldenstaedtii*) grown in aquaculture. Aquaculture, 270:158-166.

Iwama G. K. ,McGeer J. C. and Pawluk M. P. , 1989. The effects of five fish anaesthetics on acid-base balance, hematocrit, blood gases, cortisol, and adrenaline in rainbow trout. Canadian Journal of Zoology, 67:2065-2073.

بالا رفتن غلظت کورتیزول پلاسمای با عنوان شاخص استرس در ماهیان استفاده می‌شود (Barton, 2002)، برخی از روش‌های بیهودگی می‌تواند باعث افزایش کورتیزول پلاسمای شود که این نشان‌دهنده استرس است (Iwama *et al.*, 1989; Small, 2004). در مطالعه حاضر میزان کورتیزول در ۱ ساعت اول در تیمار گاز  $\text{CO}_2$  افزایش یافت. در حالی که در ماهی قرار گرفته در مجاورت پودر گل میخک، میزان کورتیزول افزایش قابل توجهی نشان نداد. همچنین افزایش کورتیزول در تیمار شوک الکتریکی در ۶ ساعت بعد از بیهودگی اتفاق افتاد. با توجه به نتایج پودر گل میخک نسبت به سایر تیمارها کاهش بالقوه‌ای در میزان استرس داشت. در برخی از گونه‌ها از جمله گربه ماهی کانال، آزاد ماهی اطلس و ماهی قنات این حالت گزارش شده است (Palic *et al.*, 2006).

گلوکز نیز بر اثر استرس بالا می‌رود که این پارامتر نیز یکی از روش‌های تعیین میزان استرس است (Barton, 2002). در مطالعات گذشته افزایش سطح گلوکز خون پس از قرار گرفتن در معرض گاز  $\text{CO}_2$ ، پودر گل میخک و شوک الکتریکی افزایش پیدا کرده بود (Trushenski *et al.*, 2012). همچنین افزایش سریع قند خون که توسط آزادسازی کاتیکول آمین‌ها بر اثر بیهودگی ماهی در پلاسمای اتفاق می‌افتد، در پاسخ به این اتفاق هیپوکسی ناشی از قطع تنفس روی می‌دهد که این عامل باعث افزایش استرس می‌گردد. به نظر می‌رسد میزان اسمولاریته پلاسمای تا حدودی با بیهودگی و مدت زمان رابطه معکوس دارد، عدم تغییرات قابل توجه در پلاسمای ممکن است نشان‌دهنده پاسخ جزئی به بیهودگی و استرس باشد.

با توجه به نتایج، میزان کورتیزول آزاد شده در تیمار شوک الکتریکی و پودر گل میخک نسبت به تیمار گاز  $\text{CO}_2$  کمتر بود. مواد بیهودگی می‌توانند اثرات جانبی ناخواسته‌ای را ایجاد کنند که سلامت ماهی را به خطر

- Leitritz, E. and Lewis, R. C., Trout and salmon culture (hatchery methods), Californian Fisheries Bulletin, No. 164, University of California, 1980, 197 p.
- McFarland W. N. and Klontz G. W. 1969. Anaesthesia in fishes, 1535–1540. *Fed. Proc.*, 28
- Palic D., Herolt D. M., Andreasen C. B., Menzel B. W. and Roth J. A. 2006. Anesthetic efficacy of tricainemethanesulfonate, metomidate and eugenol: effects on plasma cortisol concentration and neutrophil function in fathead minnows (*Pimephalespromelas* Rafinesque, 1820). *Aquaculture*, 254:675-685.
- Pirhonen J. and Schreck C. B. 2003. Effects of anaesthesia with MS-222, clove oil and CO<sub>2</sub> on feed intake and plasma cortisol in steelhead trout (*Oncorhynchusmykiss*). *Aquaculture*, 220:507-514.
- Redding J. M., Schreck C. B., Birks E. K. and Ewing R. D. 1984. Cortisol and its effect on plasma thyroid hormone and electrolyte concentrations in freshwater and during seawater acclimation in yearling Coho salmon, *Oncorhynchuskisutch*. General and Comparative Endocrinology, 56:146-155.
- Ross G. L. and Ross B. 2008. Anaesthetic and Sedative Techniques for Aquatic Animals, 3rd ed. Blackwell Science, Oxford, UK. 222P.
- Small C. B. 2004. Anesthetic efficacy of metomidate and comparison of plasma cortisol responses to tricainemethanesulphonate, quinaldine and clove oil anesthetized channel catfish) (*Ictaluruspunctatus*). *Aquaculture*, 218:177-185.
- Trushenski J. T. and Bowker, J. D. 2012a. Effect of voltage and exposure time on fish response to electrosedation. *JFWM*, 3(2): 276- 287.
- Velisek J., Stara A., Li Z. H., Silovska S. and Turek J. 2011. Comparison of effects of four anaesthetics on blood chemical profiles and oxidative stress biomarkers in rainbow trout. *Aquaculture*, 310:369-375.
- Wagner E., Arndt R. and Hilton B. 2002. Physiological stress responses, egg survival and sperm motility for rainbow trout broodstock anesthetized with clove oil, tricainemethanesulfonate or carbon dioxide. *Aquaculture*, 211:353-366 .

## Impact of anesthesia on some of physiological parameters in *Acipenser nudiventris*

Javad Ba Abero<sup>1</sup>, Hossein Khara<sup>2\*</sup>, Ayoub Yousefi Jourdehi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fisheries Department, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

<sup>2</sup>Department of Physiology, International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran

### Abstract

Impact of anesthesia with electric shock on some of physiological parameters was studied in *Acipenser nudiventris*

In this study, we investigated the induction and recovery times and physiological response of *Acipenser nudiventris*. We anesthetized them by CO<sub>2</sub> (mmhg), clove powder (mg/L), and electric shock (V). Shortest and longest induction time were 0.15 min and 4.25 min when electric shock and clove powder were used. On the other hand, shortest and longest time of recovery time were 3.23 min and 2.20 min respectively when electric shock and CO<sub>2</sub> gas were used. Cortisol and glucose levels increased 1 and 6 hours after anesthesia. Changes in plasma osmolality were less among the anesthesia treatments. Results demonstrated that electric shock was a more effective method for quick induction time, although all anesthetic methods were found to be safe.

**Keywords:** Anesthesia, *Acipenser nudiventris*, Stress, Biochemical indices

**Table 1:** Induction and recovery times in sturgeon anesthetized by different methods.

**Figure 1:** The changes in cortisol in sturgeon anesthetized by different methods during different times of sampling. Big letters indicated significant differences in anesthetized fish between different times. Small letters indicated significant differences between the mean cortisol changes in fish anesthetized in different ways ( $p<0.05$ ).

**Figure 2:** The changes in glucose in sturgeon anesthetized by different methods during different times of sampling. Big letters indicated significant difference in fish anesthetized between different times. Small letters indicated significant differences between the mean glucose changes in fish anesthetized in different ways ( $p<0.05$ ).

**Figure 3:** The changes in osmolality in sturgeon anesthetized by different methods during different times of sampling. Big letters indicated significant difference in fish anesthetized between different times. Small letters indicated significant difference between the mean osmolarity changes in fish anesthetized in different ways ( $p<0.05$ ).

\*Corresponding author, E-mail: h.khara1974@yahoo.com