

## **INCIDÊNCIA DE DIARREIA EM LEITÕES DE CRECHE COM O USO DE BACSOL 200PPM COMO SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR**

**NOGUEIRA, Camila<sup>1</sup>; CAMPOS, Aline Gomes de<sup>2</sup>**

Este trabalho avaliou o índice de diarreia em leitões na creche do 21º ao 51º dia. Foram acompanhados dois grupos de 20 animais, cruzamento de Landrace x Large White, de ambos os sexos, sendo um grupo tratado com ração Suicon 20 + 0,2 kg do pro biótico Bacsol em 1000 kg de ração e um grupo controle somente com ração Suicon 20, ambos com água *ad libitum*, na granja da Faculdade Doutor Francisco Maeda em Ituverava-SP. Na primeira estratificação foram selecionados 15 animais de uma ninhada para grupo tratado e 15 animais de outra ninhada para grupo controle. Na segunda estratificação foram utilizados 10 leitões de uma mesma ninhada sendo 5 deles para grupo tratado e 5 para grupo controle, as fezes foram observadas a cada 2 dias sendo classificadas em líquida, pastosa e normal. Ao final do experimento os resultados mostraram que o BACSOL não teve um resultado satisfatório.

---

<sup>1</sup> Graduanda em Medicina Veterinária-Faculdade Doutor Francisco Maeda/FAFRAM – Fundação Educacional de Ituverava/SP

<sup>2</sup> Professor(a) Doutor(a) – Curso de Medicina Veterinária- Faculdade Doutor Francisco Maeda/FAFRAM-Fundação Educacional de Ituverava

---