

## NIDIFICACIÓN DEL TARRO BLANCO (*Tadorna tadorna*) EN LAS SALINAS DE EIVISSA EN 1994

### NIDIFICACIÓ D'ÀNNERA BLANCA (*Tadorna tadorna*) A SES SALINES D'EIVISSA EN 1994

Juan Carlos PALERM\*  
Oliver MARTÍNEZ\*

**Summary.** - *Nesting of the Shelduck* (*Tadorna tadorna*) in *Ses Salines* (*The salt flats*) of *Eivissa* in 1994. The nesting of the shelduck (*Tadorna tadorna*) in *Ses Salines* des Cavallet has been confirmed, this being the fifth time their reproduction has been observed there in the last ten years. In view of this, we propose a change of status for the species in *Eivissa*, from an exceptional summer visitor to rare.

\* Grup d'Estudis de sa Naturalesa de Ses Pitiusès. Vía Púnica 50 baixos. 07800 Eivissa

L'ànnera blanca (*Tadorna tadorna*) és una anàtida paleàrtica de distribució preferentment nòrdica en clara expansió cap al sud (ROBLEDANO i CALVO, 1989; ESTARELLAS *et al.*, 1989/90; ESTARELLAS i FERNÁNDEZ, 1990).

A Ses Salines d'Eivissa hi ha precedents de nidificació segura els anys 1989 (ESTARELLAS *et al.*, 1989/90), probable els anys 1985 i 1988, i possible el 1986 (ESTARELLAS *et al.*, 1990). Posteriorment només es varen poder obtenir registres de grups hivernants el 1989, 90, 91, 93 i 94, més o menys nombrosos, arribant a un màxim de 15 exemplars el 11-XII-93, i exceptuant el 1992 que se va recollir el mes de juny un mascle mort a la zona (Mariano Marí, *com. pers.*).

Les observacions que s'han efectuat el 1994 són les següents:

- 10 d'abril: s'observa una parella a Es Cavallet; el mascle adoptà un comportament de distracció, aprofitant la femella per amagar-se entre la vegetació existent al dic de sepa-

ració dels estanys, on suposam que hi havia el niu (O. Martínez i J. Martínez, *obs. pers.*).

- 14 d'abril: s'observa a la parella, acompanyada d'un mascle a la mateixa zona d'Es Cavallet (O. Martínez i J. Martínez, *obs. pers.*)
- 27 d'abril; se confirma la reproducció (J. Martínez, *com. pers.*) en veure's vuit polls.
- 29 d'abril: s'observen la parella i els vuit polls nedant en grup pels 2 estanys pròxims al lloc de nidificació.

Durant el mes de maig s'observà una disminució paulatina de la llocada passant a 5 polls el 1 de maig, 3 polls el 12 de maig (Mariano Marí, *com. pers.*) i veient-se finalment només la femella el dia 22 de maig. El mascle no se tornà veure.

Això permet suposar que s'ha perdut tota la llocada sense haver conseguit trobar restes de cap exemplar, essent un cas similar a l'ocorregut l'any 1989, en què se trobaren morts la femella i dos joves (ESTARELLAS *et al.*, 1989/90).



Per tant, a partir de les dades existents sobre l'ànnera blanca a Ses Salines d'Eivissa, se considera que el seu status hauria de ser estival rar (pos-

siblement amb un total de 5 nidificacions en els darrers anys), en lloc d'estival excepcional (GOB, 1993)

## NIDIFICACIÓN DEL TARRO BLANCO (*Tadorna tadorna*) EN LAS SALINAS DE EIVISSA EN 1994

El tarro blanco (*Tadorna tadorna*) es un anátida paleártica de distribución preferentemente norteña en clara expansión hacia el sur (ROBLEDANO i CALVO, 1989). En los últimos años se ha constatado su reproducción en varios puntos de la Península Ibérica y Baleares (ROBLEDANO i CALVO, 1989; ESTARELLAS *et al.*, 1989/90; ESTARELLAS i FERNÁNDEZ, 1990).

En Ses Salines de Eivissa existen precedentes de nidificación segura en el años 1989 (ESTARELLAS *et al.*, 1989/90), probable en los años 1985 y 1988, y posible en 1986 (ESTARELLAS *et al.*, 1990). Posteriormente sólo se pudieron obtener citas de grupos invernales en 1989, 90, 91, 93 y 94, más o menos numerosos, alcanzando un máximo de 15 ejemplares el 11-XII-93, y exceptuando en 1992 que se recogió en junio un macho muerto en la zona (Mariano Marí, *com. pers.*).

Las observaciones que se han efectuado en 1994 son las siguientes:

- 10 de abril: se observa una pareja en Es Cavallet; el macho adoptó un comportamiento de distracción, aprovechando la hembra para ocultarse entre la vegetación existente en el dique de separación de estanques, donde suponemos se encontraba el nido (O. Martínez y J. Martínez, *obs. pers.*).

- 14 de abril: se observa a la pareja, acompañada de un macho en la misma zona de Es Cavallet (O. Martínez y J. Martínez, *obs. pers.*).

- 27 de abril: se confirma la reproducción (J. Martínez, *com. pers.*) al verse ocho pollos.

- 29 de abril: se observa a la pareja y los ocho pollos nadando en grupo por los dos estanques próximos al lugar de nidificación.

Durante el mes de mayo se observó una disminución paulatina de la pollada pasando a 5 pollos el 1 de mayo, 3 pollos el 12 de mayo (Mariano Marí, *com. pers.*) y finalmente viéndose a la hembra sola el día 22 de mayo. El macho no se volvió a ver.

Esto permite suponer que se ha perdido toda la pollada sin haber conseguido encontrar restos de ningún ejemplar, siendo un caso similar al ocurrido en el año 1989, en el que se hallaron muertos la hembra y dos jóvenes (ESTARELLAS *et al.*, 1989/90).

Por tanto, a partir de los datos existentes acerca del tarro blanco en Ses Salines de Eivissa, se considera que su estatus debería ser estival raro (posiblemente con un total de 5 nidificaciones en los últimos 10 años), en lugar de estival excepcional (GOB, 1993).

## Bibliografia

ESTARELLAS, J.; FERNÁNDEZ, D. i PLANAS, B. 1989/90. Nidificación de *Tadorna tadorna* en Ibiza. *Boll. Soc. Hist. Nat. Balears*. Volumen 33: 169-173. Palma de Mallorca.

ESTARELLAS, J. i FERNÁNDEZ, D. 1990. *Entre montes blancos*. Consell Insular

d'Eivissa i Formentera, Conselleria d'Ecologia i Medi Ambient. Eivissa.

ROBLEDANO, F. i CALVO, J.F. 1989. La expansión del Tarro Blanco, *Tadorna tadorna* (L) como reproductor en España. *Ardeola*, Vol. 36/1: 91-95.

GOB. 1993. Status de l'Avifauna Balear. *Anuari Ornitològic de les Balears*. 1992. Volum 7: 121-124. Palma de Mallorca.

(Rebut: 19.01.95; Acceptat: 20.03.95)