

ACERCA DEL *ORIGANUM MAJORICUM* CAMB.

por A. Marcos Pascual

Dado por su autor, J. CAMBESSEDES, como especie nueva, en su «Enum. plant. quas in insulis Balearibus coll.» (1827), pp. 124-125 y no vuelto a encontrar por botánicos posteriores, que se interesaron por recolectarlo o valorarlo (véase bibliografía) hoy podemos reputarlo como forma de reducido valor sistemático, una vez que el ejemplar tipo, que obra en el Herbario del Instituto Botánico de Montpellier (Francia), ha sido examinado detenidamente, a petición nuestra, por personal competentísimo. En primer lugar lo efectuó el Dr. Sandro PIGNATTI, del Istituto ed Orto Botanico dell'Università di Pavia (Italia), autor de un reciente e interesantísimo «Studi sulla flora e vegetazione dell'isola di Mallorca (Baleari)» (Archivio Botanico: Vol. XXXI, 1955, pag. 46-65), quien nos informó que, a su parecer, la planta de CAMBESSEDES no podía separarse del *O. Majorana* difiriendo de este solamente por la menor pilosidad de ramos, hojas y brácteas. En igual sentido opinó el Dr. O. de BOLOS, que, en ocasión de hallarse en aquella ciudad francesa, estudió también la planta de referencia, en compañía del Dr. J. BRAUN-BLANQUET.

Este criterio no es nuevo: KNOCHE (Flora Balearica, II, 1922, p. 354) lo afirma rotundamente. Asimismo M. MARTINEZ MARTINEZ (quien estudió particularmente la cuestión) en Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 35, 1935, p. 128.

Motivó esta comprobación la lectura de un trabajo de C. PAU (Brotéria. III, 1934, pp. 62-63) en el que anuncia la teoría de suponer progenitores de la planta crítica el *O. majorana* L. y *O. virens* Link et Hoffmsg., opinión que no nos pareció desestimable, dado el lugar de recolección del *O. majoricum* («In aridis insulae Majoris prope Incam»), la abundancia de pies cultivados en todo Mallorca —huertos, en macetas,

alrededores de las casas rurales, etc.— de la conocidísima mejorana («moraduiX» en mallorquín) y existiendo espontáneo evidentemente el *O. virens* en el Puig d'Alaró (EXSICCATA PLANTES D'ESPAGNE, n.º 1429[7], recolectado allí por Frère BIANOR, E. C., y teniendo la referencia de BARCELO, además, de abundar en las colinas de Lloseta (lugar inmediato); autor este último al que concedemos la máxima beligerancia por lo honesto y concienzudo de su labor. Y a mayor abundamiento ser de empleo corriente el sustantivo catalán «orenga» y conocido el toponímico «Es Penyal de s'Orengar», nombre que se dá a un impresionante despeñadero o escarpado que en la cima del Puig se aprecia, orientado al E.; conocido del pueblo mallorquín y referido por los folkloristas que han recogido sus relatos.

Hay que rendirse a la evidencia: el *O. majoricum* Camb. debe ser definitivamente borrado de la Flora balear. Tenemos la planta de CAMBESSEDES por un pié asilvestrado, escapado del cultivo, diferente del tipo por su menor pilosidad, y, quizás, por las espigas cortísimas conglobadas («spicis brevissimis conglobatis», Camb. descript.) que indudablemente, posee el ejemplar estudiado.

BIBLIOGRAFIA

- J. CAMBESSEDES: Enumeratio plantarum quas in insulis Balearibus collegit. Mém. Mus. Hist. Nat. T. 14, 1827, pp. 124-125.
- A. C. COSTA: Introducción a la Flora de Cataluña. Barcelona. 1864, pag. 194.
- F. BARCELO y COMBIS: Flora de las Islas Baleares. Palma, 1879-1881 p. 357.
- P. MARES et G. VICINEIX: Cat. rais. des pl. vasc. des îles Baléares. Paris, 1880, p. 213.
- G. ROUY: Matériaux pour servir à la révision de la flore Portugaise (citado por BURNAT et BARBEY).
- G. ROUY in «Le naturaliste» 1882, p. 36 et seq. (citado por KNOCHE).
- E. BURNAT et W. BARBEY: Notes sur un voyage botanique dans les îles Baléares..... Genève et Bâle, 1882, pp. 30-33.
- H. KNOCHE: Flora Balearica, II, 1922, p. 354.
- C. PAU: Una visita a Mallorca. Broteria, III, fasc. II. Lisboa, 1934, pp. 62-63.
- M. MARTINEZ MARTINEZ: Plantas de Alicante. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat., XIV, 1934, pp. 463-465, fig. V.
- M. MARTINEZ MARTINEZ: Sobre el *Origanum majoricum* Camb. y el *O. Paui* Martz. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 35. 1935, pp. 125-128.