

مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی
مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی
دوره اول شماره دوم، ص ۱۴۲-۱۳۱، ۱۳۹۳

مقاله مروری سیستماتیک

بررسی عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بیمارستانی: یک مرور سیستماتیک

حسام کریم^{۱*}، سید محمود تارا^۲، کبری اطمینانی^۳

• پذیرش مقاله: ۹۳/۱۱/۱۴

• دریافت مقاله: ۹۳/۱۰/۱

مقدمه: طول مدت اقامت در بیمارستان یا LOS (Length of Stay) به عنوان یک برآوردگر غیر مستقیم از مصرف منابع و بهره‌وری در داخل بیمارستان به کار می‌رود. شناسایی عوامل مرتبط با این شاخص جهت بهره برداری بهینه از منابع، ارزشمند می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با LOS به صورت مرور سیستماتیک انجام شد.

روش: در این پژوهش که به صورت مرور سیستماتیک انجام شده است، مطالعات با استفاده از عبارات جستجوی تعریف شده و با استفاده از پایگاه‌های فارسی و خارجی مشخص، در عنوان مقالات و بدون بازه زمانی بازبانی گردید. مقالات بر اساس تطابق با معیارهای ورود و خروج انتخاب و اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی از آن‌ها استخراج و وارد نرم افزار اکسل نسخه ۲۰۱۰ گردید.

نتایج: از بین ۳۴۷ مقاله به دست آمده، ۱۸ مقاله انتخاب گردید. این مطالعات، چهار دسته عوامل بالینی، دموگرافیک، مدیریتی و بیمارستانی را به عنوان عوامل مرتبط با LOS معرفی نموده‌اند. همچنین روش‌های به کار رفته برای تعیین این عوامل شامل تکنیک‌های آماری و داده کاوی مانند رگرسیون درخت تصمیم و شبکه‌های عصبی مصنوعی بود. هدف تمام مطالعات، ایجاد مدلی جدید برای تعیین فاکتورهای مرتبط با LOS و یا ارزیابی مدل‌های معرفی شده در مطالعات دیگر بود.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعات نشان می‌دهد، تعیین عوامل مرتبط با طول مدت اقامت، براساس محل جمع‌آوری داده، متغیرهای مورد مطالعه و تکنیک داده کاوی مورد استفاده می‌تواند متغیر باشد، لذا پیشنهاد می‌گردد پژوهشگران این حوزه در جهت شناسایی و کاهش عوامل مرتبط با طول مدت اقامت، مدیران و برنامه‌ریزان بیمارستانی را یاری نمایند.

کلید واژه‌ها: عوامل مرتبط، طول مدت اقامت، مدل پیش بینی، داده کاوی

• **ارجاع:** کریم حسام، تارا سید محمود، اطمینانی کبری. بررسی عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بیمارستانی: یک مرور سیستماتیک. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی ۱۳۹۳؛ (۲): ۱۳۱-۱۴۲.

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 ۲. دکترای انفورماتیک پزشکی، استادیار گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 ۳. دکترای نرم افزار کامپیوتر، استادیار گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
- * **نویسنده مسؤول:** مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه انفورماتیک پزشکی

• **Email:** Karim.Hesam@gmail.com

• **شماره تماس:** ۰۹۳۶۳۶۴۷۳۶۲

مقدمه

بیمارستان شوند، حائز اهمیت است [۲]. برای رسیدن به این هدف یک راه حل، پیش‌بینی و تعیین تاریخ ترخیص و LOS هر بیمار با استفاده از روش‌های مکمل و تکنیک‌هایی مانند داده کاوی است [۱].

مطالعات قبلی نشان داده‌اند که تعداد زیادی از فاکتورها، مدت اقامت را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. این عوامل بسته به هدف اصلی و جمعیت مورد مطالعه، متفاوت می‌باشند [۹]. به عنوان مثال روانگرد و همکارانش در مطالعه‌ای با استفاده از روش تحلیل بقاء به بررسی عوامل مؤثر بر مدت اقامت بیماران بستری شده در بیمارستان تخصصی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که عواملی مثل فاصله محل سکونت بیماران تا بیمارستان، پذیرش در بخش آنکولوژی، پذیرش در روز پنجشنبه، افزایش تعداد کل آزمایش‌ها و بستری توسط پزشک متخصص داخلی، مدت اقامت بیماران در بیمارستان را افزایش می‌دهد [۴]. بنابراین با توجه به این که تاکنون مطالعه جامعی در این زمینه انجام نشده است و مطالعات مختلف فاکتورهای متفاوتی را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر LOS معرفی کرده‌اند، این مطالعه با هدف بررسی مطالعات قبلی برای یافتن عوامل تأثیر گذار و مرتبط با طول مدت اقامت بیمارستانی در جوامع مختلف به صورت مرور نظام‌مند انجام شد. همچنین هدف ثانویه از این پژوهش آشنایی با روش‌ها و مدل‌های مورد استفاده برای شناسایی این عوامل می‌باشد.

روش

جستجوی مطالعات

این پژوهش به صورت مرور سیستماتیک انجام شد. برای انتخاب مقالات، پایگاه‌های PubMed, Embase, Google Scholar جهت دستیابی به مقالات انگلیسی و پایگاه‌های Magiran, Medlib, Iranmedex, SID, Civilica, Google Scholar و منظور دستیابی به مقالات فارسی جستجو شدند. برای بازیابی مطالعات، استراتژی جستجو و انتخاب مقالات بر طبق جدول شماره ۱ تنظیم گردید. بر اساس این پروتکل، کلمات کلیدی length of stay, duration of hospitalization, LOS, predict, predictive, prediction predictor, predicting, prognostic, factors associated با prognosis ترکیبات احتمالی مختلف (جدول ۱) برای یافتن مقالات انگلیسی و واژه‌های پیش‌بینی، مدت اقامت، مدت بستری،

بیمارستان‌ها به شدت دارای محدودیت تخت و منابع برای نگهداری بیماران می‌باشند و بسیاری از آن‌ها با فشار مالی زیادی روبه‌رو هستند [۱]. آن‌ها در مواجهه با چالش‌های مختلف مانند افزایش تعداد بیماران، محدودیت تخت بستری و کمبود پرستار با محدودیت‌های منابع متعددی مواجه می‌شوند که باعث انحراف در عملکرد بخش‌های مختلف بیمارستان می‌شود [۲]. این امر برای پیدا کردن راه‌هایی جهت کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی بسیار مهم است [۱]. بخش‌های عمومی بیمارستان باید دارای گردش بیمار با اقامت کوتاه مدت باشند [۳]، زیرا کاهش مدت اقامت در بیمارستان، فرصت‌هایی را جهت افزایش درآمد، کاهش هزینه‌ها، کاهش نوسانات و تفاوت‌ها در اقدامات بالینی، افزایش کیفیت و افزایش سود فراهم می‌آورد [۴]. می‌توان گفت طول مدت اقامت بیمارستانی، عامل اصلی هزینه بیمارستان‌ها است [۵]. اگر بتوان بیمارانی که دارای اقامت طولانی مدت در بیمارستان هستند را بلافاصله پس از پذیرش شناسایی کرد، منابع مناسب می‌تواند جهت تلاش برای سرعت بخشیدن به مراقبت‌های بهداشتی در زمان اولیه، در دسترس قرار گیرد [۳]. در دسترس بودن تخت بیمارستانی با فاکتورهای محدودی در ارتباط می‌باشد. نرخ مراجعه مجدد و طول مدت اقامت از فاکتورهای اصلی هستند [۶]. طول مدت اقامت (Length of Stay) که به اختصار LOS نامیده می‌شود به عنوان تعداد روزهایی که یک بیمار در بیمارستان یا هر مرکز پزشکی دیگری بستری می‌شود، تعریف می‌گردد [۱]. LOS یکی از مفیدترین شاخص‌های بیمارستانی است که از آن می‌توان برای اهدافی از قبیل مدیریت مراقبت‌های بیمارستانی، کنترل کیفیت، برنامه‌ریزی بیمارستان، تعیین میزان کارایی و میزان استفاده از منابع بیمارستانی استفاده نمود [۴]. همچنین LOS می‌تواند به عنوان یک برآوردگر غیرمستقیم از مصرف منابع و بهره‌وری در داخل بیمارستان به کار رود و ابزار مناسبی برای برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه منابع در مراکز ارائه خدمات بهداشتی می‌باشد [۷]. با توجه به موارد یاد شده و علاقه زیاد بیمارستان‌ها به کنترل هزینه‌های خود [۱]، تعیین عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بیمارستانی به منظور توسعه استراتژی‌های بالقوه برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت تخت‌ها، ارزشمند می‌باشد [۸]. به عبارتی دیگر، تخمین مدت زمان اقامت بیماران و شناخت عوامل مؤثر بر آن، برای پیش‌بینی و حل مشکلات ناگهانی عملیاتی که ممکن است منجر به انحراف در اورژانس یا

عنوان مقالات انتخاب شده، بررسی شدند و مقالاتی که با موضوع اصلی پژوهش بی ارتباط بودند حذف گردیدند. در مرحله دوم با مطالعه خلاصه مقالات باقی مانده، مقالات مرتبط با هدف اصلی طرح، انتخاب شدند. در مرحله سوم با مطالعه متن مقالات، مطالعاتی که در بیمارستان و صرفاً در بخش عمومی انجام شده بودند، انتخاب گردیدند. پس از مشخص شدن مطالعات انتخابی نهایی، اطلاعات مورد نیاز شامل عنوان، محل و نوع داده‌های مورد بررسی، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، حجم نمونه، متغیرهای مورد بررسی، روش یا روش‌های مورد استفاده، متوسط LOS و نتیجه نهایی مطالعه از داخل متن مقالات انتخابی، استخراج و جهت بررسی و مقایسه در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰ وارد گردید.

عوامل و فاکتور جهت بازیابی مقالات فارسی، مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل تفاوت در نحوه جستجوی پایگاه‌های علمی ایرانی و خارجی، کلمات کلیدی فارسی و واژه‌های کلیدی انگلیسی متفاوت انتخاب شدند. جستجو بر اساس کلمات کلیدی در عنوان مقالات و بدون محدودیت زمانی تا تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۲ برابر با ۱۷ نوامبر ۲۰۱۳ انجام شد. پس از استخراج مقالات از پایگاه‌ها، در تمامی مراحل انتخاب مقالات، دو پژوهشگر به طور جداگانه مقالات را انتخاب کردند. در نهایت توافق روی مواردی که مورد اختلاف بودند، براساس بحث و اظهار نظر علمی، صورت گرفت. مطالعات در سه مرحله بررسی و انتخاب شدند. در مرحله اول، اطلاعات استنادی به همراه خلاصه مقاله تمام مقالات استخراج شده از پایگاه‌های داده، به نرم افزار مدیریت مراجع (Endnote) منتقل شدند. سپس

جدول ۱: استراتژی جستجو و انتخاب مقالات مورد نظر برای بررسی

عنوان	توضیحات	فارسی	انگلیسی
موضوع پژوهش پایگاه‌های داده	پیش بینی و تعیین عوامل مرتبط با LOS بیمارستانی	SID, Civilica, Google Scholar, Magiran, Iranmedex, Medlib	Length of stay predictors In hospital PubMed, Google Scholar, Embase
استراتژی جستجو (ترکیبات احتمالی برای کلمات کلیدی)	جستجو بر اساس عنوان مقالات در هر پایگاه، به طور جداگانه در قسمت جستجوی پیشرفته، انجام گرفت.	OR (predictor[Title]) OR (predicting[Title]) OR (prognosis[Title]) OR (prognostic[Title]) OR ("factors associated"[Title]) OR ("risk factors"[Title])	("length of stay"[Title]) OR ("LOS"[Title]) AND ((predict[Title]) OR (prediction[Title]) OR (predictor[Title]) OR (predictors[Title]) OR (predicting[Title]) OR (prognosis[Title]) OR (prognostic[Title]) OR ("factors associated"[Title]) OR ("risk factors"[Title]))
تاریخ انتشار	از ابتدای ایجاد پایگاه تا ۲۶ آبان ۱۳۹۲		Form beginning of database up to 17 November 2013
معیارهای ورود	• مقالاتی که عوامل مرتبط با LOS را تعیین کرده‌اند • مقالاتی که LOS را پیش بینی کرده‌اند		<ul style="list-style-type: none"> English with Abstract Subject: <ul style="list-style-type: none"> Describing a new model Validating previous models Suggesting improvement to previous models identifying factors associated with LOS Limited to general hospitals Simulation without original data
معیارهای خروج	• مقالاتی که مدل‌های پیش‌بینی را بدون تست با داده‌های واقعی معرفی کرده‌اند		

معیارهای ورود و خروج مطالعات

یا بهبود بخشیده‌اند و یا ۳- با استفاده از روش‌های مختلف آماری، عوامل مذکور را فقط شناسایی کرده‌اند. همچنین شرط انتخاب این مقالات این بود که در بیمارستان و در بخش‌های

معیارهای انتخاب مقالات شامل مطالعاتی بود که برای تعیین عوامل مرتبط یا مؤثر بر طول مدت اقامت: ۱- یک مدل جدید ایجاد کرده‌اند؛ ۲- مدل‌های قبلی را ارزیابی، تغییر داده و


بررسی متن کامل مقالات، ۷ مقاله انگلیسی و ۱۱ مقاله فارسی با موضوع اصلی طرح، شباهت بیشتری داشتند و در کل تعداد ۱۸ مقاله برای تجزیه تحلیل نهایی انتخاب گردید. روند بازیابی و انتخاب مقالات در شکل ۱ نشان داده شده است.

مطالعات به دست آمده از نظر هدف اصلی طرح، به سه دسته تقسیم شدند. گروه اول مطالعاتی که عوامل مرتبط با LOS را با استفاده از روش‌های آماری مختلف تعیین کرده‌اند (۵۶ درصد از مقالات). گروه دوم مطالعاتی که به ایجاد مدلی جدید جهت پیش‌بینی مدت اقامت پرداخته‌اند (۲۲ درصد از مقالات) و گروه سوم مقالاتی که به ارزیابی مدل‌های قبلی برای تعیین LOS پرداخته‌اند (۲۲ درصد از مقالات). پس از بررسی متن مقالات، جمعیت و محل مورد مطالعه، متغیرهایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند و همچنین روش‌های آماری به کار رفته در مطالعات یافت شده، طبق جدول ۲ به دست آمد. براساس این جدول اکثر مقالات از داده‌های دموگرافیک و بالینی موجود و از روش‌های رگرسیون برای تعیین فاکتورهای مورد نظر استفاده کرده‌اند. فاکتورهای مرتبط یا غیر مرتبط با طول مدت اقامت، به عنوان نتایج مطالعات خارجی و داخلی مورد بررسی به ترتیب در جداول ۳ و ۴ نشان داده شده است.

غیر از مراقبت‌های ویژه انجام شده باشند. مقالاتی که با داده‌های غیر واقعی، مدل‌های پیشگویی را ایجاد کرده‌اند و یا در محیط‌های غیر از بیمارستان یا در بخش‌های خاص مثل بخش مراقبت‌های ویژه انجام شده‌اند، از مطالعه خارج گردیدند. همچنین مقالاتی وارد مطالعه شدند که به زبان انگلیسی یا فارسی بوده، خلاصه مقاله آن‌ها موجود و از لحاظ زمانی نیز، شامل تمام مطالعاتی می‌شدند که از ابتدای تشکیل پایگاه‌های مورد نظر، نمایه شده بودند. به دلیل کمبود مطالعات داخلی که دقیقاً با هدف اصلی مطالعه مشابه باشند و همچنین ضرورت آگاهی از نحوه اجرا و نتایج تمام آن‌ها در کشور، سعی بر آن شد تا مطالعات داخلی که در بخش‌های خاص بیمارستانی مانند بخش مراقبت‌های ویژه یا سوختگی انجام شده‌اند نیز وارد مطالعه گردد.

نتایج

با بازیابی تمام مقالات و حذف مقالات تکراری، در کل ۳۴۷ مقاله شامل ۲۲۳ مقاله انگلیسی و ۱۲۴ مقاله فارسی به دست آمد که پس از بررسی عنوان و چکیده مقالات و تطبیق آن‌ها با معیارهای ورود و خروج تعیین شده، ۱۳۲ مقاله انگلیسی و ۱۱ مقاله فارسی مرتبط با موضوع مورد مطالعه باقی ماند. پس از



شکل ۱: فرآیند بازیابی و انتخاب مقالات داخلی و خارجی

جدول ۱: جمعیت و داده‌های مورد مطالعه در مقالات مختلف

ردیف	عنوان مطالعه	جمعیت و محل مورد مطالعه	تعداد نمونه	داده‌های مورد بررسی	روش مورد استفاده	ابزار	نوع مطالعه
مقالات انگلیسی							
۱	پیش‌بینی طول مدت اقامت برای بیماران مبتلا به سکته مغزی [۱۰]	بیماران مبتلا به اولین سکته مغزی	۳۸۸	اطلاعات دموگرافیک - نوع و شدت سکته - میزان زوال عقلی	ذکر نشده	SPSS. V. 13.0	کوهورت مبتنی بر جمعیت
۲	پیش‌بینی طول مدت اقامت بیماران با اولین سکته مغزی [۱۱]	بیماران مبتلا به اولین سکته مغزی یک مرکز پزشکی در جنوب تایوان	۳۳۰	اطلاعات در دسترس هنگام پذیرش	رگرسیون خطی چند متغیره	SPSS. V. 13.0	کوهورت - آینده نگر
۳	پیش‌بینی هم‌زمان مرگ و میر بیماران و مدت اقامت با استفاده از عوامل خطر در بدو ورود بیمار [۱۲]	بیماران مبتلا به جراحی بستری در سه مرکز تروما در ایالت مین آمریکا	۲۶۴۶	داده‌های موجود هنگام بستری بیماران مبتلا به جراحی	رگرسیون پیاسون	STATA و Mathematica	کوهورت - آینده نگر
۴	بیماران سالمند در بخش پزشکی حاد: عواملی که مدت اقامت در بیمارستان را پیش‌بینی می‌کنند [۳]	بیماران سالمند ۷۰ سال به بالا بخش عمومی بیمارستان سلطنتی ویکتوریا	۳۵۰	اطلاعات دموگرافیک - طول مدت بیماری قبل از بستری - دلیل اصلی برای پذیرش	مقایسه‌های گروهی برای داده‌های کیفی با استفاده از آزمون کای-دو	ابرقامپیوتر مدل ICL 2900	کوهورت - آینده نگر
۵	یک واحد اقامت کوتاه مدت: ویژگی‌هایی که مدت اقامت و پذیرش نهایی در خدمات بستری سنتی را پیش‌بینی می‌کنند [۱۳]	همه بیماران مراجعه‌کننده به واحد بستری کوتاه مدت بیمارستان کوک کانتی، یک بیمارستان آموزشی ۵۰۰ تخت خوابی در شیکاگو.	۷۵۱	داده‌های سیر بیماری بیماران - معاینات فیزیکی - و داده‌های پرونده پزشکی پذیرش و ترخیص	رگرسیون لجستیک چند متغیره	STATA	کوهورت - آینده نگر
۶	مشخصات پذیرش که اقامت طولانی مدت را برای بیماران مسن بستری شده بخاطر نارسایی قلبی، پیش‌بینی می‌کنند [۵]	بیماران مسن ۶۵ سال به بالا، بستری شده به دلیل نارسایی قلبی حاد بخش داخلی قلب بیمارستان Bellvitge	-	اطلاعات دموگرافیک، وضعیت حرکتی قلبی، وضعیت تغذیه‌ای - بیماری‌های همراه - داده‌های مرتبط با دوره بیماری حاد	رگرسیون لجستیک گام به گام	SPSS. V. 11.0	کوهورت - آینده نگر
۷	استفاده از تکنیک‌های داده کاوی برای شناسایی و پیش‌بینی مدت اقامت بیماران قلبی [۱]	بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان آموزشی قلب و عروق شهید رجایی تهران	۲۰۶۴	۳۶ فاکتور از اطلاعات بالینی و دموگرافیک بیماران	شبکه‌های عصبی مصنوعی، درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان	ذکر نشده	کوهورت - گذشته نگر
مطالعات فارسی							
۸	بررسی عوامل مؤثر بر طول مدت اقامت بیماران در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) بر اساس تحلیل سلسله مراتبی [۱۴]	کارکنان بیمارستان آموزشی الزهرا (س) شامل مدیریت، ریاست، سوپروایزر آموزشی و مسئول کلیه بخش‌های بیمارستان	۲۵	عوامل مرتبط با بیمار - تسهیلات اتاق عمل - ویزیت بیمار - عوامل مرتبط با هماهنگی بخش‌های دیگر - تجهیزات و تسهیلات - کارکنان درمانی - کیفیت پرستاری	تحلیل سلسله مراتبی	Expert Choice	توصیفی - مقطعی
۹	بررسی عوامل مؤثر بر مدت اقامت بیماران عروق کرونر در بیمارستان شهید مدنی (قلب) تبریز-۱۳۸۵ [۱۵]	پرونده پزشکی بیمارانی که در بیمارستان قلب تبریز عمل بای پس عروق کرونری داشته‌اند.	۳۴۹	خصوصیات دموگرافیک بیماران - نوع پذیرش و طول مدت اقامت، اطلاعات مربوط به خصوصیات جراحان	ذکر نشده	SPSS	توصیفی - تحلیلی
۱۰	بررسی مدت اقامت بیماران بستری شده در بیمارستان آموزشی تخصصی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران و عوامل بالینی و غیر بالینی مؤثر بر آن [۱۶]	پرونده بیماران در بیمارستان تخصصی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران - بخش‌های انکولوژی، جراحی و زایمان	۳۴۲۱	عوامل بالینی و غیر بالینی	آزمون کولموگروف اسمیرنوف / من-ویتنی / کورسکال-ولیس / ضریب همبستگی اسپیرمن	ذکر نشده	توصیفی - تحلیلی و مقطعی
۱۱	تحلیل عوامل مؤثر بر مدت زمان اقامت بیماران در بیمارستان‌های دولتی استان لرستان [۱۷]	پرونده‌های بیماران بستری در ۱۳ بیمارستان‌های دولتی استان لرستان	۶۶۲	اطلاعات دموگرافیک	رگرسیون خطی چند متغیره	ذکر نشده	توصیفی - تحلیلی و مقطعی
۱۲	توزیع مرگ و میر و مدت اقامت بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، بیمارستان ولی عصر (عج) شهر اراک [۱۸]	بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، بیمارستان ولیعصر اراک	۸۷۴	اطلاعات دموگرافیک	رگرسیون لجستیک، رگرسیون پواسونی آمیخته	ذکر نشده	مشاهده ای - مقطعی

جدول ۲: جمعیت و داده‌های مورد مطالعه در مقالات مختلف (ادامه)

۱۳	کارایی مدل دو جمله‌ای منفی با انباشتگی بیش از حد انتظار صفر در تحلیل مدت اقامت مادران پس از زایمان [۱۹]	مادران بستری در مرکز بهداشتی درمانی طالقانی اراک	۱۶۰۰	سن، شغل، فرزند ناهنجار متولد شده، رتبه تولد یا حاملگی، تعداد سقط های مادر، تعداد فرزندان فعلی، محل سکونت، نوع زایمان، وجود فرزند دوقلو، وجود فرزند سه قلو	استفاده از آماره Deviance جهت مقایسه تبیین مدل بکار رفته - هر مدلی که مقدار این آماره در آن کمتر باشد به عنوان مدل مناسبتر در نظر گرفته می‌شود	SAS و STATA8	مشاهده ای - مقطعی
۱۴	مدت اقامت بیماران بستری شده در بیمارستان تخصصی زنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و عوامل موثر بر آن با استفاده از روش تحلیل بقا [۴]	بیماران بستری در بخش - های انکولوژی، جراحی و زایمان بیمارستان تخصصی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران	۳۴۲۱	عوامل بالینی و غیر بالینی	مدل رگرسیون چندگانه کاکس	ذکر نشده	توصیفی - تحلیلی
۱۵	مدل بندی مدت اقامت بیماران در دو بیمارستان ولیعصر (عج) و تامین اجتماعی شهر اراک از عوامل دموگرافیک [۲۰]	بیمارستان های ولیعصر و تامین اجتماعی شهر اراک	۲۲۴۴	سن، جنس، محل تولد، محل زندگی	رگرسیون پواسون، رگرسیون معمولی	ذکر نشده	توصیفی - تحلیلی
۱۶	مدل رگرسیون نیمه پارامتری کاکس در تعیین عوامل موثر بر مدت اقامت بیماران بستری [۲۱]	بیماران بستری در بیمارستان هاشمی نژاد	۹۲۵	سن، جنسیت و نوع بیمه	مدل رگرسیون چندگانه کاکس	نرم افزار آماری R	تحلیلی - مقطعی
۱۷	مدل سازی اقامت بیماران بستری شده در بیمارستان بر اساس توزیع پواسن آمیخته [۲۲]	بیماران بستری در دو بخش داخلی و جراحی بیمارستان ولیعصر اراک	۱۳۲۳ بیمار بخش جراحی، ۸۴۰ بیمار داخلی	سن، وضعیت تأهل، محل تولد، محل زندگی،	مدل آمیخته پواسونی	SAS	تحلیلی - مقطعی
۱۸	مقایسه استراتژی های مختلف مدل بندی مدت اقامت بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی شهر شیراز [۲۳]	بخش های بیمارستان های آموزشی شیراز	۳۵۴۶	سن، جنس، محل تولد، محل زندگی، وضعیت تأهل، نوع بیمه، سابقه قبلی بستری شدن، دفعات بستری، وضعیت بیمار هنگام ترخیص	مدل های پواسونی بریده شده در نقطه خاص، مدل های دوجمله ای منفی بریده شده در نقطه خاص، مدل پواسنی با انباشتگی صفر بیش از حد، مدل دو جمله ای منفی با انباشتگی صفر بیش از حد، مدل های خاص پواسنی تغییر یافته شده، مدل های شمارشی تعمیم یافته شده، روش های داده های شبه پیوسته	STATA8, SAS6.2, SPluse2000, C.A.MAN	مشاهده ای - مقطعی

جدول ۳: فاکتورهای مرتبط یا غیر مرتبط بر LOS بر اساس مطالعات خارجی

نام متغیر	$\frac{b}{s.e.}$	ارتباط آماری با LOS	نوع ارتباط	P- value*	منبع
استعمال دخانیات	۳	معنا دار	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	۰/۰۴۳؛ ۰/۰۷۸؛ -	[۱، ۲، ۳]
افتادن به عنوان دلیل مراجعه	۱	معنا دار	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	< ۰/۰۰۱	[۳]
انسداد عروق	۲	معنا دار	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	۰/۱۶؛ < ۰/۰۰۱	[۵، ۱۱]
دسترسی محدود/ باز به آزمایشات	۱	معنا دار	ارتباط مستقیم با کاهش LOS	< ۰/۰۰۱	[۱۳]
بستری قبلی بخاطر نارسایی قلبی	۱	معنادار	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	۰/۷۳	[۵]
سابقه بیماری قلبی	۱	بی معنا	-	-	[۱۱]
بیماری دریچه قلب	۲	معنا دار	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	۰/۱۹؛ -	[۵، ۱۲]
بیماری قلبی	۱	بی معنا	-	-	[۱۱]
بیماری قلبی	۳	معنادار	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	۰/۶۴؛ < ۰/۰۵	[۳، ۵، ۱۰]
بیماری های همراه	۱	معنا دار	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	۰/۵۸۶	[۱]
جنسیت	۲	بی معنا	-	-	[۳، ۱۳]
دیابت	۴	معنا دار	ارتباط بین مونث بودن و افزایش LOS	۰/۰۳۴؛ ۰/۰۴؛ ۰/۰۰۴؛ -	[۱، ۵، ۱۰، ۱۱]
زبان	۱	معنا دار	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	۰/۲۱؛ -	[۵، ۱۰]
تنها زندگی کردن	۱	معنا دار	ذکر نشده	-	[۱]
سکته به عنوان دلیل مراجعه	۲	معنادار	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	۰/۳؛ -	[۵، ۱۰]
سکته سابقه سکته	۱	بی معنا	-	-	[۳]
سکته به عنوان دلیل مراجعه	۳	معنا دار	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	۰/۰۱؛ -؛ -	[۳، ۱۰، ۱۱]
سابقه سکته	۱	معنا دار	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	۰/۵۹	[۵]

جدول ۴: فاکتورهای مرتبط یا غیر مرتبط بر LOS بر اساس مطالعات خارجی (ادامه)

منبع	P-value*	نوع ارتباط	ارتباط آماری با LOS	رتبه	نام متغیر
[۱,۳,۵,۱۰,۱۲]	-؛ -؛ <۰/۰۲؛ ۰/۷۹؛ ۰/۲۱۳	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	معنا دار	۵	سن
[۱۱]	-	-	بی معنا	۱	
[۱۲]	-	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	معنا دار	۱	سوختگی به عنوان دلیل مراجعه
[۱,۵,۱۲]	-	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	معنادار	۳	فشار خون
[۱]	-	-	بی معنا	۱	قومیت و نژاد [به طور جداگانه]
[۱]	۰/۰۳۵	ذکر نشده	معنا دار	۱	نوع بیمه
[۱]	۰/۰۴۲۴	ذکر نشده	معنا دار	۱	وضعیت تأهل

* ترتیب مقادیر P-Value در هر ردیف بر اساس منبع مربوطه می‌باشد. این مقدار در هر منبعی که ذکر نشده است با علامت - مشخص گردیده است.

جدول ۵: فاکتورهای مرتبط یا غیر مرتبط بر LOS بر اساس مطالعات داخلی

منبع	P-value*	نوع ارتباط	ارتباط آماری با LOS	رتبه	نام متغیر
[۴,۱۶]	<۰/۰۰۱؛ <۰/۰۰۱	-	معنا دار	۲	بخش بستری
[۴]	۰/۰۲۰	-	معنا دار	۱	بستری به دلیل بیماری‌های نئوپلاسمی
[۴]	۰/۰۲۸	-	معنا دار	۱	پذیرش و بستری توسط پزشک متخصص
[۴,۱۶]	۰/۰۲۵؛ <۰/۰۵	-	معنا دار	۲	پذیرش و بستری در روزهای هفته
[۱۵]	<۰/۰۵	رابطه معکوس با افزایش LOS	معنا دار	۱	تعداد اعمال جراحی انجام شده توسط جراح
[۱۵,۱۶,۲۳]	<۰/۰۰۱؛ <۰/۰۰۱؛ -	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	معنا دار	۳	تعداد بستری قبلی
[۴,۱۶]	<۰/۰۰۱؛ <۰/۰۰۱	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	معنا دار	۲	تعداد کل آزمایشات و رادیوگرافی‌ها
[۱۷,۲۰,۲۱]	<۰/۰۵؛ -؛ ۰/۰۰۵	ارتباط بین مؤث بودن و افزایش LOS	معنا دار	۳	جنسیت
[۱۵]	>۰/۰۵	-	بی معنا	۱	
[۱۵,۱۶,۱۷,۲۰,۲۱,۲۳]	<۰/۰۵؛ -؛ <۰/۰۵؛ -؛ <۰/۰۵؛ <۰/۰۰۱	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	معنا دار	۶	سن
[۴]	۰/۰۲۳	-	معنا دار	۱	سیستم اداری - تناسلی
[۱۵,۱۷]	<۰/۰۰۱؛ <۰/۰۵	-	معنا دار	۲	شغل بیمار
[۱۶]	<۰/۰۰۹	-	معنا دار	۱	شغل همسر بیمار
[۱۶,۱۷]	<۰/۰۰۱؛ <۰/۰۵	-	معنا دار	۲	علت مراجعه
[۴]	<۰/۰۰۱	-	معنا دار	۱	عدد درون ریزی
[۴,۱۶]	<۰/۰۰۱؛ <۰/۰۰۱	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	معنا دار	۲	فاصله از محل سکونت
[۱۵]	<۰/۰۵	ارتباط مستقیم با افزایش LOS	معنا دار	۱	فعالیت خارج از بیمارستان پزشک
[۱۶,۱۷,۲۰,۲۳]	-؛ <۰/۰۵؛ -؛ -	-	معنا دار	۴	محل اقامت
[۱۵]	<۰/۰۵	-	بی معنا	۱	
[۱۶]	<۰/۰۰۱	-	معنا دار	۱	مدرک و درجه پزشک بستری کننده
[۱۶]	<۰/۰۰۱	رابطه معکوس با افزایش LOS	معنادار	۱	میزان تخصیلات بیمار
[۱۶,۱۷]	<۰/۰۰۱؛ <۰/۰۵	-	معنا دار	۲	نوع بیمه
[۲۱]	>۰/۰۵	-	بی معنا	۱	
[۴,۱۵,۱۶,۱۷,۲۳]	<۰/۰۰۱؛ <۰/۰۵؛ -؛ <۰/۰۰۱؛ <۰/۰۰۱	-	معنا دار	۵	نوع پذیرش
[۱۵]	<۰/۰۰۱	-	معنا دار	۱	نوع پرداخت
[۱۶]	<۰/۰۰۱	-	معنا دار	۱	نوع تخصص پزشک بستری کننده
[۱۶,۱۷,۲۰,۲۳]	<۰/۰۰۱؛ <۰/۰۵؛ -؛ -؛ -	ذکر نشده	معنا دار	۴	وضعیت تأهل
[۱۵]	>۰/۰۵	-	بی معنا	۱	
[۱۵,۱۶,۱۷,۲۳]	<۰/۰۰۱؛ <۰/۰۵؛ -؛ <۰/۰۰۱	-	معنا دار	۴	وضعیت بیمار هنگام ترخیص

* ترتیب مقادیر P-Value در هر ردیف بر اساس منبع مربوطه می‌باشد. این مقدار در هر منبعی که ذکر نشده است با علامت - مشخص گردیده است.

جدول ۶: متغیرهایی که در مطالعات به عنوان عوامل تأثیر گذار بر LOS گزارش شده‌اند.

متغیر	فراوانی	متغیر	فراوانی
		بالینی	
جنسیت	۷	استعمال دخانیات	۳
زبان	۱	بیماری های قلب و عروق	۸
زندگی به تنهایی	۲	بیماری های همراه	۳
سن	۱۱	تعداد بستری قبلی	۳
شغل	۳	سابقه سکنه	۱
محل اقامت	۶	علت مراجعه	۵
میزان تحصیلات بیمار	۱	علل بستری	۴
وضعیت تأهل	۵	فشار خون	۳
		بیمارستانی	
		مدیریتی	
پذیرش و بستری در روزهای هفته	۲	بخش بستری	۲
نوع بیمه	۳	پذیرش و بستری توسط پزشک متخصص	۱
نوع پذیرش	۵	نوع تخصص پزشک بستری کننده	۱
نوع پرداخت	۱	درجه علمی پزشک بستری کننده	۱

بحث و نتیجه گیری

طول مدت اقامت در بیمارستان، یکی از مفیدترین شاخص‌های بیمارستانی است که از آن می‌توان برای اهداف مختلفی از قبیل مدیریت مراقبت‌های بیمارستانی، برنامه‌ریزی بیمارستان، تعیین میزان کارایی و میزان استفاده از منابع بیمارستانی استفاده نمود. برای دست یافتن به این اهداف، ابتدا باید با متغیرهایی که در تغییر مدت اقامت نقش اساسی دارند، آشنایی بیشتری به دست آورد [۴]. متغیرهای متعددی بر شاخص مدت اقامت تأثیر می‌گذارند که برخی از آن‌ها در مطالعات پیشین بررسی شده‌اند [۱۵]، با این وجود در حال حاضر یک توافق عمومی در مورد عوامل تعیین کننده و تأثیرگذار بر طول مدت اقامت بیمار، وجود ندارد [۱۶]. اما به طور کلی این عوامل را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود. ۱- متغیرهای عرضه که مربوط به شرایط ارائه دهنده مراقبت هستند، مانند فراهم بودن و عرضه تخت، روش‌های پرداخت و سیاست‌های ترخیص بیمارستانی و ۲- متغیرهای تقاضا که مربوط به نیازها و شرایط بیمارانی می‌باشند، مانند شدت بیماری، وجود بیماری‌های همراه و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم [۴]. در تقسیم‌بندی دیگر، این عوامل در قالب ۴ طبقه شناسایی شده‌اند: ۱- عوامل مربوط به بیمار، مانند سن، جنس، برخورداری از وضعیت اقتصادی-اجتماعی، وضعیت تغذیه‌ای و عفونت‌های بیمارستانی بعد از عمل ۲- عوامل مربوط به بیمارستان مانند، اندازه بیمارستان (تعداد تخت)، نسبت پرستار به بیمار و منطقه‌ای که بیمارستان در آن قرار دارد ۳- منبع و نوع پرداخت، مانند دارا بودن یا فقدان بیمه و نحوه

پرداخت به بیمارستان ۴- عوامل مربوط به پزشک، مانند نوع فعالیت پزشک به صورت پزشک خانواده، پزشک خصوصی و یا پزشک مقیم بیمارستان [۱۶]. علاوه بر این، LOS می‌تواند تحت تأثیر فاکتورهای مختلف دیگری مثل سبک عملکرد کارکنان بهداشتی، در دسترس بودن تخت و فراهم بودن خدمات اجتماعی مانند سرویس‌های مراقبت طولانی مدت قرار گیرد [۹]؛ لذا طول مدت اقامت ممکن است علاوه بر فاکتورهای مرتبط با بیمار، متأثر از فاکتورهای غیرمرتبط با بیماری مثل در دسترس بودن تخت و امکانات توانبخشی بیمارستان نیز باشد [۱۰].

بیمارستان‌ها تلاش می‌کنند تا LOS را تا جای ممکن کاهش دهند [۱]؛ لذا درک بهتر از عوامل مؤثر بر مدت اقامت در بیمارستان می‌تواند به اقدامات لازم برای کاهش LOS منجر شود [۹]. همچنین مدت اقامت، یک پارامتر واقعی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری از منابع مراقبت‌های بهداشتی، هزینه‌های بهداشتی، و شدت بیماری می‌باشد. استفاده از LOS هزینه‌های بستری را به عنوان یک نشانگر بهره‌وری از منابع، پیش‌بینی می‌کند. برای یک مدیر بیمارستان به منظور موفقیت در این کار، پیش‌بینی و ارزیابی داده‌های LOS دشوار اما ضروری است. یک راه حل، پیش‌بینی و تعیین تاریخ ترخیص و LOS هر بیمار با استفاده از روش‌های مکمل و تکنیک‌هایی مانند داده کاوی است. پیش‌بینی LOS، مدیریت بهره‌وری از تخت‌های اشغال شده در بیمارستان‌ها را تسهیل می‌بخشد. بنابراین، پیش‌بینی دقیق و مناسب LOS

برای مدیریت بیمارستان و سیستم‌های مراقبت‌های امری مهم تلقی می‌شود. در همین حال، آگاهی از عوامل و عناصری که LOS را تعیین می‌کنند، می‌تواند باعث بهینه‌سازی مسیرهای بالینی کارآمد و توسعه مدیریت و بهره‌برداری از منابع گردد [۱].

هدف اصلی از مطالعه مروری حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار و مرتبط با طول مدت اقامت بیماران در بیمارستان بوده است. پژوهشگران این طرح، با مرور مطالعات انتخاب شده به عواملی دست یافتند که می‌توانند با مدت اقامت بیمارستانی مرتبط باشند. بسیاری از این متغیرها در مطالعات مختلف، به صورت متفاوت بیان شده‌اند. به عنوان مثال متغیر نوع بیمه در یک مطالعه غیرمرتبط با LOS گزارش شده است [۲۱]، در حالی که در ۳ مطالعه دیگر ارتباط این متغیر با LOS از لحاظ آماری معنادار بوده است [۱۶، ۱۷]. در هر صورت اگر در مدل‌های مختلف، ارتباط یک متغیر با طول مدت اقامت، معنادار معرفی شود، می‌توان نتیجه گرفت که آن متغیر همیشه بر افزایش یا کاهش LOS تأثیرگذار است [۹]. محققین این مطالعه، براساس یافته‌های این پژوهش، متغیرهای مرتبط با LOS را در چهار گروه، شامل متغیرهای دموگرافیک بیمار، بالینی، مدیریتی و بیمارستانی دسته‌بندی کردند. برخی از این عوامل، فاکتورهایی هستند که در حین درمان و یا هنگام ترخیص بیمار قابل شناسایی می‌باشند، در حالی که برای ایجاد مدلی جهت پیش‌بینی طول مدت اقامت بیمار، فقط از داده‌هایی می‌توان استفاده کرد که در هنگام ورود و پذیرش بیمار در دسترس هستند. عوامل مذکور از بین نتایج تمام مطالعات مورد بررسی در این پژوهش استخراج شده و در جدول ۵ نشان داده شده‌اند. براساس این جدول، در بین داده‌های دموگرافیک بیمار، متغیر سن و جنسیت، بیشترین موارد گزارش را در مطالعات مرور شده به عنوان عوامل مرتبط با LOS داشته‌اند. با توجه به تفاوت بودن نتایج مطالعات مختلف در مورد متغیرها و عوامل تأثیرگذار بر LOS، این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که عوامل مرتبط با طول مدت اقامت می‌تواند براساس منطقه جغرافیایی، نوع بیمارستان، بخش بستری، نوع بیماران مراجعه‌کننده، کیفیت و کمیت داده‌ها و متغیرهای مورد استفاده و مدل آماری یا داده کاوی به کار رفته در مطالعه، متفاوت باشد؛ لذا باید این عوامل را براساس اطلاعات موجود در هر بیمارستان به طور جداگانه به دست آورد و بر اساس آن برنامه ریزی‌های لازم را در همان مرکز ارائه خدمات سلامت انجام داد.

هدف دیگر از مطالعه حاضر، شناخت روش‌ها و مدل‌های مورد استفاده برای تعیین طول مدت اقامت بیمارستانی بوده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد، اکثر مطالعات از روش‌های آماری مرسوم جهت تعیین این فاکتورها استفاده کرده‌اند. بر طبق جدول ۲ حدود ۴۳ درصد از مطالعات داخلی از روش‌های مختلف رگرسیون برای تعیین فاکتورهای مرتبط با LOS استفاده کرده‌اند. به عنوان نمونه، رجایی فرد و رفیعی در مطالعه خود تعیین عوامل مؤثر بر مدت اقامت بیماران بستری شده را بر اساس مدل رگرسیونی پواسن آمیخته انجام داده و گفته‌اند، کاربرد این مدل در مواردی که متغیر پاسخ شمارشی پراکندگی زیاد دارد، پیشنهاد می‌شود [۲۲]. سایر مطالعات داخلی نیز روش‌های آماری دیگر را به کار برده‌اند که در جدول ۲ گزارش شده است. در بین مطالعات مورد بررسی در این پژوهش، رضایی و همکارانش در مطالعه‌ای تحت عنوان «استفاده از تکنیک‌های داده کاوی برای شناسایی و پیش‌بینی مدت اقامت بیماران قلبی» که در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است، از سه تکنیک داده کاوی شامل شبکه‌های عصبی مصنوعی، درخت تصمیم‌گیری و ماشین بردار پشتیبان برای تولید یک مدل پیشگویی طول مدت اقامت استفاده کرده‌اند. در این مطالعه اطلاعات ۳۵۱۲ بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر برای تولید و تست مدل، مورد استفاده قرار گرفته است. آن‌ها در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که تکنیک ماشین بردار پشتیبان برای ایجاد مدل پیشگویی هنگام تست با داده‌های واقعی بهتر جواب می‌دهد (میزان صحت = ۹۶/۴ درصد) اما دو مدل دیگر یعنی شبکه‌های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم‌گیری نیز می‌تواند برای این کار مورد استفاده قرار گیرند [۱]. این مطالعه تنها مطالعه‌ای است که در بین مطالعات مورد بررسی، به منظور شناسایی و پیش‌بینی طول مدت اقامت بیمارستانی از روش‌های داده کاوی استفاده کرده است. برای ساخت مدل‌های پیش‌بینی، روش‌های متعددی وجود دارد. در اغلب مطالعاتی که هدف ایجاد مدل پیش‌بینی می‌باشد، از مدل‌های ریاضی و آماری استفاده می‌کنند و برخی دیگر از مطالعات از روش‌ها و تکنیک‌های داده کاوی برای این منظور بهره می‌برند. از جمله روش‌های داده کاوی که برای حل مسائل پیش‌بینی مفید می‌باشند، می‌توان به شبکه بیزی، درخت تصمیم‌گیری و شبکه عصبی مصنوعی اشاره کرد. برای ساخت این مدل‌ها روش‌های متعددی وجود دارد که به ساختار بهتری برای مدل می‌انجامد [۲۴]. به هر حال به نظر می‌رسد برای ایجاد مدل‌های پیش‌بینی‌کننده یک متغیر، مانند طول مدت

ممکن است عوامل مؤثر بر مدت اقامت به محل جغرافیایی، نژاد، شغل بیمار، سبک زندگی، آداب غذایی و مواردی از این قبیل نیز مربوط شود؛ لذا شناخت عوامل مؤثر بر مدت اقامت، باید براساس هر جمعیت و منطقه به طور خاص مورد مطالعه قرار گیرد.

در نهایت، پژوهشگران این مطالعه توصیه می‌نمایند با توجه به عدم وجود مطالعات کافی مبتنی بر تکنیک‌های داده کاوی برای شناسایی عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بیمارستانی، علی‌رغم غنای این روش‌ها برای مطالعاتی از این دست، محققین پژوهش‌های آینده در این موضوع، با استفاده از روش‌های داده کاوی، ارتباط عوامل مختلف پذیرش تا ترخیص بیمار را با طول مدت اقامت بیمارستانی به صورت جامعی بررسی نمایند.

این مقاله حاصل تحقیقی مستقل است که به عنوان بخشی از بررسی متون پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته انفورماتیک پزشکی و بدون حمایت سازمانی انجام شده است.

اقامت، به کارگیری روش‌ها و تکنیک‌های داده کاوی، نتایج بهتر و دقیق‌تری را خواهد داشت، زیرا تکنیک‌های داده کاوی مثل شبکه‌های عصبی مصنوعی و یا شبکه‌های بیزی، این قابلیت را دارند که با ورود داده‌های جدید، خود را کامل‌تر نموده و پیش‌بینی دقیق‌تری را برای متغیر هدف ارائه دهند [۲۶-۲۴]. با این وجود، اغلب مطالعاتی که در این مرور نظم‌مند بررسی شدند، از روش‌های آمار سنتی مثل رگرسیون استفاده نموده‌اند و فقط یک مطالعات از تکنیک‌های جدید داده کاوی برای پیش‌بینی مدت اقامت بهره برده است [۱].

با توجه به یافته‌های این مطالعه که بر اساس تجزیه و تحلیل ۱۸ مطالعه داخلی و خارجی انتخاب شده به دست آمد، عوامل مختلف بالینی و غیربالینی مربوط به بیمار و همچنین ویژگی‌های بیمارستان و بخشی که بیمار در آن بستری شده است، می‌توانند هر کدام بر طول مدت اقامت بیمار تأثیر داشته باشند. تأثیر این عوامل بر LOS اگر از لحاظ آماری معنا دار باشد باید از لحاظ مدیریت بیمارستان نیز مورد بررسی قرار گرفته و در مورد هر کدام از این متغیرها، تصمیمات لازم در جهت کاهش مدت اقامت بیمارستانی اتخاذ شود. این نتایج نشان می‌دهد که

References

1. Rezaei Hachesoo P, Ahmadi M, Alizadeh S, Sadoughi F. Use of data mining techniques to determine and predict length of stay of cardiac patients. *Health Inform Res.* 2013;19(2):121-9.
2. Wrenn J, Jones I, Lanaghan K, Congdon CB, Aronsky D. Estimating patient's length of stay in the Emergency Department with an artificial neural network. *AMIA Annu Symp Proc.* 2005:1155.
3. Maguire PA, Taylor IC, Stout RW. Elderly patients in acute medical wards: factors predicting length of stay in hospital. *Br Med J Clin Res Ed.* 1986;292(6530):1251-3.
4. Ravangard R, Arab M, Rashidian A, Akbarisari A, Zare A, Salesi M, et al. Hospitalized patients length of stay and its associated factors in Tehran university of medical sciences women hospital using the survival analysis method. *J Sch Public Health Res.* 2010;8(3):25-35.
5. Formiga F, Chivite D, Manito N, Mestre AR, Llopis F, Pujol R. Admission characteristics predicting longer length of stay among elderly patients hospitalized for decompensated heart failure. *Eur J Intern Med.* 2008;19(3):198-202.
6. Zhang J, Harvey C, Andrew C. Factors associated with length of stay and the risk of readmission in an acute psychiatric inpatient facility: a retrospective study. *Aust N Z J Psychiatry.* 2011;45(7):578-85.
7. Soyiri IN, Reidpath DD, Sarran C. Asthma length of stay in hospitals in London 2001–2006: demographic, diagnostic and temporal factors. *PloS One.* 2011;6(11):27184.
8. Moloney ED, Bennett K, Silke B. Length of hospital stay, diagnoses and pattern of investigation following emergency admission to an Irish teaching hospital. *Ir Med J.* 2004;97(6):170-2.
9. Huang JQ, Hooper PM, Marrie TJ. Factors associated with length of stay in hospital for suspected community-acquired pneumonia. *Can Respir J J Can Thorac Soc.* 2006;13(6):317-24.
10. Appelros P. Prediction of length of stay for stroke patients. *Acta Neurol Scand.* 2007;116(1):15-9.
11. Chang KC, Tseng MC, Weng HH, Lin YH, Liou CW, Tan TY. Prediction of length of stay of first-ever ischemic stroke. *Stroke J Cereb Circ.* 2002;33(11):2670-4.
12. Clark DE, Ryan LM. Concurrent prediction of hospital mortality and length of stay from risk factors on admission. *Health Serv Res.* 2002;37(3):631-45.
13. Lucas BP, Kumapley R, Mba B, Nisar I, Lee K, Ofori-Ntow S, et al. A hospitalist-run short-stay unit: features that predict length-of-stay and eventual admission to traditional inpatient services. *J Hosp Med.* 2009;4(5):276-84.
14. Yaghoubi M, Karimi S, Ketabi S, Javadi M. Factors affecting patients length of stay in Alzahra hospital

based on hierarchical analysis technique. *Health Inf Manage.* 2011;8(3):326-34.

15. Vahidi R, Kushavar R. Factors affecting coronary artery patients hospital length of stay of Tabriz Madani hospital 2005-2006. *J Health Adm.* 2006;9(25):63-8.
16. Ravangard R, Arab M, Zeraati H, Rashidian A, Akbarisari A, Niroomand N, et al. A study of patient length of stay in Tehran university of medical sciences obstetrics and gynecology specialty hospital and its associated clinical and nonclinical factors. *Hakim.* 2010;13(2):129-36.
17. Arab M, Zarei A, Rahimi A, Rezaiean F, Akbari F. Analysis of factors affecting length of stay in public hospitals in Lorestan province, Iran. *Hakim.* 2010;12(4):27-32.
18. Rafiee M, Ayatollahi M. stay of patients admitted to intensive of mortality rate and length of stay of patients admitted into the intensive care unit of Arak Vali-Asr hospital. *J Iran Society Anaesthesiol Intensive Care.* 2006;28(55):54-63.
19. Rafiee M, Ayatollahi SM, Behboodian J. Zero-inflated negative binomial modelig, efficiency for analysia of length of maternity hospitalization. *Yafteh.* 2005;66(4):47-58.
20. Rafiee M, Ayatollahi M. Modeling length of stay in Vali-Asr and Tamin-Ejtemaei hospitals of Arak on some demographic factors. *J Arak Univ Med Sci.* 2002;5(4):28-35.

21. Gohari M, Vahabi N, Moghadamifard Z. Semi-parametric Cox regression for factors affecting hospitalization length. *Daneshvar.* 2012;19(99):23-30.
22. Rajaeifard A, Rafiee M. Length of hospital stay(LOS) modeling with mixture poisson distribution. *J Babol Univ Med Sci.* 2006;8(3):36-43.
23. Rafiee M, Ayatollahi SM, Behboodian J. Comparison of different modeling strategies of length of stay of patients hospitalized in teaching hospitals in Shiraz. *Med J Tabriz Univ Med Sci.* 2007;29(2):43-51.
24. Etminani K, Naghibzadeh M, Pena JM. DemocraticOP: A democratic way of aggregating Bayesian network parameters. *Int J Approx Reason.* 2013;54(5):602-14.
25. Etminani K, Naghibzadeh M, Razavi AR. Effective pruning strategies for branch and bound Bayesian networks structure learning from data. *Scientica Iranica.* 2013; 20(13):682-94.
26. Etminani K, Naghibzadeh M, Razavi AR. Globally optimal structure learning of Bayesian networks from data. *Artificial Neural Networks-ICANN 2010.* Berlin: Springer; 2010. p. 101-6.

Factors Associated with Length of Hospital Stay: A Systematic Review

Hesam Karim^{1*}, Seyed Mahmood Tara², Kobra Etminani³

• Received: 22 Dec, 2014

• Accepted: 3 Feb, 2015

Introduction: The Length of Stay (LOS) in the hospital is used as an indirect indicator of resources consumption and efficiency in hospitals. Identifying factors associated with this systematic review can be valuable in planning to optimize the utilization of the existing resources. The goal of the present study was to investigate factors associated with length of stay and it has been conducted as a systematic review.

Method: In this systematic review, papers were retrieved by the use of specified key terms in their titles and no restricted time in Persian and English databases. Papers were selected according to how they were in line with the criteria for inclusion and exclusion and finally, information were extracted and entered to Excel 2010 software for analysis.

Results: 18 articles out of 347 were selected. These studies introduced four criteria associated with length of stay including clinical, demographic, administrative, and hospital factors. Applied methods for identifying these criteria were statistical techniques and data mining techniques such as decision tree regression and artificial neural networks. The goal of all studies was making a new model for identifying factors associated with LOS or was evaluating other methods introduced in other studies.

Conclusion: Findings of this study represent that identifying factors associated with LOS can be variable according to data collection place, studied variables, and applied data mining techniques. So we suggest researchers to help hospital managers and planners with identifying and reducing factors associated with LOS.

Key words: Factors Association, Length of Stay, Predictive Model, Data Mining

• **Citation:** Karim H, Tara SM, Etminani K. Factors Associated with Length of Hospital Stay: A Systematic Review. *Journal of Health and Biomedical Informatics* 2015; 1(2): 131-142.

1. M.Sc. in Medical Informatics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2. Ph.D. in Medical Informatics, Medical Informatics Dept., Assistant Professor, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

3. Ph.D. in Software Engineering, Assistant Professor of Medical Informatics Dept., School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

***Correspondence:** Dept., Medical Informatics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad.

• **Tel:** 09363647362

• **Email:** Karim.Hesam@gmail.com