

Notas de flora hispánica, II

MARÍA ANDREA CARRASCO y CARLOS JOSÉ MARTÍN-BLANCO

Departamento Biología Vegetal, I. Facultad Ciencias Biológicas.
Universidad Complutense. E-28040, Madrid. Spain.

Resumen

CARRASCO, M. A. & MARTÍN-BLANCO, C. J. 1995. Notas de Flora Hispanica, II. *Bot. Complutensis* 20: 75-79.

Aportamos datos corológicos de 17 taxones de plantas vasculares recolectadas en la España peninsular. Todas ellas son, salvo indicación contraria, novedades para la provincia de que se trate. De entre ellas, algunas como *Petrorhagia dubia* (Rafin.) G. López & Romo, *Oxalis articulata* Savigny y *Eclipta prostrata* (L.) L. se citan por primera vez para áreas más amplias.

Palabras clave: España, Corología, Plantas Vasculares.

Abstract

CARRASCO, M. A. & MARTÍN-BLANCO, C. J. 1995. Notes of Spanish Flora, II. *Bot. Complutensis* 20: 75-79.

We present chorological data corresponding to 17 taxa of vascular plants collected in the Peninsular Spain. All of them represent at least first provincial records. Among them: *Petrorhagia dubia* (Rafin.) G. López & Romo, *Oxalis articulata* Savigny and *Eclipta prostrata* (L.) L. are also first records for a more extensive area.

Additional Key words: Spain, Chorology, Vascular Plants.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo es continuación del nuestro anterior (CARRASCO, 1986), y en él presentamos aportaciones a la distribución conocida de 17 taxones (11 especies, 5 subespecies y 1 variedad) herborizados en la España peninsular. Todas ellas, salvo que se indique lo contrario, representan al menos primeras citas provinciales y en los casos de *Petrorhagia dubia* (Rafin.) G. López & Ro-

mo, *Oxalis articulata* Savigny y *Eclipta prostrata* (L.) L. la ampliación que presentamos de su área conocida es considerablemente mayor.

Los testimonios que se citan están depositados en el herbario MACB de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Ranunculus ollissiponensis Pers. subsp. **alpinus** (Boiss. & Reuter) Grau

GUADALAJARA: Cantalojas, Barranco del Hornillo, 1650 m, 30TVL66, hayedo, 21-V-1985, *M.A.Carrasco & J.M.Cardiel*, MACB 51262. *Ibidem*, Barranco del Lillas, 30TVL66, 21-V-1985, *M.A.Carrasco & J.M.Cardiel*, MACB 51263.

Taxon endémico de las montañas del centro y centro-norte de España. GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ (1986: 365) lo señalan en las provincias de Madrid, Segovia, Soria y Zaragoza circundantes de la que ahora citamos. Incluyase Guadalajara en la distribución de esta subespecie.

Paronychia kapela (Hacq.) A.Kerner subsp. **kapela**

ÁVILA: San Bartolomé de Pinares, valle del río Hornos, 30TUK68, 14-V-1982, *M.A.Carrasco & M.Velazos*, MACB 51265.

Frecuente en muchas de las montañas del centro de España, su presencia se va haciendo cada vez mas rara hacia el oeste. Nuestra cita representa la localización mas occidental en el centro de la Península. Es basífila por lo que aparece únicamente en zonas muy nitrificadas por el pastoreo. Añadase Ávila a la corología que aparece en CHAUDHRI (1990: 114).

Petrorrhagia dubia (Rafin.) G. López & Romo

CIUDAD REAL: Piedrabuena, entre Tabla de la Yedra y Finca "El Garantón", 570 m, 30SUJ9124, 6-VI-1992, *F. Castilla & C. J. Martín-Blanco*, MACB 49975.

Aunque es especie frecuente en Andalucía y Extremadura como atestigua ROMO (1990: 426), esta es la primera vez que se encuentra en la provincia de Ciudad Real, en el límite occidental de la región de Castilla-La Mancha, lo que refuerza la anotación de (Ab) en el límite oriental de la región señalado por ROMO (*loc. cit.*).

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

CIUDAD REAL: Puebla de Don Rodrigo, garganta próxima al Campamento "El Casarejo", 520 m, 30SUJ6222, 29-III-1994, *C. J. Martín-Blanco*, MACB 51343.

Aparece en zonas nitrificadas sobre suelos frescos y húmedos. Sólo la he-

mos encontrado en lugares muy umbrosos en el sotobosque del quejigal de la Garganta del Buen Agua.

FERNÁNDEZ ARIAS & CASTROVIEJO (1993: 38) incluyen en la distribución peninsular de esta especie las provincias de Albacete, Badajoz, Jaén y Toledo, limítrofes con la que citamos. Incluyase tambien Ciudad Real.

Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. *maritima*

BURGOS: Aranda de Duero, 30TVM4314, al pie de paredones, 16-IV-1988, *M. A. Carrasco & M. Velayos*, MACB 51371.

Se confirma la presencia de este taxon en Burgos, como sugiere FERNANDES (1993: 197).

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br.

GUADALAJARA: Cantalojas, Barranco del Hornillo, 1650 m, 30TVL66, praderas junto a caminos, 21-V-1985, *M. A. Carrasco & J. M. Cardiel*, MACB 51278.

Incluyase Guadalajara en la distribución que presenta ORTIZ (1993: 253).

Erica scoparia L. subsp. *scoparia*

TOLEDO: Embalse de Rosarito, 30TUK0224, cerros frente al embalse, suelos ácidos, 11-V-1993, *M. A. Carrasco, S. Pajarón & M. S. Barrado*, MACB 51277.

Añádase Toledo a la corología que presenta BAYER (1993: 505).

Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb.

BURGOS: Briongos de Cervera, 30TVM5840, 9-XI-1992, *M. A. Carrasco*, MACB 51267.

Ha sido citado de las provincias vecinas de Segovia (GARCÍA ADÁ, 1987: 513) y Soria (VICIOSO, 1942: 202). De Burgos solo la ha señalado con anterioridad ROMO (1981: 154). Esta es la segunda cita provincial. La hemos encontrado parasitando *Juniperus oxycedrus* L.

Oxalis articulata Savigny

CIUDAD REAL: Piedrabuena, chopera de la Colonia de la Encina, 30SUJ9222, 1-V-1991, *J. C. Garrido, J. Hornero & C. J. Martín-Blanco*, MACB 51345.

Originaria de Sudamérica, en la Península Ibérica se encontraba casi únicamente restringida a la costa de Levante y a puntos aislados de las desembocaduras de los ríos Guadalquivir, Guadiana y Tajo. Actualmente parece ir ex-

tendiéndose hacia el interior. Ha sido citada de la provincia de Badajoz (VÁZQUEZ & DEVESA, 1989: 533) y ahora se señala por primera vez en Castilla-La Mancha, naturalizada en Guadalajara en zonas frescas y húmedas.

Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.

CÁCERES: Pasarón de la Vera, 30TTK5938, bordes de navajos, 13-V-1993, *M. A. Carrasco, S. Pajarón & M. S. Barrado*, MACB 51274.

Cachrys sicula L.

TOLEDO: Villafranca de los Caballeros, Laguna Chica de Villafranca, 30SVJ6564, en los bordes y pastos cercanos, 4-VII-1978, *M. A. Carrasco, S. Castroviejo & S. Cirujano*, MACB 51276.

No ha sido citado con anterioridad en la bibliografía, aunque existen recolecciones recientes (Toledo: Urda, VJ3463, 13-VI-1992, *V. J. Arán & M. J. Tohá*, MA 509211, MACB 46507, MAF 138219; *ibidem*, 26-VII-1992, *V. J. Arán & M. J. Tohá*, MA 515177, MACB 49370).

Callitrichie stagnalis Scop.

ÁVILA: entre La Iglesuela y La Adrada, río Tiétar, 30TUK4849, 11-V-1993, *M. A. Carrasco, S. Pajarón & M. S. Barrado*, MACB 51273.

Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne var. **trichocarpus** (I.B.K.Richardson)
O.Bolós & Vigo

TOLEDO: Embalse de Rosarito, 30TUK0224, 200 m, en matorrales sobre suelo ácido, 22-V-1991, *M. A. Carrasco, A. Escudero & S. Pajarón*, MACB 51272. *Ibidem*, 18-V-1992, *M. A. Carrasco, J. L. Castillo, C. J. Martín-Blanco & S. Pajarón*, MACB 51271.

La especie ha sido citada en la provincia por RIVAS-MARTÍNEZ (1978: 563) y por VELASCO & MARCOS (1986: 467). La variedad se señala aquí por primera vez para Toledo.

Valeriana officinalis L. subsp. **officinalis**.

SORIA: Muriel de la Fuente, río Muriel Viejo, El Soto, 30TWM1019, 1010 m, tremedal con *Molinia coerulea* (L.) Moench, 3-VII-1992, *M. A. Carrasco, F. Castilla, C. J. Martín-Blanco & M. Velayos*, MACB 51264.

Cnicus benedictus L.

ÁVILA: San Bartolomé de Pinares, valle del río Horno, 30TUK68, 16-IV-

1983, M. A. Carrasco & M. Velayos, MACB 51269. *Ibídem*, 17-V-1980, M. A. Carrasco & M. Velayos, MACB 51268.

Eclipta prostrata (L.) L.

CIUDAD REAL: Puebla de Don Rodrigo, Puente de Retama, 30SUJ7019, lecho desecado del río Guadiana, 12-IX-1991, M. A. Carrasco & C. J. Martín-Blanco, MACB 49983.

Procedente de las zonas tropicales y cálidas de América y naturalizada localmente en el sur de Europa. La citamos aquí por primera vez en la submeseta sur de la Península, aunque existe una recolección anterior procedente de Ciempozuelos en la provincia de Madrid (5-X-1983, S. Cirujano, MACB 11781).

Ophrys dyris Maire

GUADALAJARA: Pastrana, 30TWK07, 12-VI-1969, F. Bellot & M. E. Ron (*sub O. fusca* Link), MACB 3843.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAYER, E. 1993. Erica L., in S. Castroviejo & al. (eds.) *Flora Iberica* 4: 484-506.
 CARRASCO, M. A. 1986. Notas de flora hispánica. *Trab. Dep. Bot.* 13: 51-56.
 CHAUDHRI, M. N. 1990. Paronychia Miller, in S. Castroviejo & al. (eds.) *Flora Iberica* 2: 106-118.
 FERNANDES, R. B. 1993. Lobularia Desv., in S. Castroviejo & al. (eds.) *Flora Iberica* 4: 196-200.
 FERNÁNDEZ ARIAS, M. I. & CASTROVIEJO, S. 1993. Alliaria Scop., in S. Castroviejo & al. (eds.) *Flora Iberica* 4: 38.
 GARCÍA ADA, R. 1987. Fragmenta chorologica occidentalia, 1023-1056. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 513-517.
 GRAU, J. & LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. Ranunculus L. Sect. Ranunculastrum DC., in S. Castroviejo & al. (eds.) *Flora Iberica* 1: 353-371.
 ORTIZ, S. 1993. Teesdalia R. Br., in S. Castroviejo & al. (eds.) *Flora Iberica* 4: 252-254.
 RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1978. Vegetatio hispaniae, notula V. *Anales Inst. Bot. A. J. Cavanilles* 34(2): 553-570.
 ROMO, A. M. (1981) Aportaciones al conocimiento de la flora burgalesa. *Collect. Bot.* 12: 153-159.
 ROMO, A. M. (1990) Petrorhagia (Ser.) Link, in S. Castroviejo & al. (eds.) *Flora Iberica* 2: 420-426.
 VÁZQUEZ PARDO, F. & DEVESAS, J. A. 1989. Fragmenta chorologica occidentalia, 1966-2000. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 532-534.
 VELASCO, A. & MARCOS, N. 1986. Artemisio herbae-albae-Santolinetum canescens, Ass. Nov. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 465-468.
 VICIOSO, C. 1942. Materiales para el estudio de la flora soriana. *Anales Jard. Bot. Madrid* 2: 188-235.

*Recibido: 4 de julio de 1994
Aceptado: 20 de febrero de 1995*