

Normal Gorenstein surfaces with ample  $\omega^{-1}$ .

日高 又天 (早大理工) 渡辺 敬一 (都立大)

§ 1

$k$  は任意標数の代数閉体とし、以下全て  $k$  上を考へる。

Def. 1.1.  $\checkmark$  <sup>normal</sup> projective surface  $X$  が Gorenstein surface かつ  $X$  の dualizing sheaf  $\omega_X$  が invertible であることをいふ。

今、 $x \in X$  は  $X$  の normal な Gorenstein surface かつ  $x \in X$  は  $X$  の唯一の singular point とする。  $\pi: \tilde{X} \rightarrow X$  は  $(X, x)$  の minimal resolution,  $\pi^{-1}(x) = A = \bigcup_{i=1}^n A_i$  と既約分解してあると

Lemma 1.2  $\tilde{X}$  の canonical divisor  $K_{\tilde{X}}$  は

$$K_{\tilde{X}} = \pi^*(\omega_X) - \sum_{i=1}^n \gamma_i A_i, \quad \text{ここで } \gamma_i \geq 0 \quad (i=1, \dots, n)$$

$$\therefore) \quad 2p_a(A_i) - 2 = A_i(K_{\tilde{X}} + A_i) = - \sum_{j=1}^n \gamma_j (A_i \cdot A_j) + A_i^2 \quad (*)$$

$A$  の intersection matrix を  $\|(A_i, A_j)\|$  と書く。

$$\|(A_i, A_j)\| \begin{bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1^2 - 2p_a(A_1) + 2 \\ \vdots \\ A_n^2 - 2p_a(A_n) + 2 \end{bmatrix}$$

よって  $A_i^2 - 2p_a(A_i) + 2 \leq A_i^2 + 2 \leq 1$  である。両辺の等号は

$A_i^2 = -1, p_a(A_i) = 0$  のときだけあり、よって  $\pi$  が

minimal resolution  $\pi$  があることより得られる。よ

す  $\sum \|(A_i, A_j)\|$  が negative definite であることより  $\sum Y_i \geq 0$  //

$A$  の fundamental cycle と  $\Sigma_0 := \min\{\sum > 0 \mid \sum A_i \leq 0 \ i=1, \dots, n\}$

と定めると  $\text{Supp } \Sigma_0 = A$  ([1]) である。以下  $\Sigma_0$  と

する fundamental cycle と ~~する~~。

すす  $\pi$  normal Gorenstein surface singularity であること

既知の結果であることである。

Proposition 1.3 ([1], [4])  $(X, \pi)$  が Gorenstein であること

と次は同値

(i)  $\dim(R^1\pi_* \mathcal{O}_X)_x = 0$  (resp.  $= 1$ )

⇔

(ii)  $\pi$  は rational double point (resp. minimally elliptic singular point)

⇔

(iii)  $K_{\tilde{X}} = \pi^*(\omega_X)$  (resp.  $K_{\tilde{X}} = \pi^*(\omega_X) - \Sigma_0$ )

すす  $\pi$  minimally elliptic とは  $A = \pi^{-1}(x)$  の proper subgraph

が rational singularity の graph と一致であることである。と

$\pi^{-1}(A)$  が elliptic curve 1 本のみのことを意味する。と

simple elliptic と呼ぶ。[8]。

Remark) [4]  $\dim(R^1\pi_* \mathcal{O}_X)_x \geq 2$  であることは  $K_{\tilde{X}} = \pi^*(\omega_X) - \Sigma$

と  $\pi^{-1}(A)$  が  $\Sigma \not\cong \Sigma_0$  であることを示す。

## § 2

$X$  is normal Gorenstein surface with  $\omega_X^{-1}$  is ample and it is.  
 $X$  is non-singular and it is Del Pezzo surface and it is called  
 is it in  $\mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$  and it is all  $\mathbb{P}^2$  of blow up and it is  
 it,  $\Sigma$  of centre is 8 points and it is general position and it is.  
 is a condition and it is below, it is a blow up and it is.

$\mathbb{P}^2$  on infinitely near  $r$  points (  $r$  points of set  $\Sigma = \{P_1, P_2, \dots, P_r\}$  and  $\#\Sigma = r \leq 8$  and it is and it is.

$$\Sigma_j = \{P_1, \dots, P_j\} \quad (1 \leq j \leq r) \quad \text{and}$$

$$V(\Sigma) = V(\Sigma_r) \rightarrow V(\Sigma_{r-1}) \rightarrow \dots \rightarrow V(\Sigma_1) \rightarrow \mathbb{P}^2$$

is  $\mathbb{P}^2$  of  $\Sigma$  is centre and it is blow up of it and it is. and it is

$$\text{each step } r \text{ of exceptional fibre is } V(\Sigma_j) \rightarrow V(\Sigma_{j-1}) \text{ and}$$

$$\begin{array}{ccc} \cup & & \cup \\ E_j & \longrightarrow & P_j \end{array}$$

and it is.  $r \leq 8$  is condition and it is.

Def 3.1 [3]  $\Sigma$  is almost general position and it is and it is

(i)  $\Sigma$  of  $r$  of 4 points is line and it is.

(ii)  $\Sigma$  of  $r$  of 7 points is conic and it is.

(iii)  $H_j$  ( $1 \leq j \leq r-1$ ) is for  $E_i$  ( $1 \leq i \leq j$ ) of  $V(\Sigma_j)$  is

and it is proper transform  $\hat{E}_i$  of it,  $\hat{E}_i^2 = -2$  and it is and it is

and it is  $P_{j+1}$  is and it is.

Remark) 上の定義はさらに次の様. に " " 挿入  
 3 :  $\epsilon$  or 2 :  $\exists$  3.

$\Sigma$ : general position (resp. almost general position) 1 :  $\exists$   
 $\Downarrow$   
 $\forall C \subset V(\Sigma)$  irreducible curve,  $C^2 \geq -1$  (resp.  $\geq -2$ )

### § 3

以下  $X$  は normal Gorenstein surface 2.  $\omega_X^{-1}$  は ample 3.  $t$   
 の  $\epsilon$  4.  $\pi: \tilde{X} \rightarrow X$  は  $X$  の minimal resolution 5.  $\exists$  3.

$d := (\omega_X, \omega_X) \in X$  の degree と呼ぶ 6.  $\omega_X^{-1}$  は ample 2.  
 $\exists$  3.  $\forall d \geq 1$ .

我々の主要結果は次の theorems

Theorem 3.1  $\tilde{X}$  は ruled surface 2.  $\dim H^1(\tilde{X}, \mathcal{O}_{\tilde{X}}) = 0$  or 1.

def.  $h^1(\mathcal{O}_{\tilde{X}}) = 0, 1$  の  $\epsilon$  3.  $\exists$  4.  $\exists$  5.  $X$  は rational type,  
 elliptic type と呼ぶ 6.

Theorem 3.2  $X$  は elliptic type 2. degree  $d$  3.  $\exists$  4.  $\exists$   
 non-singular elliptic curve  $C$  と  $C$  上の invertible sheaf  $\mathcal{L}$  2.  
 $\deg \mathcal{L} = d$  3.  $\exists$  4.  $\exists$  5.  $\exists$  6.  $\exists$  7.  $\tilde{X} \cong \mathbb{P}(\mathcal{O}_C \oplus \mathcal{L})$  2.  
 $\pi$  は  $\tilde{X}$  上の minimal section の contraction.  $\epsilon$  4.  $X$  は  
 $C$  上の cone.

Theorem 3.3  $X$  is rational type  $\iff$  3.3

- (i)  $X$  の singularity は 高々 2 rational double.
- (ii)  $1 \leq d \leq 9$
- (iii)  $d = 9 \implies X \cong \mathbb{P}^2$  (i.e.  $\pi$ : iso)
- (iv)  $d = 8 \implies$ 
  - a)  $X \cong F_0 (= \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1)$ ,
  - b)  $X \cong F_1$
  - c)  $\tilde{X} \cong F_2$ ,  $\pi$  は  $\tilde{X}$  の minimal section の contraction,  
 $X \subset \mathbb{P}^3$  には 2次 cone.

(v)  $1 \leq d \leq 7 \implies \mathbb{P}^2 \pm$  almost general position  $\iff$  ある点の組  $\Sigma = \{P_1, \dots, P_r\}$  をあり、 $\# \Sigma = 9 - d$   $\iff \tilde{X} \cong V(\Sigma)$   
 $\pi$  は  $\tilde{X} \pm$  an irreducible curve  $C$   $\iff C^2 = -2$  があり  $\pi$  の contraction.

proof of 3.1)  $\tilde{X}$  is ruled があり  $h^0(mK_{\tilde{X}}) = 0 \forall m \geq 1$   $\iff$   
 $\mathbb{P}^1 \pm$  であり "。  $X$  is normal  $\iff$  があり  $\mathcal{O}_X \cong \pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}}$ .  
 $\therefore H^0(\omega_X^m) \cong H^0(\pi^* \omega_X^m)$  ( $m \in \mathbb{Z}$ )。  $\exists l \in \mathbb{Z}$ ,  $h^0(mK_X) \neq 0$   $\iff$  あり  
 $\iff 0 \neq h^0(mK_X) \leq h^0(mK_X + m \sum v_i A_i) \stackrel{(1.2)}{=} h^0(\pi^* \omega_X^m) = h^0(\omega_X^m)$   
 $\iff \omega_X^m$  の ample  $\iff$  あり。

$\pi: \tilde{X} \rightarrow X$  is あり  $\implies$  spectral sequence  $\iff$   
 $\cong \mathbb{Z}$  あり.  $E_2^{p,q} = H^p(X, R^q \pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}}) \implies H^{p+q}(\tilde{X}, \mathcal{O}_{\tilde{X}})$   
 $E_2^{p,q} = H^p(X, R^q \pi_* \pi^* \omega_X) \implies H^{p+q}(\tilde{X}, \pi^* \omega_X)$

= 4 5 1)

$$(1) \quad 0 \rightarrow H^1(\mathcal{O}_X) \rightarrow H^1(\mathcal{O}_{\tilde{X}}) \rightarrow H^0(R^1\pi_*\mathcal{O}_{\tilde{X}}) \rightarrow H^2(\mathcal{O}_X)$$

$$(2) \quad 0 \rightarrow H^1(\omega_X) \rightarrow H^1(\pi^*\omega_X) \rightarrow H^0(R^1\pi_*\mathcal{O}_{\tilde{X}}) \rightarrow H^2(\omega_X)$$

= = 2. 最後 1 項は Serre duality (= 5 1), (2) の

第 3 項は  $R^1\pi_*\mathcal{O}_{\tilde{X}}$  の singular point の support  $\in \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  と 2  
 5 (3).  $g = h^1(\mathcal{O}_{\tilde{X}})$  とある。2

$$(1) \dim H^0(R^1\pi_*\mathcal{O}_{\tilde{X}}) = 0 \text{ の } 4 \text{ 5}$$

$X$  の singularity は 高 2 rational double 2 がある。3

$K_{\tilde{X}} = \pi^*\omega_X$ .  $\tilde{X}$  は relatively minimal model (5 1)  $n$  回の blow up  
 2 得られたとすると (注:  $\mathbb{P}^2$  の 2 3 は  $\mathbb{F}_1$  5 1)  $n$  回  $\frac{1}{2}$  の 2 3)

$$0 < (\omega_X, \omega_X) = K_{\tilde{X}}^2 = 8 - 8g - n \quad \therefore g = 0$$

$$(2) \dim H^0(R^1\pi_*\mathcal{O}_{\tilde{X}}) = 1 \text{ の } 4 \text{ 5}$$

$\tilde{X}$  は ruled 2 がある。3  $f: \tilde{X} \rightarrow \mathbb{C}$  と general fibre  $\mathbb{P}^1$  2  
 $g(\mathbb{C}) = g$  である fibre space とする。 (1) 5 1)  $g(\mathbb{C}) = g \geq 1$ .


$X$  の singularity は 唯一の minimally elliptic singular point  $z_0$  と  
 他は 高 2 rational double 2 がある。3  $\Sigma_0 \in \pi^{-1}(z_0)$  の  
 fundamental cycle とする。3  $K_{\tilde{X}} = \pi^*(\omega_X) - \Sigma_0$  とする。3

Claim  $\Sigma_0$  は irreducible reduced 2  $f$  の section 2 がある。

Lemma 3.4  $B$  is irreducible to  $\tilde{X} \xrightarrow{\pi} X$   
 $f$  is a fibre component  $\in (B, Z_0 > 0)$   $\downarrow f$   
 $\pi(B)$  is a point  $\rightarrow$  ...  $B^2 = 0$ .  $c$

$\therefore -2 = K_{\tilde{X}} B + B^2 = (\pi^*(\omega_X) - Z_0) \cdot B + B^2$   
 $\therefore B^2 = -2 + \pi^*(\omega_X) \cdot B + Z_0 B \geq 0 \quad \therefore B^2 = 0 //$

$Z_0$  is a fibre component  $\in$  ...  $A_1 \subset Z_0$  is a fibre component  $\rightarrow$  ...  $A_1 \cdot B \neq 0$ ,  $\therefore B$  is  $\pi^{-1}(\text{point})$  ...  $\therefore B^2 = 0$  is a contradiction.



$f$  is a general fibre  $\in$  ...  $-2 = K D + D^2 = (\pi^*(\omega_X) - Z_0) \cdot D$   
 $\therefore Z_0 \cdot D = 2 + \pi^*(\omega_X) \cdot D \leq 1 \quad \therefore Z_0 \cdot D = 1$

$\therefore$  the claim is proved.  $g(Z_0) = 1$  ...  $g = g(c) = 1$

(ii)  $\dim H^0(R^1 \pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}}) \geq 2$  or ...

(ii-甲)  $\dim (R^1 \pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}})_x \geq 2$  for  $x \in X$  ...

$x \in X$  is a singular point  $\rightarrow$  ...  $Z_0$  is a fundamental cycle  $\in$  ...  $K_{\tilde{X}} = \pi^*(\omega_X) - Z$ ,  $Z \neq Z_0$ .  $Z = Z_0 + D$  ( $D > 0$ )

と書くと、

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_D(-Z_0) \rightarrow \mathcal{O}_Z \rightarrow \mathcal{O}_{Z_0} \rightarrow 0 \quad (*)$$

$$\therefore H^1(\mathcal{O}_D(-Z_0)) \rightarrow H^1(\mathcal{O}_Z) \rightarrow H^1(\mathcal{O}_{Z_0}) \rightarrow 0.$$

$$\# \text{ } \tau = \omega_D = D \cdot (D + K_X) = D \cdot (\pi^*(\omega_X) - Z_0) = -D \cdot Z_0.$$

$$\therefore H^1(\mathcal{O}_D(-Z_0))^* \cong H^0(\mathcal{O}_D) \neq 0 \quad \therefore h^1(\mathcal{O}_Z) > h^1(\mathcal{O}_{Z_0})$$

(1) の中の議論と同様、 $Z_0$  は  $f$  の fibre を含み、

$f^{-1}(z) = \mathcal{O}$  ならば、 $f(Z_0) = \mathcal{O}$ ,  $\# \text{ } \tau =$

$$(R^1\pi_* \mathcal{O}_X)_x = \sup_{E \in \pi^{-1}(x)} H^1(\mathcal{O}_E) \quad \# \text{ } \tau$$

$$g = h^1(\mathcal{O}_C) \leq h^1(\mathcal{O}_{Z_0}) < h^1(\mathcal{O}_Z) \leq \dim(R^1\pi_* \mathcal{O}_X)_x$$

- 一方 (1) より  $g \geq \dim(R^1\pi_* \mathcal{O}_X)_x$  であるから矛盾。

(1-2) rational double point 以外の  $X$  の singular point  $x_i$  あり

全て  $\dim(R^1\pi_* \mathcal{O}_X)_{x_i} = 1$  あり (  $i=1, 2, \dots, m$  )

$\sum_0^i \in \pi^{-1}(x_i)$  の fundamental cycle  $\mathcal{O}(-Z_0^i)$  あり

$K_X = \pi^*(\omega_X) - \sum_{i=1}^m Z_0^i$  あり (  $m \geq 2$  )。  $f$  の general fibre  $\mathcal{O}(-D)$  あり、 $\sum_0^i x_i$   $f$  の fibre component  $\mathcal{O}(-Z_0^i)$  あり

$$-2 = DK_X = D\pi^*(\omega_X) - \sum_{i=1}^m D \cdot Z_0^i \leq -1 - m \quad \text{あり矛盾。}$$

証明終り



Cor 3.5  $H^i(X, \mathcal{O}_X) = 0 \quad i=1, 2$

∴ p.6 の (1) を示す。

Remark)  $ch(k)=0$  のときは Kodaira vanishing [6]


を用いて  $h^1(\mathcal{O}_X) = h^1(\omega_X) = 0$  である。

$g = \dim H^1(R^1\pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}})$  である。  $h^1(\pi^* \omega_X) = 0$  である。

∴  $0 \rightarrow H^0(R^1\pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}}) \rightarrow H^2(\omega_X) \cong k$  である。

$g = 0$  or  $1$  である。

proof of 3.2) (3.1) の証明の  
 101 の記号を用いる。  $Z_0$  は irreducible  
 reduced  $\pi$  の section である。



$Z_0$  の任意の点  $z$  に対して、 $z$  の点を通る  $f$  の fibre  
 component  $B$  は (3.4) により  $B^2 = 0$  である。  $\tilde{X}$  は  
 minimal ruled surface である。  $L$  は  $\pi^* C$  上の  
 rank 2 の vector bundle  $E$  の存在  $\pi^* \tilde{X} = \mathbb{P}(E)$ 。

$L$  は  $E$  の indecomposable である。  $\tilde{X}$  上の minimal section  
 の self intersection number は 0 or 1 である。

$E \cong \mathcal{O}_C \oplus \mathcal{L}$  と分解される。  $\therefore \pi^* \deg \mathcal{L} > 0$  である。

$$d = (\omega_X, \omega_X) = (K_{\tilde{X}} + Z_0)^2 = 2K_{\tilde{X}} \cdot Z_0 + Z_0^2 = -Z_0^2 \neq 1$$

$$\therefore \deg \mathcal{L} = d$$

$\mathcal{L} = \mathcal{O}_C$ , non-singular elliptic curve  $C$  上の invertible sheaf

$\mathcal{L}$  2:  $\deg \mathcal{L} = d > 0$  ならば  $\mathcal{L}$  の  $n$  乗  $\mathcal{L}^{\otimes n}$  は  $n$  倍  $n$  倍  $n$  倍

$\tilde{X} = \mathbb{P}(\mathcal{O}_C \oplus \mathcal{L})$  上の minimal section  $\Sigma$ ,  $\Sigma$  は  $\mathbb{P}^1$  として

ある infinite section  $D$  と  $K_{\tilde{X}} = -\Sigma - D$  と

が成り立つ。また  $|mD|$  ( $m \gg 0$ ) は  $\Sigma$  の contraction

$\pi_{mD}: \tilde{X} \rightarrow X$  と与えられる。この  $X$  を求めるために

がある。

証明終り

proof of 3.3)  $X$  は rational type である。

(3.1) の証明の (1) より、 $X$  の singularity は高々 2 rational

double. また  $K_X = \pi^*(\omega_X)$  である。よって  $\omega_X^{-1}$  は

ample である。よって  $\pi$  は  $|mK_X|$  ( $m \gg 0$ ) は  $\Sigma$  として

定まる。

Lemma 3.6  $D$  は  $\tilde{X}$  上の irreducible curve とし

(i)  $K_{\tilde{X}}^2 > 0$ .

(ii)  $D \cdot K_{\tilde{X}} \leq 0$  ならば  $D \cdot K_{\tilde{X}} = 0 \iff \pi(D)$  は point.

(iii)  $D^2 \geq -2$  ならば  $D^2 = -2 \implies D \cong \mathbb{P}^1$  かつ  $\pi(D)$  は point

(iv)  $D^2 = -1 \implies D \cong \mathbb{P}^1$ ;  $DK = -1$

$\therefore K^2 = (\pi^k(\omega_X))^2$  であり (ii) は  $\text{AA}$  より、 $\omega_X^{-1}$  は ample であり  
 (ii) は  $\text{AA}$ 。  $D \cdot K + D^2 \geq -2$  であり  $D^2 \geq -2$ 。  $\exists T =$   
 $D^2 = -2$  と あり  $DK \geq 0$  であり (iii) であり  $DK = 0$  であり、 $2$   
 $D \cong \mathbb{P}^1$ 。  $D^2 = -1$  と あり  $2p(D) - 2 = DK - 1$  であり  
 $2p(D) = DK + 1 \leq 1$   $\therefore p(D) = 0$  //

Cor 3.7  $\tilde{X}$  の relatively minimal model は  $\mathbb{F}_2$ ,  
 $\mathbb{P}^2$ ,  $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$  のいずれかである。

(i) (3.6) の (iii) であり  $\text{AA}$  である。

(3.3) の証明を続ける。

$\tilde{X}$  は rational ruled surface であるから  $\text{rank}(\text{Pic } \tilde{X}) + k_X^2 = 10$   
 であり、 $1 \leq d \leq 9$ 。 (iii) (iv) は (3.7) にあてはまる。  $1 \leq d \leq 7$   
 と あり  $\tilde{X}$  は relatively minimal model とし  $\mathbb{P}^2$   
 と あり  $\Sigma = \{P_1, \dots, P_r\}$  とし  $\tilde{X} = V(\Sigma)$  と あり  $\#\Sigma = r = 9 - d$   
 であり (3.6) の (iii) であり  $\Sigma$  は almost general position である。

逆に、 $\mathbb{P}^2$  上の almost general position である点の組  
 $\Sigma$  であり  $\#\Sigma \leq 8$  ならば  $X$  を構成出来ることは  
 Demazure [3] による。

証明終り

## § 4.

この section 2 は 主要結果 である。

前と同様  $1 = X$  は normal Gorenstein surface  $\omega_X^{-1}$  cycle

と  $(\omega_X, \omega_X) = d$  である。  $\omega_X^{-m}$  は  $\mathbb{P}^3$  embedding  $1 =$

$\Rightarrow$   $2$  は

Theorem 4.1

(i)  $d \geq 3 \Rightarrow \omega_X^{-1}$  is very ample  $\Rightarrow X \subset \mathbb{P}^d$  (deg  $\rightarrow d$ )  
 と  $\wedge$  3。

(ii)  $d = 2 \Rightarrow \omega_X^{-2}$  is very ample  $\Rightarrow X \subset \mathbb{P}^6$  (deg 8)  
 $|\omega_X^{-2}|$

(iii)  $d = 1 \Rightarrow \omega_X^{-3}$  is very ample  $\Rightarrow X \subset \mathbb{P}^6$  (deg 9)  
 $|\omega_X^{-3}|$

§ 3 は  $\mathbb{P}^3$   $\subset$

Theorem 4.2

(i)  $d = 1 \Rightarrow X \subset \mathbb{P}(1, 1, 2, 3)$  deg 6 の weighted  
 hyper surface

(ii)  $d = 2 \Rightarrow X \subset \mathbb{P}(1, 1, 1, 2)$  deg 4 の weighted  
 hyper surface

$\mathbb{P}^2$   $\omega_X^{-1}$  is base point free  $\Rightarrow$

$\mathbb{P}^2_{|\omega_X^{-1}|}: X \rightarrow \mathbb{P}^2$  : double covering  $\Rightarrow$  ramification

is multiple component  $\mathbb{P}^2$   $t_1, t_2, \dots$  4次曲線

(iii)  $d=3 \Rightarrow X \subset \mathbb{P}^3$  cubic hypersurface

(iv)  $d=4 \Rightarrow X \subset \mathbb{P}^4$  (2,2)  $\mathbb{P}^2$  complete intersection.

$\exists t \in X$  の singularity の状況は  $d=1, 2$  より外は完全に記述される。(cf [2] [5] [7])

Theorem 4.3  $X$  is rational type  $\tau$ , degree  $d$  とあり。  
 $X$  の singularity は  $3 \leq d \leq 5$  のときは任意の proper subgraph に,  $6 \leq d \leq 8$  のときは任意の subgraph に訂正  $\tau$  ( = rational double points ) とる。

$d$	3	4	5	6	7	8	9
	$\tilde{E}_6$	$\tilde{D}_5$	$\tilde{A}_4$	$A_1 \times A_2$	$A_1$	$A_1$	$\emptyset$


Remark 1)  $d=3$  のときは  $\tilde{E}_6$ :  $\circ - \circ - \overset{\uparrow}{\circ} - \circ - \circ$  と simple elliptic singularity に訂正  $\tau$  と  $\tau \neq 2$  とする。任意の proper subgraph とは例として  $E_6$ :  $\circ - \overset{\uparrow}{\circ} - \circ - \circ$   $A_2 \times A_2 \times A_2$ :  $\circ - \overset{\uparrow}{\circ} - \circ - \circ$  等と訂正の意味である。

$d=1, 2$  のときは  $\tau$  は  $\tau \leq 4$  の  $\tilde{E}_8, \tilde{E}_7$  の connected proper subgraph に訂正  $\tau$  と  $\tau$  rational double point は  $\tau \in \{0, 1\}$  構成されることを示す。[8]  $\tau \in \{0, 1\}$  とする。

proper subgraph については、 $\mathbb{P}^2$  の 4 次曲線が起り得る。

Example)  $d=2$  とするとき  $X \rightarrow \mathbb{P}^2$  4 次曲線  $C$  を ramification とする double covering である。そこで 4 本の general position にある line  $L$  を考えれば

対応する  $X$  は 6 本の



$A_1$  type の rational double pts があることがおわかりのた  $\sigma_1, \sigma_2(A_1)$  は  $\tilde{E}_7$  の subgraph  $\Gamma$  における

の subgraph  $\Gamma$  における。

つまりは、elliptic type の  $X$  は 1 点で交わる 4 本の line を ramification divisor  $\Gamma$  となる。

Remark)  $d=2$  のときの singularity は multiple component をもたない 4 次曲線の分類に対応する。これについて 2 は近刊の [9] p. 37 にある 4 次曲線の表に、irreducible ではないものを付け加えると完成する。

[追記] 城崎での講演の後、宮西正宜先生に Demazure の文献 [3] を、また小田忠雄先生に M. Reid の "Canonical 3-fold" の中に、この稿の主題と関連した記述のある事を教えて頂きました。この場をかりて感謝の意を表します。

## References

- [1] M. Artin, "On isolated rational singularities of surfaces"  
*Am. J. Math.*, 88 (1966) p. 129 - 136.
- [2] J.W. Bruce - C.T.C. Wall "On the classification of cubic surfaces"  
*J. London Math. Soc.* (2) 19 (1979) p. 245 - 256
- [3] M. Demazure "Surfaces ~~B~~ de Del Pezzo"  
 (Séminaire sur les singularités des surfaces)  
 École Polytechnique (1976)
- [4] H. Laufer "On minimally elliptic singularities"  
*Am. J. Math.* 99-6 (1977) p. 1257 - 1295.
- [5] E. Looijenga "On the semi-universal deformation of a simple  
 elliptic hypersurface singularity"  
*Topology* 17 (1978) p. 23 - 40
- [6] D. Mumford "Pathologies III"  
*Am. J. Math.* 89 (1967) p. 94 - 104
- [7] H.C. Pinkham "Simple elliptic singularities, Del Pezzo surfaces,  
 and Cremona transformations"  
*Proc. of Symp. in Pure Math. (AMS) Vol 30. (1977) p. 69 - 71*

- [8] K. Saito "Einfach elliptische Singularitäten"  
Invent. Math. 23 (1974) p. 289-325.
- [9] 飯高-上野-浪川 "テカルトの精神と代数幾何"  
数学也三十一増刊 入門現代の数学 [6] (1980)