



# Sur l'analyticité des applications CR lisses à valeurs dans un ensemble algébrique réel

Bernard Coupet, Sylvain Damour, Joel Merker, Alexandre Sukhov

## ► To cite this version:

Bernard Coupet, Sylvain Damour, Joel Merker, Alexandre Sukhov. Sur l'analyticité des applications CR lisses à valeurs dans un ensemble algébrique réel. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, Elsevier, 2002, 334, pp.953-956. <hal-00003380>

**HAL Id: hal-00003380**

**<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00003380>**

Submitted on 27 Nov 2004

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# Sur l'analyticité des applications CR lisses à valeurs dans un ensemble algébrique réel

Bernard COUPET <sup>a</sup>, Sylvain DAMOUR <sup>a</sup>, Joël MERKER <sup>a</sup>, Alexandre SUKHOV <sup>b</sup>

<sup>a</sup> LATP, UMR 6632, Université de Provence, 39 rue Joliot-Curie, 13453 Marseille cedex 13, France

<sup>b</sup> LAGAT, UMR 8524, Université de Lille 1, Cité scientifique, 59655 Villeneuve d'Ascq cedex, France

Courriel : {coupet,damour,merker}@cmi.univ-mrs.fr; sukhov@agat.univ-lille1.fr

(Envoyée le 13 février 2002)

---

**Résumé.** Soit  $f : M \rightarrow M'$  une application CR de classe  $C^\infty$  entre une sous-variété  $M \subset \mathbb{C}^n$  analytique réelle générique et un sous-ensemble  $M' \subset \mathbb{C}^{n'}$  algébrique réel. On démontre que si  $M$  est minimale en un point  $p$  et si  $M'$  ne contient pas de courbe complexe,  $f$  est analytique réelle en  $p$ . © 2002 Académie des sciences/Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

*On analyticity of smooth CR maps into a real algebraic set*

**Abstract.** Let  $f : M \rightarrow M'$  be a  $C^\infty$ -smooth CR mapping between a generic real analytic submanifold  $M \subset \mathbb{C}^n$  and a real algebraic subset  $M' \subset \mathbb{C}^{n'}$ . We prove that if  $M$  is minimal at a point  $p$  and if  $M'$  does not contain complex curves, then  $f$  is real-analytic at  $p$ . © 2002 Académie des sciences/Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

---

## 1. Introduction et énoncés des résultats

Soit  $M$  une sous-variété générique analytique réelle de  $\mathbb{C}^n$  ( $n \geq 2$ ) et soit  $M'$  un sous-ensemble algébrique réel de  $\mathbb{C}^{n'}$ . Dans cette Note, nous étudions l'analyticité des applications de Cauchy-Riemann (CR) de classe  $C^\infty$  de  $M$  à valeurs dans  $M'$ . Notamment, nous établissons une estimation supérieure de leur degré de transcendance, en fonction de la dimension maximale des feuilletages holomorphes locaux contenus dans  $M'$ .

On peut supposer que la variété générique  $M$  de codimension  $d$  est définie au voisinage d'un point  $p \in M$  dans  $\mathbb{C}^n$  par des équations  $r_k(z, \bar{z}) = 0$ ,  $k = 1, \dots, d$ , où les  $r_k$  sont des fonctions analytiques réelles satisfaisant  $\partial r_1 \wedge \dots \wedge \partial r_d \neq 0$  en  $p$ . Soit  $m := n - d$  la dimension CR de  $M$ . D'après le théorème des fonctions implicites, on peut écrire les équations de  $M$  au voisinage de  $p$  sous la forme  $\bar{y}_k = \phi_k(\bar{x}, x, y)$ ,  $k = 1, \dots, d$ , où  $\mathbb{C}^n \ni z = (x, y) \in \mathbb{C}^m \times \mathbb{C}^d$ ,  $p = (x_p, y_p)$ , et les  $\phi_k$  sont des fonctions holomorphes au voisinage de  $(\bar{x}_p, x_p, y_p)$ . Les opérateurs  $L_j := \partial/\partial \bar{x}_j + \sum_{k=1}^d [\partial \phi_k / \partial \bar{x}_j] \partial/\partial \bar{y}_k$ ,  $j = 1, \dots, m$ , forment une base de champs CR tangents à  $M$ . L'ensemble algébrique réel  $M' \subset \mathbb{C}^{n'}$  est défini par des équations polynomiales réelles  $P'_k(z', \bar{z}') = 0$ ,  $k = 1, \dots, d'$ . Soit  $f : M \rightarrow M'$  une application CR de classe  $C^\infty$  au voisinage de  $p$  sur  $M$ , i.e.  $L_j f = 0$ , pour tout  $j$ . Rappelons que  $M$  est dite *minimale* en  $p$  (au sens de Tumanov) s'il n'existe pas de sous-variété CR stricte contenue dans  $M$ , passant par  $p$  et de dimension CR égale à  $m$ . Le premier résultat de cette Note est le suivant :

---

Note transmise à Pierre LELONG

S0764-4442(01)0????-?/FLA

© 2002 Académie des sciences/Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.

## B. Coupet et al.

**THÉORÈME 1.** – *Si  $M$  est minimale en  $p$  et si  $M'$  ne contient pas de morceau ouvert de courbe complexe,  $f$  est analytique réelle en  $p$ .*

Soit  $\mathcal{M}_p$  le corps des germes en  $p$  des fonctions méromorphes au voisinage de  $p$  dans  $\mathbb{C}^n$  et  $\mathcal{M}_p(f) := \mathcal{M}_p(f_1, \dots, f_{n'})$  son extension engendrée par les fonctions composantes  $f_1, \dots, f_{n'}$  de  $f$ . Soit  $\text{deg. tr}_p f$  le degré de transcendance de cette extension ([1, 2, 3, 4, 7]). Rappelons que le *degré de transcendance* d'une extension de corps est le cardinal commun à toutes les bases de transcendance ([11, Chap. I et II]), et que l'application  $f$  est analytique réelle en  $p$  si et seulement si  $\text{deg. tr}_p f = 0$  ([3], [4, Lem. 3.4]). Cette notion algébrique se traduit géométriquement par :

**THÉORÈME 2.** – *Si  $M$  est minimale en  $p$  et si  $\text{deg. tr}_p f = s$ , alors  $M'$  contient un morceau ouvert de variété analytique complexe de dimension  $s$ .*

On note  $\text{rg. max}_p f$  le rang maximal de  $f$  sur un voisinage de  $p$  ; comme  $f$  se prolonge holomorphiquement à un wedge, d'après les théorèmes de Trépreau [9] et Tumanov [10],  $f$  atteint son rang maximal presque partout. On dit que  $M'$  est  $(r, s)$ -plat en  $q' \in M'$  (cf. [2, 3]) s'il contient une sous-variété analytique réelle de dimension  $r$  passant par  $q'$  et biholomorphe au produit cartésien  $N \times \Delta^s$ , où  $N \subset \mathbb{C}^\nu$  ( $\nu \geq 0$ ) est une variété analytique réelle et  $\Delta^s$  est le polydisque unité dans  $\mathbb{C}^s$ . Cette notion permet de préciser le théorème 2 :

**THÉORÈME 3.** – *Supposons que  $M$  est minimale en  $p$  et que  $\text{deg. tr}_p f = s$ . Alors il existe un entier  $r \geq \text{rg. max}_p f$  et un ouvert  $V$  dense au voisinage de  $p$  dans  $M$  tels que pour tout point  $q \in V$ , l'ensemble  $M'$  est  $(r, s)$ -plat en  $f(q)$ .*

Notre approche est basée sur la méthode algébrique développée pour les hypersurfaces dans [8, 1, 2, 3]. Pour passer à la codimension supérieure, nous utilisons certains résultats récents de [4]. Dans le cas où  $M'$  est une variété analytique réelle, une approche géométrique pour le problème d'analyticité des applications CR lisses est développée dans les travaux fondamentaux de Diederich-Webster [6] et Diederich-Fornæss [5].

Notre méthode permet aussi d'étudier le problème général de l'analyticité des fonctions vectorielles vérifiant des équations des équations analytiques :

**THÉORÈME 4.** – *Soient  $M \subset \mathbb{C}^n$  une variété analytique réelle générique minimale en  $p$  et  $f : M \rightarrow \mathbb{C}^{n'}$  une application CR de classe  $C^\infty$  telles que  $\text{deg. tr}_p f = s$ . Supposons que  $f$  vérifie les équations  $P'_k(z, \bar{z}, f, \bar{f}) = 0$ ,  $z \in M$ ,  $k = 1, \dots, d'$  où  $P'_k(z, \bar{z}, z', \bar{z}') = \sum c_{\alpha\beta}(z, \bar{z}) z'^\alpha \bar{z}'^\beta$  sont des polynômes en  $z', \bar{z}' \in \mathbb{C}^{n'}$  à coefficients  $c_{\alpha\beta}(z, \bar{z})$  analytiques réels au voisinage de  $p$  dans  $\mathbb{C}^n$ . Alors pour tout voisinage  $V$  de  $(p, f(p))$ , l'ensemble analytique réel  $N := \{(z, z') \in V : P'_k(z, \bar{z}, z', \bar{z}') = 0, z \in M\}$  contient (éventuellement, après une permutation des coordonnées dans  $\mathbb{C}^{n'}$ ) une sous-variété de la forme  $\{(z, z') : z'_j = H_j(z, z'_1, \dots, z'_s), j = s+1, \dots, n', z \in M\}$ , où les  $H_j$  sont des fonctions holomorphes sur un ouvert de  $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^s$ .*

Les théorèmes 1, 2 et 3 se ramènent au cas particulier du théorème 4 où les coefficients des polynômes  $P'_k$  sont constants.

### 2. Extension méromorphe et dépendance algébrique

Soit  $\mathcal{R}_p(M)$  l'anneau des germes en  $p$  des fonctions  $C^\infty$  sur  $M$  de la forme  $h(z) = H(z, \bar{z}, \overline{g(z)})$ , où  $g = (g_1, \dots, g_s)$ ,  $s \geq 0$ , sont des germes en  $p$  de fonctions CR de classe  $C^\infty$  sur  $M$  et  $H$  est une fonction holomorphe au voisinage de  $(p, \bar{p}, \overline{g(p)})$ . Les opérateurs  $L_j$  sont des dérivations de l'anneau  $\mathcal{R}_p(M)$ . D'après le principe d'unicité pour les fonctions de  $\mathcal{R}_p(M)$  ([3, 4]), cet anneau est intègre. On note alors  $\widehat{\mathcal{R}}_p(M)$  le corps des fractions de  $\mathcal{R}_p(M)$ . Le résultat suivant, qui est une version généralisée du principe de réflexion de Lewy-Pinchuk, a été démontré dans [3] pour  $M$  une hypersurface et dans [4] pour le cas général.

**LEMME 1.** – *Si une fonction  $\psi = h_1/h_2 \in \widehat{\mathcal{R}}_p(M)$  est CR en dehors du fermé d'intérieur vide  $\Sigma := \{z \in M : h_2(z) = 0\}$ , elle se prolonge méromorphiquement à un voisinage de  $p$  dans  $\mathbb{C}^n$ .*

Une famille finie de fonctions  $g_1, \dots, g_s$  de classe  $C^\infty$  et CR au voisinage de  $p$  dans  $M$  est dite *algébriquement dépendante* sur  $\widehat{\mathcal{R}}_p(M)$  (resp.  $\mathcal{M}_p$ ) s'il existe un polynôme non nul  $Q \in \widehat{\mathcal{R}}_p(M)[X_1, \dots, X_s]$  (resp.  $Q \in \mathcal{M}_p[X_1, \dots, X_s]$ ) tel que  $Q(g_1, \dots, g_s)$  est identiquement nul au voisinage de  $p$  dans  $M$  en dehors de la réunion des lieux singuliers de ses coefficients (cf. [2, 3]).

LEMME 2. – *La famille  $(g_1, \dots, g_s)$  est algébriquement dépendante sur  $\widehat{\mathcal{R}}_p(M)$  si et seulement si elle est algébriquement dépendante sur  $\mathcal{M}_p$ . Dans ce cas,  $\deg. \text{tr}_p g < s$ .*

*Démonstration.* – Supposons qu'il existe des fonctions  $\alpha_J \in \widehat{\mathcal{R}}_p(M)$ ,  $J \in \mathbb{N}^s$ ,  $|J| \leq A$  non toutes nulles telles que  $\sum \alpha_J g^J = 0$  au voisinage de  $p$  sur  $M$ , en dehors des lieux singuliers des  $\alpha_J$ . Considérons une équation de ce type comportant un nombre de monômes *minimal* et possédant un coefficient unitaire, disons  $\alpha_{J_0} = 1$ . En appliquant les opérateurs  $L_j$ , on obtient les équations  $\sum_{J \neq J_0} L_j(\alpha_J) g^J = 0$ , pour  $j = 1, \dots, m$ . Ici,  $L_j(\alpha_J) \in \widehat{\mathcal{R}}_p(M)$ . Par l'absurde, s'il existe un coefficient  $L_{j_1}(\alpha_{J_1})$  non nul, on divise par ce coefficient et on obtient une contradiction avec le fait que l'équation initiale comportait un nombre minimal de monômes. Par conséquent, chaque  $\alpha_J$  est CR en dehors de son lieu singulier ; le lemme 1 permet de conclure.  $\square$

LEMME 3. – *Soit  $g = (g_1, \dots, g_s)$ ,  $s \geq 1$ , une famille de fonctions CR de classe  $C^\infty$  au voisinage de  $p$  dans  $M$  et  $P(z, \zeta, u, \omega)$  une fonction holomorphe en  $(z, \zeta) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n$  et polynomiale en  $(u, \omega) \in \mathbb{C}^s \times \mathbb{C}^s$  au voisinage de  $(p, \bar{p}, g(p), \overline{g(p)})$ . On suppose que  $P(z, \bar{z}, g(z), \overline{g(z)}) \equiv 0$  sur  $M$  au voisinage de  $p$  et que  $P(z, \bar{z}, u, \omega) \not\equiv 0$  sur  $M \times \mathbb{C}^{2s}$  au voisinage de  $(p, g(p), \overline{g(p)})$ . Alors, on a l'estimation :  $\deg. \text{tr}_p g < s$ .*

*Démonstration.* – On peut supposer que  $p = 0$  et  $g(p) = 0$ . Écrivons  $P$  sous la forme  $P(z, \zeta, u, \omega) = \sum \alpha_J(z, \zeta, \omega) u^J$ , où les  $\alpha_J$ ,  $J \in \mathbb{N}^s$ ,  $|J| \leq A$ , sont holomorphes en  $(z, \zeta)$  et polynomiales en  $\omega$  au voisinage de  $(0, 0, 0)$ . S'il existe  $J_0$  tel que  $\alpha_{J_0}(z, \bar{z}, \overline{g(z)}) \not\equiv 0$  sur  $M$  au voisinage de 0, alors  $g_1, \dots, g_s$  sont algébriquement dépendantes sur  $\widehat{\mathcal{R}}_p(M)$ , donc sur  $\mathcal{M}_p$  d'après le lemme 2. Si au contraire  $\psi_J(z) := \alpha_J(z, \bar{z}, g(z)) \equiv 0$  sur  $M$  au voisinage de 0 pour tout  $J$ , développons  $\psi_J(z) = \sum \beta_{IJ}(z, \bar{z}) g(z)^I$  sous forme polynomiale. Comme  $P(z, \bar{z}, u, \omega) \not\equiv 0$ , il existe des multi-indices  $I_0$  et  $J_0$  tels que  $\beta_{I_0 J_0}(z, \bar{z}) \not\equiv 0$  sur  $M$  au voisinage de 0. Alors,  $\psi_{J_0}(z) \equiv 0$  sur  $M$  au voisinage de  $p$  signifie à nouveau que  $g_1, \dots, g_s$  sont algébriquement dépendantes sur  $\widehat{\mathcal{R}}_p(M)$ .  $\square$

### 3. Démonstration des théorèmes

Dans la situation du théorème 4, on pose  $s = \deg. \text{tr}_p f$ . On peut supposer que  $f_1, \dots, f_s$  est une base de transcendance du corps  $\mathcal{M}_p(f)$  sur  $\mathcal{M}_p$ . Notons  $f = (g, h) \in \mathbb{C}^s \times \mathbb{C}^t$ ,  $t = n - s$ , et  $z' = (u', v') \in \mathbb{C}^s \times \mathbb{C}^t$ . Pour tout  $j = 1, \dots, t$ , il existe une fonction non identiquement nulle  $Q_j(z, u', v'_j)$  polynomiale en  $(u', v'_j) \in \mathbb{C}^{s+1}$  et holomorphe en  $z$  au voisinage de  $p$ , telle que  $Q_j(z, g(z), h_j(z)) \equiv 0$  sur  $M$  au voisinage de  $p$ . Soit  $\mathcal{Q}_p(f)$  le sous-ensemble analytique complexe de  $\mathbb{C}^{n+n'}$  défini au voisinage de  $(p, p')$  par les équations  $Q_j(z, u', v'_j) = 0$ ,  $j = 1, \dots, t$ . Notons  $\pi : \mathbb{C}^{n+n'} \rightarrow \mathbb{C}^n$  et  $\pi' : \mathbb{C}^{n+n'} \rightarrow \mathbb{C}^{n'}$  les projections canoniques, et  $\mathcal{Q}_p(f)|_M$  l'ensemble analytique réel  $\mathcal{Q}_p(f) \cap \pi^{-1}(M)$ . Le graphe  $\Gamma_f$  de  $f$  est inclus dans  $\mathcal{Q}_p(f)|_M$ . Soit  $\Delta_j(z, u')$  le discriminant de  $Q_j(z, u', v'_j)$  par rapport à  $v'_j$  et soit  $\Sigma := \{z \in M : \Delta_j(z, g(z)) = 0, j = 1, \dots, t\}$ . Il faut remarquer que  $\Delta_j(z, g(z)) \not\equiv 0$  au voisinage de  $p$  sur  $M$ ,  $j = 1, \dots, t$ , car  $g_1, \dots, g_s$  est une base de transcendance.

Appliquons maintenant la méthode de [1, 2, 3]. Soit  $\mathcal{M}_p[u']$  l'anneau des polynômes en  $u'$  à coefficients méromorphes au voisinage de  $p$ . D'après le théorème des fonctions implicites, pour tout point  $q \in M \setminus \Sigma$ , il existe des fonctions  $H_j(z, u')$  ( $1 \leq j \leq t$ ) définies sur un voisinage de  $(q, f(q))$  dans  $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^{n'}$ , holomorphes par rapport à  $z$  et algébriques par rapport à  $u'$ , telles que  $Q_j(z, u', H_j(z, u')) \equiv 0$  pour  $(z, u')$  dans un voisinage de  $(q, g(q))$ , i.e. les fonctions  $H_j(z, u')$  sont algébriques sur  $\mathcal{M}_p[u']$ . Considérons la substitution  $r'_k(z, u', \bar{z}, \bar{u}') := P'_k(z, \bar{z}, u', H(z, u'), \bar{u}', \overline{H(z, u')})$ . L'algébricité des  $H_j(z, u')$  sur  $\mathcal{M}_p[u']$  implique qu'il existe un polynôme non nul  $\sum_{l=0}^N A_l(z, u', \bar{z}, \bar{u}') X^l$  avec des coefficients analytiques réels par rapport à  $(z, \bar{z})$  dans un voisinage  $\Omega$  de  $(p, \bar{p})$  et polynomiaux par rapport à  $(u', \bar{u}')$  tel que

## B. Coupet et al.

$\sum_{l=0}^N A_l(z, u', \bar{z}, \bar{u}') [r'_k(z, u', \bar{z}, \bar{u}')]^l \equiv 0$  (cf. [1, Lem. 6.4]). Par construction,  $r'_k(z, g(z), \bar{z}, \overline{g(z)}) = 0$  pour tout  $z$  proche de  $q$ . Le lemme suivant est similaire au Lemme 6.5 de [1] :

LEMME 4. – On a  $r'_k(z, u', \bar{z}, \bar{u}') \equiv 0$  pour tout  $(z, u') \in M \times \mathbb{C}^s$  au voisinage de  $(q, g(q))$ .

*Démonstration.* – Raisonnons par l'absurde : si  $r'_k(z, u', \bar{z}, \bar{u}')$  est non identiquement nul, on peut supposer que  $A_0(z, u', \bar{z}, \bar{u}') = \sum g(z)^J A_{0,J}(z, \bar{z}, \bar{u}')$  est non identiquement nul et que  $A_0(z, \bar{z}, g(z), \overline{g(z)}) \equiv 0$  pour tout  $z$  dans un voisinage  $U_q$  de  $q$ . Si tout les  $A_{0,J}(z, \bar{z}, \overline{g(z)}) \equiv 0$  sur  $U_q$ , d'après le principe d'unicité pour les éléments de  $\widehat{R}_p(M)$  ([3], [4]), on a  $A_{0,J}(z, \bar{z}, \overline{g(z)}) \equiv 0$  dans un voisinage de  $p$ , ce qui contredit l'indépendance algébrique de  $(g_1, \dots, g_s)$  d'après le lemme 3. S'il existe  $A_{0,J_0}(z, \bar{z}, \overline{g(z)}) \not\equiv 0$  sur  $U_q$ , considérons toutes les équations  $\sum \alpha_J g^J = 0$  satisfaites sur un ouvert dense  $V_q \subset U_q$  avec  $\alpha_J \in \widehat{R}_p(M)$  comportant un nombre *minimal* de monômes et possédant un coefficient  $\alpha_{J_0}$  égal à 1. Comme dans le lemme 2, les  $\alpha_J$  sont CR sur  $V_q$ . Alors les  $\alpha_J$  se prolongent méromorphiquement à un voisinage de  $p$  dans  $\mathbb{C}^n$ . En effet, un examen direct de la preuve fournie dans [3], [4, Prop. 2.5] démontre qu'il suffit que  $\psi \in \widehat{R}_p(M)$  soit seulement CR sur un ouvert non vide de  $M$  pour que la conclusion du lemme 1 soit vraie. Donc  $(g_1, \dots, g_s)$  est algébriquement dépendante sur  $\mathcal{M}_p$ , ce qui contredit la définition de  $g$ .  $\square$

L'annulation des  $r'_k(z, g(z), \bar{z}, \overline{g(z)})$  s'interprète géométriquement de la façon suivante :

LEMME 5. – Pour tout point  $q \in M \setminus \Sigma$  suffisamment proche de  $p$ , il existe un voisinage  $\Omega_q$  de  $(q, f(q))$  dans  $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^{n'}$  tel que  $\mathcal{Q}_p(f)|_M \cap \Omega_q \subset N = \{(z, z') : P'_k(z, \bar{z}, z', \bar{z}') = 0, z \in M\}$ .

Fixons un point  $q \in M \setminus \Sigma$  suffisamment proche de  $p$ . Les équations de  $\mathcal{Q}_p(f)$  s'écrivent dans un voisinage  $\Omega = U \times V \times W$  de  $(q, g(q), h(q))$  sous la forme d'un graphe  $v'_j = H_j(z, u')$ , où les fonctions  $H_j$  sont holomorphes sur  $U \times V$ . Cela démontre le théorème 4.

Le lemme suivant permet de conclure la démonstration du théorème 3 qui implique les théorèmes 1 et 2 (cf. [1, 2, 3, 4, 7]).

LEMME 6. – Pour tout point  $q \in M \setminus \Sigma$  suffisamment proche de  $p$ , il existe un voisinage  $\Omega_q$  de  $(q, f(q))$  dans  $\mathbb{C}^{n+n'}$  tel que  $\pi'(\mathcal{Q}_p(f)|_M \cap \Omega_q)$  est une variété analytique réelle de dimension supérieure ou égale à  $\text{rg. max}_p f$ , passant par  $f(q)$  et biholomorphe au produit cartésien  $N \times \Delta^s$ , où  $N \subset \mathbb{C}^\nu$  ( $\nu \geq 0$ ), est une variété analytique réelle et  $\Delta^s \subset \mathbb{C}^s$  le polydisque unité.

*Démonstration.* – Le lemme 5 implique  $\pi'(\mathcal{Q}_p(f)|_M \cap \Omega_q) \subset M'$ . En tant que graphe, la variété analytique réelle  $\mathcal{Q}_p(f)|_M \cap \Omega$  est biholomorphe au produit cartésien  $(M \cap U) \times V$ , c'est-à-dire qu'elle est feuilletée par des morceaux ouverts de variétés complexes de dimension  $s$ . Soit  $\Psi : (M \cap U) \times V \rightarrow \mathbb{C}^{n'}$ ,  $(z, u') \mapsto (u', H(z, u'))$ , avec  $H = (H_1, \dots, H_t)$ . L'application analytique réelle  $\Psi$  est biholomorphe sur les fibres  $\{z\} \times V$ ,  $z \in M \cap U$ . De plus, elle est de même rang générique  $r$  que  $\pi'|_{\mathcal{Q}_p(f)|_M}$  ; et  $r \geq \text{rg. max}_p f$  puisque  $\Gamma_f \subset \mathcal{Q}_p(f)|_M$ . Par le théorème du rang (analytique réel), on conclut que pour tout  $q' \in M \setminus \Sigma'$  suffisamment proche de  $p$ , où  $\Sigma' \subset M$  est un fermé d'intérieur vide, il existe un voisinage  $\Omega' = U' \times V' \times W'$  de  $(q', g(q'), h(q'))$  tel que  $N' := \Psi((M \cap U') \times V') = \pi'(\mathcal{Q}_p(f)|_M \cap \Omega')$  est une sous-variété analytique réelle de  $\mathbb{C}^{n'}$  de dimension  $r$ . De plus, il existe une sous-variété analytique réelle  $N \subset M \cap U'$  telle que  $\Psi|_{N \times V'}$  est un difféomorphisme analytique réel sur  $N'$ . Finalement, on peut prolonger  $\Psi|_{N \times V'}$  en un biholomorphisme local de l'espace ambiant.  $\square$

## Références bibliographiques

- [1] Coupet B., Meylan F., Sukhov A., Int. Math. Res. Not. (1999) 1–29.
- [2] Coupet B., Pinchuk S., Sukhov A., Analyticité des applications CR, C. R. Acad. Sci. Paris, Série I 329 (1999) 489–494.
- [3] Coupet B., Pinchuk S., Sukhov A., On partial analyticity of CR mappings, Math. Z. 235 (2000) 541–557.
- [4] Damour S., On the analyticity of smooth CR mappings, Michigan Math. J. 49 (2001) 583–603.
- [5] Diederich K., Fornæss J.E., Proper holomorphic mappings between real-analytic pseudoconvex domains in  $\mathbb{C}^n$ , Math. Ann. 282 (1988) 681–700.

## Analyticité des applications CR lisses

- [6] Diederich K., Webster S.M., A reflection principle for degenerate real hypersurfaces, *Duke Math. J.* 47 (1980) 835–843.
- [7] Merker J., On the partial algebraicity of holomorphic mappings between two real algebraic sets, *Bull. Soc. Math. France* 129 (2001) 547–591.
- [8] S.Pinchuk, Thèse d'état, Moscou, 1980.
- [9] Trépreau J.-M., Sur le prolongement holomorphe des fonctions CR définies sur une hypersurface réelle de classe  $C^2$  dans  $\mathbb{C}^n$ , *Invent. Math.* 83 (1986) 583–592.
- [10] Tumanov A., Extension of CR functions into a wedge from a manifold of finite type, *Mat. Sb.* 136 (1988) 128–139.
- [11] Zariski O., Samuel P., *Commutative algebra*, Vol. 1, D. van Nostrand Company, 1958.