
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Registro del Payador Negro *Diglossa carbonaria* para la Argentina

Moschione, F. N.; San Cristobal, J.
1993

Cita: Moschione, F. N.; San Cristobal, J. (1993) Registro del Payador Negro
Diglossa carbonaria para la Argentina. *Hornero* 013 (04) : 307a-307

REGISTRO DEL PAYADOR NEGRO *DIGLOSSA CARBONARIA* PARA LA ARGENTINA*

FLAVIO N. MOSCHIONE¹ y JAVIER SAN CRISTOBAL¹

ABSTRACT. First record for Argentina of the Carbonated Flower-piercer (*Diglossa carbonaria*) is reported for neighbourhoods east of La Quiaca, Jujuy province.

El 6 ene 1988, en terrenos aledaños al Arroyo San Sana, unos 3 km. al este de La Quiaca, provincia de Jujuy, observamos dos individuos del Payador Negro *Diglossa carbonaria*, moviéndose nerviosamente sobre un pequeño grupo de Sauces Criollos *Salix humboldtiana* bajos.

Ambos individuos recorrieron por espacio de unos siete minutos las ramas de los sauces, alternando con detenciones de 20 a 50 segundos, en las cuales emitían dos o tres frases de una vocalización algo compleja, larga y aguda. Posteriormente volaron a arbustos menores, continuando con su desplazamiento nervioso.

Diglossa carbonaria se distribuía por Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia (Phelps y Meyer de Schauensee 1979, Hilty & Brown 1986) y también Chile: un registro cerca de Putre, provincia de Paríacota (Araya y Millie 1986); pero ha sido dividida por Graves (1982) en tres especies distintas, que pueden diferenciarse fácilmente por la distribución del colorido en las partes inferiores.

La coloración rojiza bien restringida a la zona abdominal indica que la especie observada por nosotros es la típica: *Diglossa carbonaria*.

D. carbonaria habita en montañas áridas o semihúmedas entre los 2.100 y 4.300 m snm. en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca (hasta ahora era endémica de Bolivia), donde es común (Fjeldsa & Krabbe 1990); mientras que la especie afín, *D. bruneiventris*, la reemplaza en otros sectores de Bolivia, Perú y Chile. La otra especie recientemente separada, *D. gloriosa*, habita en Venezuela y Colombia.

Esta primera observación del Payador Negro para la Argentina, fue realizada en una zona punena relativamente resguardada, a unos 3.440 m snm.

Agradecemos especialmente a Mark Pearman por sus consejos y sugerencias.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Araya, B. y G. Millie. 1986. Guía de Campo de las Aves de Chile. Ed. Universitaria. Chile.
- Fjeldsa, J. & N. Krabbe. 1990. Birds of the High Andes. Zool. Mus. Univ. of Copenhagen & Apollo Books. Denmark.
- Graves, G. 1982. Speciation in the Carbonated Flower-Piercer (*Diglossa carbonaria*) Complex of the Andes. Condor, (84):1-14.
- Hilty, S. & W. Brown. 1986. Birds of Colombia. Princeton University Press.
- Phelps, W. y R. Meyer de Schauensee. 1979. Una Guía de las Aves de Venezuela. Graf. Armitano. Venezuela.

* Aceptada para su publicación el 10 oct 1992.
1 Asociación Ornitológica del Plata, 25 de Mayo 749, 2° 6, 1002 Buenos Aires.

PRESENCIA DEL VENCEJO MONTAÑÉS *AERONAUTES MONTIVAGUS* EN LA ARGENTINA*

FLAVIO N. MOSCHIONE¹

ABSTRACT. Presence of the White-tipped Swift (*Aeronautes montivagus*) in Parque Nacional Calilegua, Jujuy province, becomes first record for Argentina.

El 26 jun 1991, en horas del mediodía observé

doce individuos en vuelo del Vencejo Montañés *Aeronautes montivagus* en la "Mesada de Las Colmenas" (1.150 m snm.), Parque Nacional Calilegua, provincia de Jujuy. Los vencejos permanecieron durante unos cinco minutos volando

* Aceptada para su publicación el 10 oct 1992.
1 Asoc. Ornitológica del Plata, 25 de Mayo 749, 2° 6, 1002 Buenos Aires.